

1. Gestante de 34 años acude por su cuarto control prenatal. A la valoración de enfermería se determina 28 semanas de gestación y riesgo de parto prematuro que conlleva a que el recién nacido presente enfermedad de membrana hialina. ¿Qué acción profiláctica se debe aplicar?

A. Aplicación de fludrocortisona

B. Administración de betametasona

C. Administrar gluconato de calcio

D. Iniciar aplicación de labetalol

2. Un paciente oncológico de 35 años en el posoperatorio inmediato de gastrectomía manifiesta dolor 7 según la escala EVA. ¿Cuál es la combinación de los analgésicos utilizados según la escala analgésica de la OMS modificada?

A. Fármacos no opioides, métodos ablativos, terapia adyuvante

B. Opioides débiles, técnicas de neuromodulación, terapia adyuvante

C. Opioides fuertes, medicamentos no opioides, terapia adyuvante

D. Opioides débiles, medicamentos no opioides, terapia adyuvante

3. Una paciente femenina de 8 horas de nacida con bajo peso al nacimiento. Al momento presenta hipotonía, hipotensión arterial y una convulsión tónico clónico presenta

apnea respiratoria, flacidez, hipotermia. FC 110 lpm. Usted considera posible hipoglucemia. ¿Cuál es una posible causa?

A. hipoinsulinismo

B. Aumento de gluconeogénesis

C. Disminución de las necesidades de glucosa por hipoxia.

D. Disminución de las reservas tisulares de glucógeno.

4. Usted realiza una visita domiciliar y encuentra una paciente femenina de 20 años que cursa un embarazo de 10 semanas, al momento del interrogatorio no refiere ninguna molestia, no se ha realizado ningún control prenatal y a la valoración del Score Mama presenta una puntuación de 0. Para localizar a su paciente en una visita subsiguiente. ¿Qué instrumento utiliza?

A. la historia clínica

B. el mapa parlante

C. el ecomapa

D. el familiograma

5. Según la concepción del modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (MIS FCI), los determinantes de salud se denominan al "Conjunto de procesos que tiene el potencial para generar protección o daño, para la salud individual y colectiva. Factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de los individuos y comunidades". ¿Cuáles son los determinantes de salud que el MAIS FCI asume?

A. Integralidad en la atención individual y familiar - Integralidad a nivel territorial, Integralidad en las acciones intersectoriales, Integralidad en la participación de la comunidad.

B. La Atención Primaria de la Salud Renovada (APS - R) - Epidemiología Comunitaria en el Modelo de Atención Integral de Salud y en la Red Pública Integral de Salud.
C. Garantía de los derechos de las y los ciudadanos, Universalidad, Integralidad, Equidad, Continuidad, Participativo.

D. Contexto socioeconómico y político. Posición socioeconómica, Los determinantes intermedios (desigualdad), determinantes ambientales.

6. Recién nacido masculino permanece en el alojamiento conjunto con la madre en la sala de parto, durante la atención de enfermería se realiza antropometría, recibe profilaxis ocular y con vitamina K y se inicia lactancia materna. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica sustenta estas actividades?

A. Art 69

B. Art 12

C. Art 6

D. Art 14

7. Recién nacido de 4 horas de vida se encuentra en alojamiento conjunto con su madre

y cursa el periodo de transición o adaptación a la vida extrauterina. En la monitorización se identifica los siguientes signos: T 37°C FR 50 rpm FC 140 LPM SO₂ 96%, RN sin signos de hipotonía. ¿A qué corresponde con estos resultados?

A. RN con signos vitales normales

B. RN con alteración en todos los signos

C. RN con taquicardia

D. RN con dificultad respiratoria

8. ¿Cuál es la clasificación de los servicios de salud por niveles de atención según el MAIS FCI?

A. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención

B. Prehospitalaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención

C. Prehospitalaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el cuarto nivel de atención

D. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el cuarto nivel de atención

9. Un RN a término Rh+ y madre Rh-, con hemoglobina de 11g/dL. ¿Qué tipo de anemia presenta?

A. Anemia por pérdidas sanguíneas

B. Anemia por aumento de la desnutrición de hematíes

C. Anemia por disminución de la producción de hematíes

D. Anemia fisiológica

10. El personal de enfermería realiza procedimientos de extracción de sangre y colocación de vía intravenosa para infusión continua a un paciente con sospecha de hepatitis C. ¿Qué principio de bioseguridad se debe aplicar?

A. Uso de barreras físicas

B. De bioética

C. De inmunización

D. De asepsia

11. ¿Cuál de los siguientes hitos históricos marcó el reconocimiento de la enfermería como profesión y su estatus actual?

- A. Edad antigua
- B. La guerra de Crimea**
- C. Las cruzadas de la Edad Media
- D. Guerra civil española

12. Un paciente de 55 años, con antecedentes de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y tabaquismo crónico. Ingresa en la unidad de cuidados intensivos con dificultad respiratoria y cambios en el estado mental. Al Examen físico se observa cianosis en labios y uñas. La gasometría arterial muestra los siguientes resultados: pH arterial 7.28, PaCO₂: 60 mmHg, HCO₃: 24 mEq/L. PaO₂: 70 mmHg. ¿Cuál es el principal cuidado de enfermería para este paciente?

- A. Preparar para una radiografía de tórax
- B. Administrar líquidos al paciente según prescripción
- C. Administrar oxígeno suplementario bajo prescripción**
- D. Administrar bicarbonato de sodio intravenoso.

13. ¿Cuál de los siguientes cuidados de enfermería debe aplicarse después de retirar una vía periférica heparinizada a un paciente de 54 años?

- A. Ocluir fuertemente con el parche en el sitio de punción VERIFICAR**
- B. Presionar fuerte al menos durante 5 minutos, observar si hay signos de hemorragia
- C. poner compresas de agua fría para evitar edema
- D. dar masaje de manera circular suave para disminuir el dolor

14. Neonato de 18 días de vida, que permanece en incubadora con 36.8 grados centígrados de temperatura corporal, es valorado por el personal de enfermería que al tratar de auscultar la zona abdominal, olvida calentar el estetoscopio metálico para ponerlo en contacto directo. ¿Cuál es el mecanismo de pérdida de calor?

- A. Conducción.**
- B. Evaporación
- C. Convección

15. Paciente de 27 años, soltera, gestante 0, con múltiples parejas sexuales, algunas de ellas ocasionales. Acude a su consulta porque desea cambiar el preservativo anticonceptivo ya que ha escuchado de su eficacia es baja.. ¿Cuál de los siguientes métodos está contraindicado para la posibilidad de infección pélvica?

- A. hormonales combinadas inyectables.
- B. anticonceptivos orales combinadas
- C. implante subdérmicos con progesterona
- D. Dispositivos intrauterino con cobre**

16. Paciente de 36 años, multipara con 30 semanas de gestación, con antecedentes de tabaquismo y legrado hace 6 años por aborto espontáneo. Acude por sangrado vaginal. ¿Cuál es el principal signo que orienta el diagnóstico de placenta previa?

- A. Hemorragia al inicio del embarazo
- B. Hemorragia profusa
- C. hemorragia por coloración café
- D. hemorragia indolora**

17. Paciente de 32 años casado. Después de 6 años de matrimonio y sin método anticonceptivo no ha podido conseguir embarazo y refiere desde los 20 años intenso dolor durante la menstruación dispareunia, desde hace un año el dolor es permanente en región pélvica y se intensifica durante los días de sangrado del ciclo menstrual. Los familiares tienen que acudir hoy al sitio de trabajo de la paciente ya que se encuentra en su tercer día de sangrado, pero el dolor ha sido tan intenso que le ha llevado a lipotimia. Es llevada a sala de urgencia. Al examen se aprecia una paciente lúcida y muy álgida. Los signos vitales son estables y el sistema cardiopulmonar es normal. al interrogatorio el sangrado menstrual es de poca cantidad y al examen bimanual del útero y los anexo se encuentran dentro de los parámetros normales. ¿Qué presunción diagnóstica tiene este caso del dolor pélvico crónico?

- A. Adenomiosis
- B. Dismenorrea primaria
- C. enfermedades pélvicas inflamatorias
- D. Endometriosis**

18. Es usted responsable de la gerencia de una maternidad en la sierra centro en la que se busca gestionar recursos cuál estrategia permite la optimización de la vacuna bcg recién nacidos.

- A. Vacunar a todos los niños dentro de las primeras 24 horas de nacido o al primer contacto del niño con los servicios de salud hasta las 11 meses 29 días de edad**
- B. Para gestionar recursos no se implementa la vacuna bcg ya que se reserva para población con formas graves como TB meníngea y miliar
- C. Utilizan la vacuna únicamente en hijos de madre seropositivas para VIH que hayan tenido exposición perinatal
- D. En lugar de vacunación se recomienda iniciar tratamiento antituberculoso con medicamentos en presencia de sintomatología

19. Una paciente de 12 años sin antecedentes patológicos importantes consulta a su pediatra por fiebre y dolor articular. En el interrogatorio su madre refiere como antecedente hace dos semanas tuvo un cuadro de amigdalitis estreptocócica tratado con amoxicilina 500 mg cada 8 horas por tres días, sin ciclo completo. El día de hoy acude por cuadro 72 horas de evolución de cefalea fronto parietal que progresa con dolor articular y malestar general, hace 24 horas tiene fiebre. En el examen físico la temperatura es de 38.5° dolor articular en rodillas y tobillos, se evidencia presencia de eritema marginado en extremidades superiores e inferiores, a la auscultación cardíaca presencia de soplo cardíaco. En los análisis de laboratorio se evidencia PCR elevado y velocidad de eritrosedimentación elevada, estudio de ecocardiograma con presencia de estenosis en válvula mitral. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? *

- A. Mononucleosis infecciosa.
- B. Fiebre reumática.**
- C. Artritis reumatoide juvenil.
- D. Infección por Sars CoV2.

20. Una paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre, Ingresa al hospital en expulsivo, parto céfalo vaginal. Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia cardíaca 140 lpm. Apgar 9. Líquido amniótico de mal olor Rotura de membranas de 21 horas: ¿Qué factores de riesgo para infección presenta el recién nacido?

A. Líquido amniótico transparente con grumos.

B. Parto céfalo vaginal, en expulsivo.

C. Rotura de membranas de 21 horas.

D. Madre adolescente.

21. Un recién nacido de 48 horas de vida recibe atención en emergencia por cuadro de distensión abdominal, acompañado de vómitos por varias ocasiones de contenido bilioso y ausencia de meconio. Sus antecedentes personales incluyen polihidramnios, nacimiento por parto vaginal a las 39 semanas de gestación. Al examen físico FC: 160/min FR:50/min TA:60/40 mmHg, temperatura: 36°C. El abdomen se encuentra distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Ano permeable. La radiografía de abdomen muestra asa de intestino delgado distendido, escaso aire en colon. ¿Cuál es el diagnóstico probable del paciente?

Seleccione una:

A. Ileo meconial.

B. Divertículo de Meckel.

C. Enterocolitis necrotizante.

D. Intususcepción.

22. Lactante 8 meses con residencia en zona urbana y antecedente de 4 días con rinitis y tos seca esporádica comienza con fiebre de 38°C que excede con medios físicos y taquipnea. Al examen físico se encuentra escasos crepitantes y sibilantes en ambos Campos pulmonares la radiografía de tórax muestra hiperinsuflado y presencia de infiltrado intersticial bilateral el recuento de leucocitos es de 1300 células/mm³ con predominio de linfocitos saturación de oxígeno 95% ¿cuál es el diagnóstico y conducta a seguir ?

A. Neumonía vírica tratamiento sintomático y seguimiento en el hogar

B. Neumonía vírica ingreso hospitalaria y vigilancia de complicaciones

C. Neumonía bacteriana ingreso hospitalaria y tratamiento antimicrobiano

D. Neumonía bacteriana tratamiento con antimicrobianos y seguimiento en

23. Señala que trazo representa la despolarización de los ventrículos en el EKG:

Seleccione una:

A. Onda P.

B. Segmento ST.

C. Onda T.

D. Complejo QRS.

24. Paciente masculino de 18 años sin antecedentes patológicos acude a consulta porque desde hace 3 meses presenta “barros y espinillas” en la cara en moderada cantidad, en algunas ocasiones lesiones causan dolor. ha utilizado jabones con antibiótico de venta libre sin mejoría. en el examen físico: signos vitales estables, presencia de lesiones compatibles con comedones abiertos y cerrados en moderada cantidad ubicados en la cara, 2 lesiones papulopustulosas aisladas. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

- A. Acné grave
- B. Acné conglobata
- C. Acné leve
- D. Acné moderado**

25. Paciente masculino de 24 años, interno rotativo de medicina tras una guardia nocturna hospitalaria con alta demanda de labores asistenciales y poca hidratación, a la mañana siguiente presenta mareo e inmediatamente pierde la conciencia por diez segundos y se recupera completamente. Lo examinan inmediatamente luego del evento con FC de 80 lpm. presión arterial 100/70 mmHg, sin ortostatismo, auscultación cardiopulmonar normal, el examen neurológico elemental es normal. Le realizan un hemoglucotest que reporta glucemia capilar de 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico inicial de este paciente?

- A. Hipoglicemia.
- B. Síncope.**
- C. Infarto cerebral.
- D. Crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas

26. Paciente de 20 años femenina, acude al centro de salud, por presentar corte e nivel de región frontal derecha de 3 centímetros de longitud , debido a golpe contuso contra una superficie de metal Como antecedente se observa cicatriz queloide e hipertrófica an hombro derecho (vacuna BCG) Requiere sutura. Que medidas usaria para prevenir este tipo de cicatrización por la sutura previa ?

- A. Corticoide intralesional preventivo**
- B. Eliminación de la Tensión, lociones de hidratación
- C. Braquiterapia con iridio 192
- D. Uso de tensión perpendicular o las líneas die Langer

27. Paciente de 20 años acude a su consulta por cefalea de 4 meses de evolución, El dolor se exacerba previo a su menstruación. Dice que heredó el dolor de su madre quien tuvo cefaleas parecidas desde la adolescencia hasta la menopausia. Le preocupa el dolor porque a un primo suyo, quien tuvo cefaleas muy similares a las suyas, le diagnosticaron recientemente un tumor cerebral, por lo que ella le solicita una TC o una RMN para descartar este diagnóstico. Al indagar, comenta que la cefalea es matutina, 8/10 en escala visual del dolor, de carácter pulsátil, localización temporal derecha, (a veces izquierda) que se generaliza a las pocas horas, perdiendo su carácter pulsátil, pero manteniendo la intensidad. Se acompaña de fotofobia, fotofobia y náuseas que llevan en ocasiones vómito con lo que cede parcialmente el dolor. Refiere que el dolor dura entre 4 y 6 horas, se presenta a intervalos entre 7 y 15 días. No comenta progresión del dolor u otros síntomas relacionados como fiebre, parestesias, vértigos, síntomas sistémicos, diplopía, alteración de la marcha y del

sensorio. No comenta trauma craneano o ingesta crónica de analgésicos. Al momento del examen físico y neurológico la paciente no presenta signos patológicos. La paciente le ha solicitado estudios de imagen. Cuál debe ser su decisión en función del cuadro señalado?

A. Solicitar la TC con base en las características del dolor: bilateral, generalizado acompañado de náusea y vómito.

B. Explicar a la paciente que se trata de una migraña común y que no requiere estudios de imágenes.

C. Solicitar una TC con base en el antecedente de cuadros similares en su madre y primo. además reflere a un especialista,

D. Solicitar la IC con base en la edad y sexo de la paciente, además es un cuadro de 4 meses con exacerbaciones previo a la menstruación,

28. Un paciente masculino de 28 años, acude a consulta por presentar desde hace tres días disfagia y odinofagia acompañado desde hace 24 horas de fiebre y escalofrío. A la exploración física presenta orofaringe hiperémica, amígdalas aumentadas de tamaño con criptas pustulosas bilateralmente; inmediatamente facultativo toma una muestra y envía para cultivo y antibiograma en el examen de laboratorio demuestra crecimiento *Streptococcus pyogenes*, sensible a la penicilina y ciprofloxacina, el médico prescribe penicilina procaínica y benzatínica intramuscular pese al deseo del paciente de no querer recibir medicamento con ese tipo de vía de administración, estableciendo que es mejor para el paciente y su bienestar este procedimiento. ¿Qué relación clínica se establece en este caso?

A. Paternalista

B. Interpretativo

C. Deliberativo

D. Informativo

29. Paciente de 2 meses de edad, traído por su madre a emergencias por fiebre e irritabilidad de 5 días de evolución. La fiebre es de 39 grados centígrados, varios picos al día, de difícil control con antitérmicos, se acompaña de gran irritabilidad. Acudió a pediatría, quien prescribió acetaminofén alternado con ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, paciente en regular estado general, irritable, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización infecciosa.

Exámenes: leucocitos 15.000/mm³, neutrófilos 70%, hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000/mm³, proteína C reactiva 100 mg/L, elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos ++, nitritos positivos, bacterias: bacilos gram negativos +++, urocultivo pendiente resultado. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente?

Seleccione una:

A. Hospitalizarlo sin antibióticos hasta recibir resultado de urocultivo.

B. Hospitalizarlo con ceftriaxona intravenosa.

C. Observarlo 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitalizarlo

C. Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.

30. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales de esquizofrenia según el DSM-5?

A. Delirios, alucinaciones y habla desorganizada

B. Ilusiones, pensamientos erróneos y tristeza

- C. Catatonia, verborrea e ilusiones
- D. Acumulacion, delirio bizarro y atracones

31. Un paciente de sexo masculino de 20 años sin antecedentes patologicos de importancia acude al servicio de emergencia. Refiere que hace un mes terminó la relación con su novia, dice tener toda la culpa y que sin ella no puede vivir. Dos horas antes del ingreso fue sorprendida por su madre tratando de cortarse las venas de las muñecas. No ingiere alcohol, drogas, ni medicación. Al examen físico no presenta lesiones o daños físicos, se puede concluir que es normal. Según el triage de Manchester. ¿Qué prioridad de atención tiene este paciente?

- A. prioridad 4
- B. prioridad 3 VERIFICAR**
- C. prioridad 1
- D. prioridad 2

32. ¿Cuál es la respuesta esperada al valorar los ojos del paciente a través de una luz?

- A. Las dos pupilas se contraen.**
- B. Las dos pupilas se dilatan.
- C. Las pupilas no reaccionan.
- D. Solo reacciona a la fuente de luz el ojo estimulado

33. Al realizar la antropometría a la señora NN, usted encuentra que tiene un peso de 60 kilos y una talla de 1.50 metros. Calcule el Índice de Masa Corporal (IMC)

- A. MC= 26.6**
- B. IMC= 40
- C. IMC= 2.5
- D. IMC= 90

34. Al controlar los signos vitales, usted encuentra que el paciente NN de 35 años de edad tiene: de pulso 39 por minuto, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, temperatura rectal 37.5 grados centígrados y una tensión arterial de 115/70. ¿De acuerdo al enunciado, cuáles son las constantes vitales del paciente?

- A. Normotérmico, normotenso, taquipneico, bradicárdico.**
- B. Hipotenso, bradicárdico, normotérmico, taquipnéico.
- C. Normotenso, hipertérmico, bradipneico, taquicárdico.
- D. Hipertenso, bradipneico, bradicárdico, hipertérmico.

35. La paciente NN es asmática y fumadora desde hace 15 años. Al realizar la Valoración como primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, en la necesidad de respirar normalmente según Virginia Henderson, presenta disnea, cianosis, sonidos respiratorios adventicios, produce esputo con frecuencia y tos inefectiva. ¿Cuál es el dominio alterado de la Taxonomía NANDA que usted debe identificar previo a la construcción del diagnóstico de Enfermería con formato PES?

- A. Dominio Seguridad/protección.**
- B. Dominio Confort.
- C. Dominio Principios vitales.
- D. Dominio Percepción/cognición

36. Paciente asmática y fumadora desde hace 15 años. Al realizar la Valoración como primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería, presenta disnea, cianosis, ruidos respiratorios adventicios, produce esputo con frecuencia y tos inefectiva. Cuál es la etiqueta diagnóstica que usted considera para la formulación del Diagnóstico real de Enfermería con formato PES?

A. Limpieza ineficaz de vías aéreas.

B. Riesgo de aspiración

C. Riesgo de asfixia

D. Deterioro de la integridad tisular

37. Cuando usted valora al paciente NN de 50 años de edad y le pregunta sobre la limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama. ¿Según los datos subjetivos, a que Dominio corresponde?

A. Dominio Actividad/Reposo

B. Dominio Principios vitales

C. Dominio Seguridad/protección

D. Dominio Confort

38. Paciente de 30 años, diagnosticado de neumonía, en su cuarto día de hospitalización ha recibido como parte de su tratamiento claritromicina IV, al momento de su administración indica dolor y sensación de calor a lo largo de la vena que comienza en el lugar de acceso de la vía periférica. Además, se observa enrojecimiento, lo que indicaría que existe una complicación potencialmente peligrosa. ¿Cuál de las complicaciones de la terapia intravenosa presenta el paciente?

A. Flebitis química.

B. Sobrecarga circulatoria.

C. Infiltración o extravasación.

D. Infección local.

39. Paciente de 45 años de edad, sexo masculino. Se encuentra en el área de Emergencia, por presentar: debilidad generalizada, náuseas y vértigo durante las últimas 24 horas; el médico indica administrar líquidos intravenosos, pero luego de realizar el procedimiento, el profesional en Enfermería observa que la piel alrededor del catéter esta tensa, blanqueada, fría al tacto y la perfusión se desaceleró. ¿Cuál es la complicación en esta terapia intravenosa?

A. Infiltración, extravasación.

B. Flebitis.

C. Infección local.

D. Sangrado en el sitio de la venopunción.

40. Paciente ingresa a emergencia producto de un accidente de tránsito, en la evaluación primaria se determina un Glasgow de 10/15, disnea, diaforesis, aleteo nasal, un patrón respiratorio anormal, para su manejo solicitan una gasometría arterial y los resultados encontrados son valores de PO₂ 40mmHg hipoxemia, PaCO₂ de 50 mmHg hipercapnia; por consiguiente, se identifica un deterioro en la ventilación perfusión. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería a la que hace referencia el enunciado?

A. Deterioro del intercambio de gases.

B. Deterioro de la ventilación espontánea.

- C. Patrón respiratorio ineficaz.
- D. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

41. Mujer de 18 años, cursa 32 semanas de gestación con embarazo gemelar, en el control prenatal registra productos de peso adecuado en relación a la edad gestacional, a la valoración de enfermería refiere pérdida de pequeñas cantidades de orina en forma esporádica al toser, estornudar y al realizar actividades habituales. ¿Qué etiqueta de diagnóstico enfermero considera acorde para este caso?

A. Incontinencia urinaria de esfuerzo.

- B. Incontinencia urinaria funcional.
- C. Incontinencia urinaria por rebosamiento.
- D. Incontinencia urinaria refleja

42. Al realizar la valoración de enfermería a un paciente adulto con herida penetrante en el hemitórax derecho, usted se percató que existe una marcada disminución del estado de conciencia y retracción del hemitórax afectado, inmediatamente realiza la monitorización y observa los siguientes datos: FR 30 respiraciones por minuto, FC 140 latidos por minuto, PA 70/35 mmHg y T 38.2 °C, sin embargo, a pesar de haber comprobado el correcto funcionamiento de todo el equipo, no se logra registrar el valor de la saturación de oxígeno ni de su curva pletismográfica. ¿Cuál es la causa que impide registrar este signo vital?

A. Disminución de la tensión arterial.

- B. Aumento de la frecuencia respiratoria.
- C. Ausencia del murmullo vesicular.
- D. Aumento de la temperatura.

43. Paciente con diagnóstico de infarto agudo de miocardio a la valoración de enfermería presenta efectos adversos a la medicación prescrita como miosis, náuseas, vómitos, disminución de la expansibilidad torácica y de la frecuencia respiratoria con presencia de apnea transitoria. Al observar el monitor se evidencia la presencia de bradicardia sinusal. ¿Qué medicamento ocasionó los signos y síntomas en el paciente?

A. Morfina.

- B. Nitroglicerina.
- C. Enoxaparina.
- D. Clopidogrel.

44. Paciente de 85 años es llevada al hospital por su hija, quien refiere que desde hace 4 días su mamá se encuentra débil y decaída con poco apetito y muy poca ingesta de líquidos. En la urgencia es valorada por un médico, quien verifica la presencia de mucosas orales secas, sin dificultad respiratoria, por lo que solicita exámenes de laboratorio. Los resultados de la gasometría arterial son: Na 142meq/L , K 2,9 meq/l , Cl 88 meq/l , Ph 7,50; PaCo₂ 24 mmHg; HCO₃ 34meq/l. Interprete los datos de laboratorio e identifique, ¿qué alteraciones del equilibrio ácido básico y electrolítico tiene la paciente?

A. Alcalosis metabólica mixta, hipopotasemia e hipocloremia.

- B. Acidosis metabólica, hiponatremia, hipopotasemia.
- C. Alcalosis respiratoria, hiperpotasemia, hipocloremia.
- D. Acidosis respiratoria, hipernatremia, hipocloremia

45. Paciente que acude al centro de salud para que le administren medicamentos prescritos por el médico. Antes de administrar la medicación, el profesional en Enfermería le pregunta ¿Cómo se siente?, ¿Tiene algún dolor?, ¿Tiene algún otro síntoma?. ¿Qué área de valoración orientan estas preguntas en la anamnesis?

A. Problema principal.

B. Antecedentes patológicos personales.

C. Antecedentes familiares.

D. Manejo de la salud.

46. La enfermería es una disciplina versátil que se esfuerza por satisfacer las necesidades fisiológicas, psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales de los pacientes; en el marco de la praxis los profesionales de enfermería manipulan el entorno del paciente para incluir: sonido, nutrición, higiene, luz, comodidad, socialización y esperanza. ¿A qué teoría corresponde a este enunciado?

A. Teoría de Nightingale.

B. Teoría de Orem.

C. Teoría de Leininger.

D. Teoría de Benner y Wrubel

47. En un centro de salud hay varios mecanismos de bioseguridad, uno de ellos es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados que aseguran la eliminación de las formas vegetativas, pero no elimina las esporas. ¿Qué mecanismo se aplica en este caso?

A. Desinfección.

B. Descontaminación.

C. Antisepsia.

D. Esterilización.

48. Hombre de 58 años con antecedentes de Diabetes Mellitus y asma, acude a la consulta al servicio de emergencias del hospital general, luego de haber sufrido un ataque de ansiedad, en la valoración se observa que presenta los siguientes síntomas; disnea, debilidad, mareo y confusión, además, el grado de recorrido de sus respiraciones se encuentra aumentado, a la exploración de los signos vitales se objetiva T 37 °C, R 30 rpm, P 98 lpm y presión arterial 140/80 mm/hg, sin otros hallazgos de interés. ¿Cuál de las alteraciones de la respiración presenta el paciente?

A. Hiperventilación.

B. Hipoventilación.

C. Taquipnea.

D. Bradipnea.

49. Preescolar es llevado por su madre a la consulta externa de un hospital pediátrico la cual refiere que presenta un sonido agudo que se escucha al pasar el aire a través de una vía aérea cuyo diámetro se ha reducido debido a broncoespasmo. ¿Cuál es el ruido pulmonar presente de acuerdo con la patología?

A. Sibilancias.

B. Soplo tubárico.

C. Crepitantes.

D. Estridores.

50. Cuando el personal de salud participa en la identificación de las necesidades de salud y de calidad de vida de la población, para establecer prioridades de atención por parte de los servicios de la comunidad. Escoja ¿Cuál es la alternativa correcta en que participa el personal de salud?

A. Planificación estratégica, participativa y programación operativa.

B. Programación de Salud.

C. Diagnóstico comunitario.

D. Coordinación intersectorial.

51. Una paciente con quemaduras de II grado en el 90% de su cuerpo, incluido labios y hemicara izquierda, tiene mucho dolor por lo que resulta complicado hacerle cambio de posición. Presenta: taquipnea, diaforesis, se siente caliente, tiene escalofrío, es imperativo tomarle la temperatura. ¿Qué zona del cuerpo es más conveniente para tomar la temperatura, en este caso?

A. Oído.

B. Oral.

C. Rectal.

D. Axilar.

52. Mujer de 55 años que ingresa al servicio de cirugía del hospital general, por intervención quirúrgica programada, en el preoperatorio se retiran objetos personales y prendas de vestir, colocando una bata antes de entrar al quirófano, luego de su ingreso y de permanecer unos minutos en la sala, la paciente manifiesta sentir frío ya que la temperatura ambiental se mantiene baja, se observa temblor muscular y "piel de gallina", sus signos vitales T 36 °C; P 92 lpm; R 20 rpm y PA 100/60 mm/Hg. Para poder aplicar cuidados específicos, el profesional de enfermería deberá reconocer ¿Cuál es el mecanismo que está provocando la pérdida de calor en la paciente?

A. Radiación.

B. Convección.

C. Evaporación.

D. Conducción

53. Como profesional de enfermería de un servicio hospitalario, usted debe identificar los medicamentos considerados de alto riesgo para realizar prácticas asistenciales seguras, garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la atención. ¿Cuál de los siguientes medicamentos pertenece a este grupo?

A. Insulina.

B. Dexametasona.

C. Hidroxicloroquina.

D. Haloperidol.

54. Paciente que ingresa en el Servicio de Urgencias en contra de su voluntad, presenta los siguientes síntomas: Náuseas, vómitos, disnea, hipertensión arterial y edemas. Además, se encuentra obnubilado, con diagnóstico de síndrome de Alport hace cinco años, presenta un claro déficit de autocuidado de naturaleza alta. Se adopta un sistema compensatorio total. El objetivo prioritario es salvar la vida del paciente y estabilizar las funciones vitales. Presenta dificultad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones de Auto cuidado. No hace uso de los recursos sanitarios adecuadamente, déficit a nivel de juzgar/actuar, no se posiciona en necesidad de ayuda, negación de su estado actual, patrón de eliminación inadecuado, déficit de conocimiento sobre la ingesta apropiada y gran desvío de su estado de salud: no diferencia salud ideal/salud real. ¿Cuál de las teorizantes se pone de manifiesto en el caso anterior?

- A. Virginia Henderson.
- B. Hildegard E. Peplau.
- C. Imogene M. King.
- D. Dorothea Orem.**

55. Un enfermero del servicio de cirugía, durante su turno de la noche olvida registrar la medicación analgésica luego de administrarla. Analice la situación e indique, ¿Qué principio ético se está vulnerado en el paciente?

- A. Beneficencia.
- B. Autonomía.
- C. No maleficencia.**
- D. Justicia.

56. Cuando un paciente experimenta dolor, el profesional de enfermería debe valorar las características del mismo, tomando en cuenta la clasificación según el tiempo de evolución del dolor, y poder realizar acciones encaminadas a disminuirlo. ¿Cuál es la clasificación que se menciona?

- A. Somático superficial.
- B. Agudo y crónico.**
- C. Somático profundo.
- D. Dolor visceral.

57. Florence Nightingale, indica que, dentro de los principios bioéticos, los profesionales de enfermería deben “abstenerse de todo lo que sea perjudicial o maligno y de tomar o administrar drogas sabiendo que puedan ser nocivas a la salud”. ¿A qué principio bioético se refiere?

- A. Principio de No maleficencia.**
- B. Principio de autonomía.
- C. Principio de beneficencia.
- D. Principio de justicia.

58. Esta teorizante, conceptualizó la función propia de la enfermería, que consistía en atender a la persona sana y enferma en sus actividades, para contribuir a su salud o recuperación, y las que realiza si tienen fuerza, voluntad y conocimientos necesarios, o ayudar a una muerte digna. ¿A qué teorizante se le atribuye esta definición?

- A. Virginia Henderson.**
- B. Nola Pender.
- C. Dorothea Orem.
- D. Florence Nightingale.

59. Paciente ingresa al servicio de emergencia a causa de un accidente de tránsito, mientras viajaba como conductor, a la valoración de enfermería consciente álgico con presencia de aleteo nasal, disnea, uso de los músculos respiratorios y deformidad de la pared torácica. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal para este caso?

- A. Deterioro del intercambio de gases.
- B. Riesgo de confusión aguda.
- C. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

D. Patrón respiratorio ineficaz.

60. Paciente ingresa al servicio de emergencia por presentar crisis de asma. A la valoración de Enfermería se observa confusión, aleteo nasal, disnea, en la gasometría se obtienen: pH 7.35, $PCO_2 > 50$ mmHg y además un desequilibrio en la ventilación-perfusión. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal para este caso?

- A. Deterioro del intercambio de gases.**
- B. Riesgo de confusión aguda.
- C. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz
- D. Deterioro de la ventilación espontánea

61. Paciente con antecedentes de diabetes, acude al hospital por presentar niveles de glicemia elevados, además indica vómito y dolor abdominal; durante el examen físico se identifica hipotensión, bradicardia, respiraciones profundas, regulares y aumentadas. ¿Cuál es la alteración del patrón respiratorio que presenta el paciente?

- A. Respiración de Biot.
- B. Respiración de Cheyne-Stokes.

C. Respiración de Kussmaul.

- D. Respiración atáxica.

62. Usted debe tomar la presión arterial de un paciente que ingresa al servicio de Medicina Interna, durante la auscultación se identifica un ruido tipo golpeteo rítmico claro y aumenta gradualmente en intensidad. De acuerdo a los ruidos de Korotkoff ¿Cuál es el ruido que se ausculta?

- A. Primer ruido.**
- B. Segundo ruido.
- C. Tercer ruido.
- D. Cuarto ruido.

63. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, acude al centro de salud para el control de rutina; durante la visita el médico decide cambiar su medicación habitual por Diltiazem 60mg cada 12 horas. ¿A qué grupo farmacológico pertenece el medicamento prescrito?

- A. Bloqueantes beta adrenérgicos.
- B. Antagonistas de los canales de calcio.**
- C. Inhibidores enzima convertidora de angiotensina
- D. Antagonistas de los receptores de aldosterona

64. Niño de 2 meses de edad es traído por su madre al centro de salud para revisión médica y vacunación. El médico lo revisa y autoriza la vacunación ya que cumple con un estado de salud adecuado. Al revisar el carnet de vacunación se observa que tiene aplicada la vacuna BCG y HB. De acuerdo al esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cuál es el esquema a aplicarse en este caso?

- A. Rotavirus, fIPV, Pentavalente y Neumococo Conjugada, primera dosis.**
- B. Difteria, tétanos y Tosferina (DPT).
- C. Sarampión, Rubeola, Parotiditis. (SRP). Primera dosis.

D. Vacuna bivalente oral contra la Polio (bOPV). Primera dosis.

65. En el área de Obstetricia, una paciente que está en el puerperio inmediato, presenta facies pálidas, agitación, dolor abdominal tipo cólico y loquios en escasa cantidad. La enfermera evidencia este particular, informa al médico de guardia y registra en su informe. ¿Qué concepto de pensamiento crítico muestra la enfermera?

A. Perseverancia.

B. Integridad.

C. Autoconfianza.

D. Capacidad de análisis.

66. De las actitudes y aplicaciones del pensamiento crítico en la práctica enfermera, una de ellas es solicitar ayuda si no se está seguro sobre cómo realizar alguna técnica. ¿A qué actitud hace referencia el enunciado?

A. Responsabilidad y autoridad.

B. Perseverancia.

C. Humildad.

D. Integridad.

67. Una paciente ingresada en el piso de Oncología, está en fase terminal por un cáncer de mama bilateral; el equipo médico indica que cualquier tratamiento sería inútil. La paciente ha expresado su voluntad de ir a casa para morir tranquila, sus familiares se oponen e insisten que se continúe el tratamiento; por lo cual, la enfermera sugiere que se haga una reunión familiar para aclarar los riesgos y que se respete la voluntad de la paciente. ¿Qué término básico de ética sanitaria, describe esta intervención de enfermería?

A. Beneficencia.

B. No maleficencia.

C. Justicia.

D. Autonomía.

68. Paciente con antecedentes de Artritis Reumatoidea diagnosticada hace 2 semanas, acude al centro de salud por presenta dolor a nivel de articulaciones, refiere además quemazón, hormigueo y sensibilidad al frío en sus extremidades inferiores. De acuerdo a la valoración de enfermería. ¿Cuál es el tipo de dolor que presenta el paciente?

A. Dolor somático.

B. Dolor neuropático.

C. Dolor continuo.

D. Dolor irruptivo.

69. Paciente post-quirúrgico de Apendicetomía, en su fase de recuperación presenta un dolor severo de 9/10 de intensidad, el médico prescribe un analgésico opioide por la intensidad del dolor. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿Cuál es el medicamento que pertenece a este grupo farmacológico?

A. Paracetamol.

B. Ketorolaco.

C. Fentanilo.

D. Diclofenaco.

70. Paciente mujer de 52 años que llega al servicio de urgencias de un hospital, refiere que desde hace un día presenta fiebre con dolor en la parte baja del abdomen y espalda, disuria, malestar general. El médico le valora y solicita toma de muestra de orina limpia, en mitad de la micción. ¿Qué intervención corresponde a la fase de planificación del proceso de atención de enfermería, en este caso?

A. Explicar el procedimiento al paciente.

B. Proporcionar intimidad al paciente cerrando la puerta o la cortina.

C. Evaluar el estado miccional del paciente.

D. Evaluar la comprensión del paciente sobre la finalidad de la prueba y el método de recogida

71. El señor NN de 50 años de edad acude al servicio de Emergencia por presentar molestias al orinar desde hace varios días, es valorado y diagnosticado por el médico, con incontinencia urinaria secundario a hipertrofia prostática. ¿Qué intervención de enfermería, corresponde a este caso?.

A. Sondar si existe orina residual según proceda.

B. Dar tiempo suficiente para que se vacíe la vejiga (10 min).

C. Aplicar un sondaje intermitente según proceda.

D. Vigilar la eliminación de la orina, incluida su coherencia, olor, volumen y color.

72. El señor NN de 50 años de edad acude al servicio de Emergencia por presentar molestias al orinar desde hace varios días, es valorado y diagnosticado por el médico, con incontinencia urinaria secundario a hipertrofia prostática. ¿Qué intervención de enfermería, corresponde a este caso?.

A. Vigilar la eliminación de la orina, incluida su coherencia, olor, volumen y color.

B. Sondar si existe orina residual según proceda.

C. Dar tiempo suficiente para que se vacíe la vejiga (10 min).

D. Aplicar un sondaje intermitente según proceda.

73. Paciente ingresa al servicio de Ginecología con diagnóstico de Pielonefritis, el médico para su tratamiento le pide administrar Ciprofloxacina 400mg intravenosa cada 12 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?.

A. Macrólidos

B. Aminoglucósidos

C. Fluoroquinolona

D. Cefalosporina

74. Paciente hospitalizado en el servicio de Terapia Intensiva con diagnóstico de Septicemia, el médico para su tratamiento le pide administrar Vancomicina 500mg intravenoso cada 6 horas. Usted como personal de enfermería debe conocer del medicamento para evitar efectos adversos. ¿A qué grupo farmacológico pertenece este medicamento?

A. Glicopéptidos

B. Fluoroquinolona

C. Macrólidos

D. Aminoglucósidos

75. Usted realiza una visita domiciliaria, y durante la valoración detecta un paciente que presenta los siguientes síntomas: depresión, miedo a su alrededor y a sus familiares, incapacidad de afrontar problemas de la vida diaria y como consecuencia hostilidad y violencia. Para su intervención debe basar su actuación en un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que utilizaría en este caso?

- A. Jean Watson
- B. Virginia Henderson
- C. Dorothea Orem
- D. Hildegard Peplau**

76. En el servicio de consulta externa debe planificar una charla educativa sobre hipertensión arterial dirigida a los pacientes que reciben atención en esta casa de salud, para su intervención debe basar su actuación en un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que utilizaría en este caso?

- A. Hildegard Peplau
- B. Virginia Henderson
- C. Dorothea Orem
- D. Nola Pender**

77. Usted como personal de Enfermería debe proteger el derecho individual a la intimidad, tratar a los pacientes como ellos prefieran, mantener la confidencialidad y respeto, independiente de los antecedentes personales. De acuerdo a los valores y conductas de la profesión. ¿Cuál es el valor esencial que aplicaría en este caso?

- A. Dignidad Humana**
- B. Altruismo
- C. Igualdad
- D. Justicia

78. Usted como personal de Enfermería debe actuar como un defensor de la atención sanitaria, distribuir los recursos de manera adecuada, informar de la práctica incompetente de forma objetiva e imparcial a los líderes de servicio. De acuerdo a los valores y conductas de la profesión. ¿Cuál es el valor que aplicaría referente a este caso?

- A. Dignidad Humana
- B. Altruismo
- C. Igualdad
- D. Justicia**

79. Como personal de Enfermería brinda atención a los pacientes respetando las necesidades individuales con independencia de las características personales, trabaja con otros profesionales para priorizar el acceso a la atención. De acuerdo a los valores y conductas de la profesión. ¿Cuál es el valor esencial que aplicaría en este caso?

- A. Igualdad**
- B. Justicia
- C. Dignidad Humana
- D. Altruismo

80. Paciente hospitalizada con diagnóstico de Trombosis Venosa Profunda, el médico para su tratamiento le solicita administrar Heparina sódica 10.000 UI intravenoso cada 24 horas, en el servicio cuenta con una presentación de 25.000 UI/5 ml. ¿Cuántos ml debe administrar?

- A. 1 ml
- B. 3 ml
- C. 4 ml
- D. 2 ml**

81. Durante su práctica habitual debe iniciar el proceso enfermero para el cuidado de un paciente, establecer prioridades, elaborar objetivos y determinar los cuidados de enfermería. ¿Cuál es la etapa del proceso de atención de enfermería que hace referencia el enunciado?

- A. Valoración
- B. Planeación**
- C. Diagnóstico
- D. Ejecución

82. Paciente ingresa al servicio de Emergencia por presentar agitación, piel fría y pálida, presión arterial de 80/40mmHg, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 por minuto; de acuerdo al diagnóstico médico le indican que el paciente presenta un Shock Hipovolémico. ¿Cuál sería la intervención de enfermería principal para este caso?

- A. Administrar oxigenoterapia y reposición de líquidos para mejorar la perfusión.**
- B. Apoyar la acción del bombeo del corazón y administración de medicamentos.
- C. Valorar el estado de conciencia y la disminución o ausencia de gasto urinario.
- D. Monitorizar la frecuencia respiratoria y mejorar la capacidad del sistema vascular.

83. Ingres a al servicio de quemados un paciente con lesiones térmicas producida por el derrame de líquido caliente. Al examen físico se observa al paciente consciente, signos vitales en parámetros normales se identifica una quemadura de tercer grado en abdomen y miembro inferior derecho con una superficie corporal quemada del 27%. ¿Cuál es la intervención de enfermería principal en este caso?

- A. Administrar líquidos para la reanimación y control de gasto urinario.**
- B. Establecer una vía aérea y la ventilación del paciente.
- C. Valorar el nivel de conciencia y control de signos de alarma.
- D. Controlar la gasometría arterial y monitorización cardíaca.

84. Sujeto de cuidado que laboró durante 20 años como operario en la industria cementera y desde hace aproximadamente 3 años manifiesta cuadro clínico caracterizado por disnea, tos irritativa y estertores secos; en su visita al médico ocupacional se le diagnostica neumoconiosis por asbesto. ¿Qué teoría explica este tipo de cambio en el proceso salud y enfermedad?

- A. Virginia Henderson.
- B. Dorothea Orem.
- C. Nola Pender.
- D. Florence Nightingale.**

85. Paciente de 35 años ingresa al área de emergencia manifestando dolor intenso en hemitórax derecho acompañado de disnea por esfuerzo, la cual progresa hasta convertirse en una disnea tipo trepopnea. ¿En qué posición se dificulta la respiración del sujeto de cuidado?

A. Decúbito lateral.

B. Bipedestación.

C. Decúbito ventral.

D. Decúbito dorsal.

86. Paciente con antecedentes de TB Pulmonar, acude al Centro de Salud por sus exámenes de control, en los resultados se observa una resistencia simultánea a la Isoniacida y Rifampicina. ¿Cuál es el tipo de resistencia que presenta el paciente?

A. Monorresistencia

B. Polirresistencia.

C. Multidrogorresistencia

D. Extensamente resistente.

87. Paciente acude al centro salud, para solicitar información sobre planificación familiar, a pesar de que su pareja no está de acuerdo; usted como profesional de enfermería debe indicarle a la pareja la importancia de decidir sobre la formación de una familia. ¿Cuál es el tipo de enfoque que hace referencia el enunciado?

A. Enfoque de Inclusión Social.

B. Enfoque de Igualdad.

C. Enfoque de Sexualidad Integral.

D. Enfoque de Género.

88. Durante la visita domiciliaria a pacientes de la comunidad, usted detecta una familia con poco acceso a servicios básicos como luz, agua, alcantarillado, lo que dificulta mantener un entorno saludable para su recuperación. Su intervención debe basarse en un modelo de Enfermería. ¿Qué teorizante utilizaría para este caso?

A. Florence Nightingale.

B. Nola Pender.

C. Virginia Herderson.

D. Hildegart Peplau.

89. Usted como líder de servicio de Urgencias, al presentarse algún evento adverso realiza la notificación, independientemente de su tipología y gravedad. ¿Cuál es la característica, de los sistemas de notificación de eventos adversos, que está aplicando?

A. Capacidad de respuesta.

B. Orientación sistémica.

C. Análisis por expertos.

D. Independiente.

90. Como enfermera del centro de salud entre sus actividades, es educar a las personas que reciben atención en la unidad, para lo cual debe planificar una charla educativa sobre Diabetes, como una estrategia para evitar el alto índice de las enfermedades crónicas. Su intervención debe basarse en un modelo de Enfermería. ¿Qué teorizante aplicaría en este caso?

A. Florence Nightingale.

B. Virginia Herderson.

C. Dorothea Orem.

D. Nola Pender.

91. En el servicio de Medicina Interna, recibe un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, que permaneció en urgencias 12 horas por una crisis hipertensiva. Luego de su estabilización debe ser controlado en hospitalización. El paciente está consciente, al deambular se apoya en los muebles, su marcha es débil, se encuentra con una solución intravenosa de mantenimiento. En el caso descrito ¿Cuál es la puntuación final de acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse?

A. 50 puntos.

B. 65 puntos

C. 75 puntos.

D. 45 puntos.

92. En el servicio de Medicina Interna, recibe una paciente de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que permaneció en urgencias 12 horas por una descompensación. Luego de su estabilización debe ser controlada en hospitalización. La paciente está consciente, su marcha es débil, se encuentra con una solución intravenosa de mantenimiento. ¿Cuál es la puntuación final de acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse?

A. 45 puntos.

B. 50 puntos.

C. 65 puntos.

D. 75 puntos.

93. Como profesional de Enfermería de un servicio hospitalario, al valorar la función respiratoria de un paciente de 50 años, usted observa que la respiración es anormalmente profunda, regular y con frecuencia aumentada. En su informe. ¿Cómo reporta esta alteración del patrón respiratorio?

Respuestas:

A. Respiración de Biot.

B. Hipoventilación.

C. Respiración de Cheyne-Stokes.

D. Respiración de Kussmaul.

94. Como profesional de Enfermería, usted va a esterilizar instrumentos y materiales, utilizando calor seco. Luego de alcanzada la temperatura requerida. ¿Qué tiempo es necesario para la esterilización por calor seco, a una temperatura de 180°C?

Respuestas:

A. 60 minutos.

B. 120 minutos.

C. 30 minutos.

D. 150 minutos.

95. Como profesional de Enfermería, usted va a esterilizar instrumentos y materiales, utilizando calor seco. Luego de alcanzada la temperatura requerida. ¿Qué tiempo es necesario para la esterilización por calor seco, a una temperatura de 170°C?

Respuestas:

A. 60 minutos.

B. 120 minutos.

C. 150 minutos.

D. 180 minutos.

96. Usted como profesional de Enfermería, administra hidralazina de 25 mg VO a un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial; conoce que el medicamento actúa sobre

el músculo liso arteriolar para provocar relajación y reducir la resistencia vascular periférica.
¿Qué tipo de antihipertensivo está administrando en este caso?

Respuestas:

A. Vasodilatadores.

B. Diuréticos.

C. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).

D. Bloqueantes de los canales de calcio.

97. Usted como profesional de Enfermería, administra espironolactona de 25mg VO a un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial; conoce que el medicamento baja la presión arterial reduciendo la reabsorción del sodio y agua por los riñones, disminuyendo así el volumen del fluido circulatorio. ¿Qué tipo de antihipertensivo está administrando en este caso?

Respuestas:

A. Bloqueantes de los canales de calcio.

B. Bloqueantes beta adrenérgicos.

C. Vasodilatadores

D. Diuréticos.

98. Paciente ingresa al servicio de Urgencias con traumatismo maxilofacial, a su llegada se evidencia obstrucción de la vía aérea por presencia de un cuerpo extraño, el paciente se mantiene letárgico, taquipneico, cianótico, disneico, a la auscultación disminución de los sonidos respiratorios lo que dificulta la permeabilidad de la vía aérea, para su intervención debe basarse en un diagnóstico enfermero centrado en el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario del acuerdo al caso?

Respuestas:

A. Patrón respiratorio ineficaz.

B. Deterioro de la ventilación espontánea.

C. Limpieza ineficaz de la vía aérea.

D. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.

99. En el servicio de Medicina Interna, usted valora a una paciente de 60 años, que presenta presión arterial =160/110 mmHg, el resultado de su examen de hematocrito es de 56%. ¿Qué variable hemodinámica relacionada con la fisiología de la presión arterial sanguínea está alterada en este caso?

Respuestas:

A. Viscosidad.

B. Gasto cardíaco.

C. Resistencia periférica.

D. Volumen de sangre.

100. Paciente de 35 años con antecedentes de hipertensión arterial, presenta un embarazo de 20 semanas de gestación, acude al control prenatal y monitoreo de la tensión arterial porque en los últimos meses ha presentado cifras altas de presión. ¿Cuáles son las recomendaciones durante la toma de este procedimiento?

Respuestas:

A. Paciente sentada, tensiómetro digital con manguito grande y apropiado que cubra la circunferencia del brazo.

B. Paciente sentada, con el brazo por debajo del nivel del corazón, tensiómetro digital con manguito que cubra el brazo.

C. Paciente acostada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 2,5 veces de la circunferencia del brazo.

D. Paciente sentada, tensiómetro aerobio con manguito que cubra 1,5 veces de la circunferencia del brazo.

101. Paciente con antecedentes de discapacidad postraumática, acude al centro de salud por presentar ansiedad, sentimientos de tristeza y además indica pérdida de interés por su familia en los últimos meses. Usted debe brindarle una atención integral utilizando un modelo de enfermería. ¿Cuál es la teorizante que aplicaría en este caso?

Respuestas:

A. Dorothea Orem.

B. Nola Pender.

C. Jean Watson.

D. Virginia Henderson.

102. Luis de 40 años acude a la emergencia por presentar palpitaciones, debilidad, dolor, presión del pecho, fatiga y mareos, al realizarle un electrocardiograma se identifica una fibrilación ventricular, para el manejo le piden administrar una dosis inicial de un antiarrítmico. ¿Cuál es el medicamento que pertenece a este grupo farmacológico?

Respuestas:

A. Adrenalina.

B. Dopamina.

C. Atropina

D. Amiodarona.

103. Como profesional de Enfermería del servicio de Urgencias, al valorar la función respiratoria de un paciente de 65 años, usted observa que la frecuencia respiratoria es anormalmente baja y la profundidad de la respiración está deprimida. Los resultados de la gasometría reportan hipercapnia. En su informe. ¿Cómo reporta esta alteración del patrón respiratorio?

Respuestas:

A. Respiración de Biot

B. Hipoventilación.

C. Hiperventilación.

D. Respiración de Cheyne-Stokes.

104. Paciente con diagnóstico de Bronquitis permanece con oxigenoterapia por mascarilla. Durante el turno de la mañana presenta secreciones en abundante cantidad, una de sus intervenciones es realizar examen físico como: auscultación del tórax donde se identifica sonidos fuertes, de tono bajo, retumbantes que se escuchan durante la espiración en campos pulmonares. ¿Cuál es el ruido adventicio que presenta el paciente?

Respuestas:

A. Crepitantes.

B. Sibilancias.

C. Estertores.

D. Roncus.

105. Paciente acude a la consulta por presentar: dificultad para respirar, fiebre, tos que moviliza secreciones y dolor precordial. A la exploración física del tórax se ausculta sonidos de tono alto, ligeros que se escuchan al final de la inspiración a nivel de base derecha del pulmón. ¿Cuál es el ruido adventicio que presenta el paciente?

Respuestas:

A. Roncus.

B. Crepitantes.

C. Sibilancias.

D. Estridor.

106. El profesional de enfermería para el cuidado integral de la persona, familia o comunidad; utiliza la implementación de las etapas del proceso de atención de enfermería que se interrelacionan entre sí para el logro del objetivo alcanzado. ¿A que característica del proceso hace referencia el enunciado?

Respuestas:

A. Dinámico.

B. Sistemático.

C. Interactivo.

D. Flexible.

107. Como profesional de enfermería, se encuentra preparando a un niño de 2 años para la consulta médica. Usted valora la función respiratoria con la medición objetiva del estado respiratorio. ¿Cuál es el rango normal de la frecuencia respiratoria en este caso?

Respuestas:

A. 22 - 37 respiraciones por minuto.

B. 40 - 60 respiraciones por minuto.

C. 18 - 25 respiraciones por minuto.

D. 12 - 20 respiraciones por minuto.

108. Como profesional de Enfermería del servicio de Oncología, usted se encuentra valorando a un paciente de 48 años con diagnóstico de cáncer de pulmón. Durante la entrevista, el paciente evita la conversación sobre la enfermedad, indica que se encuentra bien ¿En qué etapa de la adaptación psicosocial a la enfermedad se encuentra este paciente?

Respuestas:

A. Negación.

B. Ira.

C. Negociación.

D. Resolución.

109. Durante su turno en la noche en un servicio hospitalario, en el momento de administrar la medicación se da cuenta que un paciente no se encuentra en su habitación; procede a buscarlo con el personal del servicio sin tener éxito. A la mañana siguiente, usted notifica este evento sin temor a represalias. ¿Cuál es la característica de notificación de eventos adversos que está aplicando?

Respuestas:

A. Voluntario.

B. Independiente.

C. No punitivo.

D. Confidencial.

110. Paciente acude a un centro de salud para control de hipertensión, luego de 3 horas de espera y ante el reclamo del paciente, es atendido; le entregan la medicación para un mes y en la postconsulta le dan indicaciones sobre el tratamiento y la próxima cita. ¿Qué derecho se ha vulnerado en este caso?

Respuestas:

A. Derecho a una atención digna.

B. Derecho a no ser discriminado.

C. Derecho a la confidencialidad.

D. Derecho a la información.

111. Paciente ingresa con antecedentes de insuficiencia valvular aórtica. El personal de enfermería debe realizar el examen físico para determinar algún sonido cardíaco anómalo que se origina a nivel de la aorta, para la cual debe utilizar técnicas de auscultación de focos cardíacos. ¿Cuál es la localización de este foco cardíaco o aórtico que hace referencia el enunciado?

Respuestas:

A. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.

B. Tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda.

C. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha.

D. Mitad inferior del esternón a lo largo de la línea paraesternal izquierda.

112. Usted como líder de un servicio hospitalario, se encuentra demostrando el procedimiento de lavado de manos a un grupo de estudiantes de Enfermería que ingresan a realizar sus prácticas en el servicio. Al indicar que el procedimiento lo debe realizar antes de una tarea limpia o aséptica ¿A qué momento de la higiene de manos se refiere?

Respuestas:

A. Momento 1

B. Momento 4

C. Momento 2

D. Momento 5

113. Paciente masculino de 78 años, asiste al servicio de emergencia del Hospital Básico por presentar trastornos en la micción, aumento de volumen en región suprapúbica y dolor. El familiar que lo acompaña manifiesta antecedentes de salud que lo han llevado al encamamiento prolongado, incontinencia urinaria y tratamiento con sondaje vesical permanente. Luego de la valoración realizada al usuario, el especialista indica al profesional de enfermería el cambio de la sonda vesical para evacuar vejiga y mejorar los síntomas que presenta. ¿Cuál es la sonda vesical indicada para este paciente?

Respuestas:

A. Tamaño 22cm, #20 Fr, tres vías.

B. Tamaño 30cm, #18 Fr, dos vías.

C. Tamaño 40 cm, # 18 Fr, dos vías.

D. Tamaño 15 cm, # 10Fr, dos vías.

114. Paciente de 70 años acude al servicio de emergencia por presentar dificultad respiratoria, ortopnea, mucosidad excesiva y tos con expectoración viscosa. ¿Cuál etiqueta diagnóstica el enfermero prioriza en este caso clínico?

Respuestas:

- A. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.**
- B. Perfusión tisular periférica ineficaz.
- C. Deterioro del intercambio de gases.
- D. Patrón respiratorio ineficaz.

115. Un paciente ingresa a un servicio hospitalario. Como parte de su cuidado, Usted obtiene información durante la entrevista al paciente y al realizar el examen físico; luego, organiza, analiza y resume los datos obtenidos. ¿A qué etapa del proceso enfermero corresponden estas acciones?

Respuestas:

- A. Diagnóstico.
- B. Planificación.
- C. Ejecución.
- D. Valoración.**

116. Paciente acude al hospital por presentar anorexia, náuseas, vómitos, letargo, debilidad, y signos de tetania, el médico solicita exámenes de laboratorio y decide ingreso con diagnóstico de hipomagnesemia grave, para su tratamiento le indica administrar 4gr de sulfato de magnesio, usted cuenta en el servicio con una presentación de 20%/10ml. ¿Cuántas ampollas (ml) administra?

Respuestas:

- A. 1 ampolla (10ml).
- B. 1.5 ampollas (15ml).
- C. 0.5 ampolla (5 ml).
- D. 2 ampollas (20 ml).**

117. La hipertensión arterial es una de las principales causas desencadenantes de las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y renales, por lo que el profesional de enfermería debe tener los conocimientos básicos de la clasificación por estadios de la presión arterial, que le permitan realizar una prevención, un diagnóstico enfermero precoz, control y un seguimiento correcto. Teniendo en cuenta la Guía Práctica Clínica de Ecuador del año 2019. ¿Cuál es la clasificación según los estadios de la presión arterial en un paciente que acude al centro de salud y se constata 160/100 mmHg?

Respuestas:

- A. Normal alta.
- B. Hipertensión grado 2.**
- C. Hipertensión grado 1.
- D. Hipertensión grado 3.

118. El ESAMyN es la Normativa Sanitaria para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño, se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna, consta de cuatros componentes y 24 pasos. ¿Cuál de los pasos corresponde al componente (B)?

Respuestas:

A. Captar y controlar a madres embarazadas y asegurar el tratamiento de las mujeres en riesgo.

B. Capacitar y dar a conocer la norma en el establecimiento de salud.

C. Garantizar un ambiente acogedor y el respeto de práctica interculturales.

D. Permitir el acompañamiento por una persona de elección de la madre antes, durante y después del parto.

119. Sujeto de cuidado masculino de 33 años, con antecedentes de hipertensión arterial, acude a consulta externa para su valoración nutricional, para lo cual los profesionales de enfermería mesuran su antropometría, remitiendo los siguientes datos: IMC: 30.8, Perímetro de cintura: 105cm y Circunferencia de la Cadera: 73cm. ¿Cuáles son los resultados de la valoración nutricional reflejados en el sujeto?

Respuestas:

A. Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

B. Se evidencia una obesidad clase III, distribución de grasa tipo androide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

C. Se evidencia una obesidad clase II, distribución de grasa tipo androide y no existe riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

D. Se evidencia una obesidad clase I, distribución de grasa tipo ginoide y riesgo de morbimortalidad cardiovascular.

120. Sujeto de cuidado femenino de 76 años, que llega al servicio de neurología manifestando que hace 2 meses le aparecieron movimientos involuntarios, repentinos e impredecibles como cierre y apertura de las manos y flexión y extensión de los pies, los cuales no tienen un ritmo específico y desaparecen durante el sueño y aumentan las preocupaciones del hogar. Hace 15 días percibe otras molestias como la protrusión de los labios como si lanzara besos; hace tres días refiere que emergieron movimientos violentos e involuntarios en el brazo y pierna derecha con dolores musculares y articulares, por lo que decide consultar. ¿Cuáles de las manifestaciones clínicas son tipificadas como subjetivas?

Respuestas:

A. Mialgias intensas y artralgias.

B. Temblores en extremidades con hemibalismo derecho.

C. Movimientos coreicos en extremidades y monobalismo superior derecho.

D. Protrusión de la comisura labial y mialgias intensas.

121. Paciente de 58 años de edad que acude a la consulta por presentar cuadro clínico de 72 horas de evolución caracterizado oliguria, hipercoloria y leve edema bi-maleolar bilateral que cede con cambios posicionales; el personal de enfermería valora los signos vitales encontrando una presión arterial de 160/90mmHg y al analizar el resultado del Examen de orina se reflejan Proteínas= + Hematíes= campo lleno. ¿Qué síndrome clínico presenta el usuario?

Respuestas:

- A. Síndrome nefrótico
- B. Síndrome de Insuficiencia renal aguda
- C. Síndrome de Insuficiencia renal crónica
- D. Síndrome nefrítico**

122. Paciente de 32 años de edad, acude a la consulta por presentar un cuadro de cuatro días de evolución, caracterizado por eritema perioral. El paciente es evaluado en un comienzo en forma ambulatoria y tratado con medidas generales y una asociación de antihistamínicos y corticoides orales. El cuadro persiste y dos días más tarde se agrega exantema de mejillas y cuello, hiperestesia cutánea y aparición de vesículas y pústulas, al examen físico presión arterial 120/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 37°C. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- A. 00004 Riesgo de infección.
- B. 00046 Deterioro de la integridad cutánea.**
- C. 00086 Riesgo de disfunción neurovascular periférica.
- D. 00044 Deterioro de la integridad tisular.

123. Paciente de 21 años, que ingresa en el Servicio de emergencia por presentar un golpe en la cabeza producto de realizar una instalación eléctrica, siendo atendido por el especialista evidenciando un hematoma a nivel del hipotálamo, a la valoración de enfermería en el turno de la mañana evidenciándose al examen físico presión arterial 120/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 82 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 36°C, en el turno de la tarde, presión arterial 110/70 mm Hg; frecuencia cardíaca 80 latidos/min, frecuencia respiratoria 20/min y saturación de oxígeno arterial en 98%, temperatura 38°C, en la exploración complementaria una analítica normal. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- A. 00006 Hipotermia
- B. 00007 Hipertermia
- C. 00008 Termorregulación ineficaz**
- D. 00217 Riesgo de reacción alérgica.

124. Paciente de 41 años, con diagnóstico reciente desde hace 2 meses de demencia senil, con tratamiento, que acude a urgencias por presentar alucinaciones y agitación. Se ingresa en el servicio de neurocirugía para valoración evidenciándose torpeza progresiva para la marcha, disfunción de esfínteres y desorientación de una semana de evolución. Al interrogatorio con antecedentes personales hipertensión arterial y familiares, dos hermanos con demencia tipo Alzheimer, además exploración complementaria una analítica normal. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica de enfermería que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

- A. 00128 Confusión aguda.**
- B. 00129 Confusión crónica.
- C. 00131 Deterioro de la memoria.
- D. 00222 Control de impulsos ineficaz.

125. Mujer de 54 años, atendida en emergencia por dolor torácico de 1 hora de evolución. A la valoración: paciente álgica, presenta disnea, temor, ansiedad, TA= 150/ 90mmHg, FC= 110X', FR= 32 X', SaO2= 93% con O2 3 litros x'. Se le realiza un electrocardiograma en el que se aprecian cambios en el segmento ST. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en este caso?

Respuestas:

A. Aliviar el dolor.

B. Monitorizar signos vitales.

C. Mantener al paciente en decúbito dorsal.

D. Controlar ingesta y excreta.

126. Paciente de 50 años, diagnosticado de Cirrosis hepática alcohólica, es atendido en el servicio de Medicina Interna. En el momento de la valoración se encuentra en reposo, presenta ascitis, ictericia generalizada, debilidad, anorexia, IMC= 16, TA= 100 /60mmHg. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritaria en esta situación?

Respuestas:

A. Evaluar el estado nutricional.

B. Controlar ingesta y excreta.

C. Valorar el nivel de tolerancia a la actividad.

D. Valorar la integridad de la piel.

127. Paciente de 36 años, acude al servicio de emergencia por presentar astenia, dolor abdominal, deposiciones diarreicas de características líquidas 5 veces diarias. Para su tratamiento le solicita administrar Solución Salina 0,9% 1000ml IV cada 8 horas. ¿Cuál es la velocidad de perfusión para la administración en bomba de infusión?

Respuestas:

A. 125 ml/h

B. 83 ml/h

C. 41 ml/h

D. 166 ml/h

128. Paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude al hospital por presentar cefalea de moderada intensidad y presión arterial de 170/110mmHg, como causa aparente conflictos familiares. Además, indica dificultad para seguir con el tratamiento prescrito por el médico. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica que priorizaría en el paciente?

Respuestas:

A. Gestión ineficaz de la salud.

B. Mantenimiento ineficaz de la salud.

C. Protección ineficaz.

D. Síndrome de fragilidad del anciano.

129. Para participar con acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades y solución de problemas inherentes al equilibrio hidroelectrolítico, el personal de enfermería realiza los siguientes cuidados: observar la alimentación, vigilar ingesta de líquidos, estado de piel y mucosas, eliminación urinaria e intestinal y sus alteraciones, y control de signos vitales. ¿Qué acción aplicaría para el control de la ingesta y excreción de líquidos?

Respuestas:

A. Medir los líquidos que ingresan al organismo solamente administrados por vía oral.

- B. Hacer balance correspondiente en 6 horas, anotando horario de inicio y final.
- C. Medir los líquidos que ingresan al organismo por vía parenteral.
- D. Medir los líquidos que egresan de cualquier parte del organismo.**

130. El personal de salud debe identificar el modo de transmisión de enfermedades infecto contagiosas y los tipos de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué patología es transmitida por gotas?

Respuestas:

- A. Neumonía.**
- B. Tuberculosis.
- C. Rubeola.
- D. Sarampión.

131. Luego de administrar un medicamento, el profesional de enfermería debe evaluar el efecto esperado del medicamento en el paciente. ¿A qué corresponde, en la administración de medicamentos, esta acción?

Respuestas:

- A. Respuesta correcta.**
- B. Forma correcta.
- C. Registro correcto.
- D. Acción correcta.

132. Paciente de 50 años, atendida en emergencia, refiere dolor a nivel abdominal y no realiza deposición hace 5 días. A la valoración presenta signos vitales dentro de parámetros normales. Le prescriben enema evacuante. ¿Cuál es la posición para realizar este procedimiento?

Respuestas:

- A. Decúbito ventral
- B. Sims Izquierdo.**
- C. Decúbito supino.
- D. Genucubital.

133. Paciente con diagnóstico de esquizofrenia con tratamiento de Haloperidol, vía oral cada 8 horas. Durante su turno se presenta un error con el medicamento, al administrar en su lugar Alopurinol. Por lo tanto, usted decide libremente notificar este evento. ¿Cuál es el sistema de notificación que está aplicando en este caso?

Respuestas:

- A. No punitivo.**
- B. Confidencial.
- C. Independiente.
- D. Capacidad de respuesta.

134. Al centro de salud llega un adulto joven de 33 años, quien es traído por su esposa en contra de su voluntad, debido a que presenta ideas suicidas y manifiesta que escucha voces y en varias ocasiones demuestra estados depresivos desde aproximadamente 24 días. ¿Qué tipo de valoración de enfermería es la más adecuada para este caso?

Respuestas:

- A. Valoración cefalo-caudal.

B. Valoración urgente.

C. Valoración repetida.

D. Valoración por sistemas.

135. Durante la visita a la comunidad, se identifica un adulto mayor de 78 años que vive solo y en precarias condiciones. Al interrogatorio el paciente refiere comer una sola vez al día. Al examen físico presenta dificultad para caminar. Signos vitales: PA: 90 /60 mmHg, FC: 100 lpm, T° 36 °C, IMC: 15. ¿Qué factor influye en la alteración de la temperatura corporal de este paciente?

Respuestas:

A. Hormonas.

B. Estrés.

C. Entorno.

D. Edad.

136. Paciente de 45 años, se encuentra hospitalizado en el área de medicina interna por insuficiencia renal aguda. En la visita médica es diagnosticado de conjuntivitis bacteriana aguda y se le prescribe instilación oftálmica de gentamicina 2 gotas cada 8 horas. Antes de la aplicación se debe preparar el medicamento. ¿Cuál es el primer paso para realizar la aplicación de la instilación oftálmica?

Respuestas:

A. Razón del medicamento.

B. Preparar al paciente.

C. Comprobar el Registro de Administración de Medicamentos.

D. Limpiar el párpado.

137. Los profesionales de enfermería tienen la mente abierta hacia la consideración de métodos diferentes de hacer diversas técnicas, no solo las que aprendieron en la facultad. No se ven influidos fácilmente por las opiniones de otros, sino que mantienen la responsabilidad sobre sus propios puntos de vista. ¿Cuál es la actitud al que se hace referencia?

Respuestas:

A. Independencia.

B. Imparcialidad.

C. Integridad.

D. Perseverancia.

138. Paciente de 52 años con diabetes mellitus tipo I, de más de 40 años de evolución, con vasculopatía y retinopatía diabética, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, usa habitualmente heparina. El personal de enfermería es el encargado de enseñar a la paciente la forma y lugar de administración de la heparina. ¿Cuál es la vía de administración de la heparina?

Respuestas:

A. Vía intramuscular

B. Vía subcutánea.

C. Vía intradérmica.

D. Vía intravenosa.

139. Paciente de 30 años, diagnosticado de amigdalitis aguda. Le prescriben penicilina 1,200.000 UI. Usted realiza la prueba de sensibilidad al medicamento. ¿Qué vía de administración utiliza para realizar esta prueba?

Respuestas:

A. Subcutánea.

B. Intradérmica.

C. Intramuscular.

D. Intravenosa.

140. Paciente varón de 75 años, hospitalizado en neurología desde hace 6 días, diagnosticado de hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, presenta hemiplejía derecha. Hace 2 días sufre una caída al trasladarle a exámenes radiológicos. Para brindar medidas de confort como el baño, es necesario valorar el riesgo de caídas del paciente. ¿Qué escala utiliza para valorar este riesgo?

Respuestas:

A. Escala de Braden.

B. Escala de Morse.

C. Escala de Norton.

D. Escala de Yesavage.

141. Mujer de 70 años, atendida en un centro de salud. Durante la entrevista, refiere pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina por varias ocasiones al día, además, indica sensación de tener la vejiga llena. ¿Qué tipo de incontinencia urinaria refiere esta paciente?

Respuestas:

A. Incontinencia urinaria por rebosamiento.

B. Incontinencia urinaria de urgencia.

C. Incontinencia urinaria funcional.

D. Incontinencia urinaria refleja.

142. Una de las teorizantes de enfermería se centra en el individuo como un sistema biopsicosocial adaptativo que emplea un ciclo de realimentación de entradas (estímulos), producción (procesos de control) y salidas (conductas o respuestas adaptativas). ¿Cuál es la teorizante que utiliza este enfoque?

Respuestas:

A. Betty Neuman.

B. Virginia Henderson.

C. Martha Rogers.

D. Callista Roy.

143. Durante la guerra civil (1861-1865), hubo la participación de una notable líder enfermera, quien se preocupó de las relaciones entre culturas y razas, dio luz a una conciencia de la diversidad cultural y respeto por la persona, sin tener en cuenta su procedencia, raza, color o religión. ¿A cuál de las siguientes enfermeras se le atribuye este enunciado?

Respuestas:

A. Isabel Hampton

B. Dorothea Dix

C. Harriet Tubman.

D. Mary Mahoney.

144. Paciente de 69 años, es seleccionado para participar en un estudio sobre enfermedades respiratorias. El investigador le informa que solo necesita que le conteste varias preguntas, sin darle más explicación. De acuerdo con el código de ética sobre protección del derecho del participante. ¿Qué derecho del paciente ha sido vulnerado?

Respuestas:

A. Derecho a una descripción completa.

- B. Derecho a no recibir daño.
- C. Derecho a la intimidad.
- D. Derecho a la confidencialidad.

145. Paciente de 58 años es diabético desde hace 10 años y se encuentra hospitalizado hace un día. Al ingreso se lo pesa como norma del servicio y se encuentra con 65 Kg. Al siguiente día de hospitalizado, paciente refiere presentar: cansancio, fatiga y orina poco. Al realizar el examen físico se observa: edema a nivel de párpados y miembros inferiores, y su peso es de 67,5Kg. En el control de diuresis en 24h. se encuentra con 300 ml. ¿Cuál de los siguientes problemas está relacionado con el caso y es un indicativo de alerta?

Respuestas:

A. Retención de líquidos.

- B. Enfermedad renal.
- C. Edema de piernas.
- D. Edema agudo de pulmón.

146. Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención del paciente - usuario. Las prácticas establecidas son: Prácticas seguras administrativas, Prácticas seguras asistenciales, y Prácticas seguras administrativas- asistenciales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos, pertenecen a las prácticas seguras asistenciales?

Respuestas:

- A. Identificación correcta del paciente.
- B. Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.
- C. Manejo correcto de bombas de infusión.

D. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.

147. Paciente de 57 años ingresa a emergencia luego de sufrir caída de una altura de 2 metros. A la valoración, tiene apertura ocular al llamado, al preguntarle su nombre la respuesta es confusa y localiza el dolor. De acuerdo a la escala de Glasgow. ¿Cuál es la puntuación que alcanza el paciente?

Respuestas:

A. Glasgow 12/15.

- B. Glasgow 14/15.
- C. Glasgow 11/15.
- D. Glasgow 10/15.

148. Como profesional de enfermería, es necesario que usted conozca los tipos de prácticas seguras en la atención de salud. Las prácticas establecidas para la seguridad del paciente- usuario son: Prácticas seguras administrativas, Prácticas seguras asistenciales,

Prácticas seguras administrativas - asistenciales. ¿Cuál es el procedimiento que se relaciona a la práctica segura administrativa?

Respuestas:

A. Manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo.

B. Conciliación de medicamentos.

C. Identificación correcta del paciente.

D. Notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente.

149. Paciente de 50 años, es atendido en emergencia. Al examen físico TA= 130/70 mmHg, FC= 110X', FR= 36X', T° =38.5°C, se encuentra intranquilo, presenta dolor torácico pleurítico, disneico, tos con expectoración mucopurulenta que le es difícil eliminar y escalofríos. ¿Según NANDA 2021 - 2023, cuál es el diagnóstico de enfermería prioritario en este caso?

Respuestas:

A. Despeje ineficaz de las vías respiratorias R/C mucosidad M/P disnea y taquipnea.

B. Riesgo de intolerancia a la actividad R/C desequilibrio entre el aporte y demanda de O₂.

C. Temor R/C entorno desconocido M/P intranquilidad.

D. Hipertermia R/C enfermedad M/P taquicardia.

150. En traumatología se encuentra paciente femenino de 28 años, por presentar esguince grado II de miembro inferior izquierdo, caracterizado por edema y dolor a la palpación. Se recomienda mantener reposo relativo, elevación de extremidad afectada y colocación de vendaje elástico compresivo. ¿Cuál de las siguientes acciones de enfermería previene complicaciones por el uso de vendaje elástico compresivo?

Respuestas:

A. Observar si hay zonas de riesgo de ruptura de la piel tras el uso del vendaje.

B. Evaluar la circulación distal tras la aplicación del vendaje al menos dos veces cada 8 horas.

C. Valorar el grado en que la piel se expone a la humedad al mantener el vendaje.

D. Valorar la presencia de fricción y/o cizallamiento realizado al retiro del vendaje.

151. Se programa cirugía de colecistectomía en paciente masculino de 47 años, con antecedentes patológicos personales de HIV en tratamiento con su TARGA habitual, ingesta y abuso de alcohol hace 3 años. SV: PA: 100/70mmHg; FC: 76lpm; Fr: 22rpm; T°:36,7°C; IMC: 32. En el transoperatorio se presenta complicación en la respiración, provocando disminución en la función ventilatoria. ¿Qué factor considera como principal causa de complicación durante el transoperatorio?

Respuestas:

A. Aumento del peso corporal del paciente.

B. Paciente con antecedentes de inmunodepresión.

C. Disminución del peso corporal del paciente.

D. Hábitos de ingesta de alcohol del paciente.

152. Paciente de 66 años, hospitalizado desde hace 15 días en el área de UCI con ventilación mecánica invasiva. Durante el turno se observa que el paciente presenta mal olor y presencia de secreción blanquecina a nivel bucal. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es prioritaria para realizar la higiene oral al paciente?

Respuestas:

- A. Cepillar primero las superficies exteriores de los dientes.
- B. Evitar realizar aspiraciones durante el procedimiento.
- C. Aplicar solución antiséptica de clorhexidina al 0.12%.**
- D. Un enfermero se encarga del cuidado de un paciente.

153. Paciente hospitalizado de 58 años, con diagnóstico de cáncer gástrico en fase II-III, tiene indicación de tratamiento con morfina de 2,5 a 5,0 mg IV cada 4 horas. Ha recibido 2,5 mg IV hace 4 horas por un dolor puntuado como 3 en una escala de 0 a 10. Ahora, está viendo la televisión y recibe una visita de sus familiares. Cuando le preguntan por su dolor, le da una puntuación de 5. Sus constantes vitales están estables. ¿Qué intervención de enfermería es la más apropiada?

Respuestas:

- A. Administrar morfina, 3,5 mg IV, y pedirle que continúe mirando la televisión porque sirve de distracción para su dolor.
- B. Administrar 2,5 mg de morfina IV para evitar que se convierta en un adicto.
- C. Administrar morfina, 5,0 mg IV, y volver a valorar a los 20 minutos.**
- D. No administrar nada en ese momento porque no tiene signos de dolor.

154. Los diagnósticos de Enfermería son parte del plan de cuidados del paciente, fundamentados en la valoración; ¿Cuál de los siguientes aspectos no es parte de este proceso?

Respuestas:

- A. Diagnósticos clínicos.**
- B. Criterios para la valoración específica.
- C. Descripción de las alteraciones reales o potenciales.
- D. Factores etiológicos y concurrentes.

155. Relacione los 4 principios de la Bioética con la definición correspondiente:

Principio	Definición
1) Beneficiencia	a) Capacidad para actuar con conocimiento de causa, respeto activo a la libertad de la persona; no solo absteniéndose de obstaculizarla sino procurando que se den las condiciones necesarias para ejercerla.
2) Justicia	b) Se remonta a la más antigua tradición médica, está contenido en el Juramento Hipocrático (primum non nocere) Debe ser exigido en forma imperativa. Consiste en no producir daño intencionalmente.
3) No maleficiencia	c) Distribución equitativa de beneficios y cargas entre los miembros de una sociedad. Casos iguales requieren tratamientos iguales.
4) Autonomía	d) Obligación de actuar en beneficio del enfermo ayudándole a promover sus legítimos intereses, también se encuentra en el juramento hipocrático, para poder aplicarlo se requiere hacer el bien y ser benevolente (hacerlo con buena voluntad).

Respuestas:

1d, 2c, 3b, 4a.

1a, 2b, 3c, 4d.

1c, 2b, 3a, 4d.

1d, 2c, 3a, 4c.

156. El Proceso de atención de Enfermería es el método de trabajo propio de la profesión, a través de sus fases de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación.

¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de la primera fase?

Respuestas:

A. Identificación del estado de salud real o potencial individual.

B. Detección de problemas y necesidades.

C. Reconocimiento de la respuesta a las intervenciones de Enfermería.

D. Identificación de riesgos de afectaciones individuales o grupales.

157. Una paciente de 85 años, fue dada de alta después de un evento cerebro vascular, tiene afectación neuromuscular. Egresa en compañía de la hija. Si usted utiliza el modelo de Dorotea Orem, el objetivo para el plan de egreso debe ser:

Respuestas:

A. Enseñar a la paciente a utilizar los recursos adaptativos para favorecer su autosuficiencia.

B. Atender a la paciente en su domicilio cada vez que tenga necesidades insatisfechas.

C. Minimizar el riesgo de lesiones, utilizando compañía permanente.

D. Entrenar a la hija para que realice el soporte óptimo de los sistemas afectados.

158. Los impulsos eléctricos cardíacos nacen en el nódulo sinusal para luego pasar al nódulo aurículo-ventricular. Desde allí se continúa la transmisión a través de:

Respuestas:

A. Conjunto de células denominadas "P".

B. Haz de Hiss.

C. Nódulo ventricular.

D. Red de Purkinje.

159. ¿Cuál es la posición correcta del paciente para mejorar la circulación?

Respuestas:

A. Trendelenburg.

B. Semi-fowler.

C. Sims.

D. Ginecológica.

160. Usted atiende a un paciente de reciente ingreso a emergencia, con dolor abdominal agudo que aún no ha sido diagnosticado clínicamente, se deben realizar acciones de enfermería, EXCEPTO:

Respuestas:

A. Enseñanza de tolerancia al dolor y acompañamiento.

B. Enseñanza de técnica de relajación. - Informe verbal de dolor y escucha activa para valoración.

C. Esta opción de respuesta es la correcta porque administración de analgesia inmediata sin prescripción médica.

161. Profesional en enfermería de la sala de Pediatría interpreta de manera equivocada la prescripción médica registrada en la historia clínica, la cual tenía problemas de legibilidad,

esta acción provocó un evento adverso en el paciente. Superada la emergencia, ¿Cuál debe ser la actitud del profesional en enfermería?

Respuestas:

A. Registrar y reportar el evento adverso al médico para que informe a la madre del paciente lo sucedido.

B. Pedir a la madre del paciente que no comente con nadie lo sucedido y comunicar al líder del servicio.

C. Conversar con un compañero de trabajo la situación y decirle a la madre del paciente que todo está bien.

D. Omitir el registro del evento y decir a la madre que la reacción de Carlitos era un efecto del medicamento.

162. Paciente ingresa al hospital con un embarazo a término más labor de parto, luego de una hora de su ingreso, es valorada. Durante la valoración el médico le dice que la va a examinar; la paciente se encuentra tímida e intenta cubrir su cuerpo con la sábana; el médico pide al estudiante de medicina que realice el tacto vaginal, la paciente se pone tensa y rígida, por lo que le llaman la atención para que colabore en el procedimiento que es necesario, luego el médico procede a comprobar la valoración realizada por el estudiante, la paciente continúa angustiada; el enfermero profesional se encuentra junto a la paciente realizando su reporte. ¿Cuál debe ser la actitud del enfermero profesional frente a esta situación?

Respuestas:

A. Tomar la mano de la paciente para tranquilizarle y anotar lo observado en el expediente.

B. Llamarle la atención al médico ese momento y recordarle la norma para la valoración por tacto vaginal.

C. Comunicar al jefe de servicio luego del procedimiento, dialogar con el médico y recordarle las normas de la valoración por tacto vaginal.

D. Explicar el procedimiento a la paciente y dialogar con el médico en privado recordándole la norma para evitar tactos numerosos.

163. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales de la Bioética según el Principialismo?

Respuestas:

A. Beneficencia, No Maleficencia, Justicia y Autonomía.

B. Veracidad, Tolerancia, Autonomía, Beneficencia.

C. Confiabilidad, Solidaridad, Autonomía y Beneficencia.

D. Fidelidad, Tolerancia, Beneficencia y No Maleficencia.

164. Paciente de 17 años de edad, ingresa al servicio de Gineco-Obstetricia, cursa con un embarazo de 40, 3 semanas de gestación, se encuentra en la primera etapa del parto, fase activa. Se aprecia en la paciente nerviosismo y miedo, generado por la labor de parto. Mediante la valoración de Enfermería, ¿Cuál de los siguientes patrones funcionales de Gordon se encuentra alterado?

Respuestas:

A. Auto percepción-Autoconcepto.

B. Adaptación y tolerancia al estrés.

C. Cognitivo perceptual

D. Percepción y manejo de la salud.

165. Paciente de 17 años, ingresa al servicio de Gineco-Obstetricia, primigesta, soltera y no cuenta con el apoyo de su pareja. Se encuentra en la primera etapa del parto, fase latente, a la valoración presenta actividad uterina positiva de una contracción en 10 minutos, con una intensidad de 25 segundos de duración; no se evidencian pérdidas trans-vaginales. Paciente manifiesta que siente miedo por el proceso del parto. El diagnóstico enfermero identificado es: Afrontamiento ineficaz relacionado con el proceso del parto, manifestado por miedo. Seleccione 3 acciones que usted debe priorizar:

1. Enseñanza individual.
2. Cuidados prenatales.
3. Preparación para el parto.
4. Control del humor.
5. Administración de analgesia.
6. Alivio del dolor.
7. Presencia y acompañamiento.
8. Distracción.

Respuestas:

- A. 1, 3, 7
B. 2, 6, 8
C. 2, 4, 5
D. 4, 7, 8

166. Enfermero profesional de emergencia, en su turno acude una paciente de 20 años de edad, primigesta; al realizar el cálculo de las semanas de gestación, se determina que la paciente se encuentra en la semana 34, la paciente se encuentra agitada, rubicunda y refiere cefalea intensa. ¿Qué actividades inmediatas y prioritarias se debe realizar para determinar el diagnóstico de enfermería?

1. Toma de presión arterial.
2. Valorar el nivel de hemoglobina.
3. Tomar la temperatura.
4. Valorar actividad uterina.
5. Realizar proteinuria en tira reactiva.
6. Valorar pérdidas transvaginales.

Respuestas:

- A. 2, 5
B. 3, 6
C. 1, 5
D. 2, 4

167. Paciente de 45 años, con antecedente de que su madre falleció con cáncer de mama, por ello es muy importante que se controle mensualmente mediante el auto examen de mamas. Usted, debe explicar a la paciente el mejor momento para realizarse el auto examen. ¿Cuál de los siguientes momentos es el ideal para realizarse este procedimiento?

Respuestas:

- A. Después de 5 días del periodo menstrual.
B. El primer día del periodo menstrual.
C. Durante el periodo menstrual.
D. El último día del periodo menstrual.

168. Durante el ciclo endometrial, se producen algunas fases: menstrual, proliferativa y secretora. Identifique el cambio que se produce en la fase proliferativa:

Respuestas:

A. El endometrio, grueso y congestionado, se vuelve hemorrágico.

B. Aumenta la producción de hormona estimulante del folículo (FSH).

C. Aumenta la producción de la hormona luteinizante (LH).

D. El cuerpo amarillo secreta la hormona progesterona.

169. El principio de obtener el consentimiento informado es obligatorio, pero el requisito ético y legal de obtenerlo explícitamente, es en los siguientes casos, EXCEPTO:

Respuestas:

A. Cuando mayores sean los riesgos que la intervención médica.

B. Esta opción de respuesta es incorrecta porque en tratamientos o intervenciones médicas que no sean urgentes.

C. En tratamientos exigidos por la ley y cuando es necesario corregir una alteración inesperada durante la intervención.

D. Cuanto más experimental sea el tratamiento o la intervención médica.

170. Usted como profesional de Enfermería identifica el siguiente diagnóstico enfermero: déficit de volumen de líquidos, relacionado con pérdida activa de sangre, manifestado por disminución de la presión arterial, sequedad de mucosas orales, aumento de la frecuencia del pulso, debilidad y sed. En la planificación de sus cuidados, ¿Qué resultado esperado elige usted para la paciente según el diagnóstico enfermero citado? Elija la respuesta correcta:

Respuestas:

A. Aumento de volemia.

B. Termorregulación.

C. Equilibrio electrolítico y ácido - base.

D. Eliminación urinaria.

171. Relacione el término con la definición correcta:

1.- Dispareunia	a.- Dolor que aparece en la menstruación junto con otros síntomas
2.- Dismenorrea	b.- Hemorragia vaginal no asociada al ciclo menstrual
3.- Amenorrea	c.- Dolor y dificultad durante las relaciones sexuales
4.- Metrorragia	d.- Ausencia de menstruación o interrupción de la menstruación

Respuestas:

A. 1c, 2a, 3d, 4b.

B. 1a, 2b, 3c, 4d.

C. 1d, 2a, 3c, 4b.

D. 1b, 2c, 3d, 4a.

172. Los siguientes son factores que se deben tomar en cuenta en la asesoría del personal de enfermería al momento de elegir un método anticonceptivo, EXCEPTO:

Respuestas:

A. Existen muchos métodos anticonceptivos y es recomendable a lo largo de la vida fértil usar más de uno.

B. Se debe tomar en cuenta los beneficios y efectos secundarios de cada método anticonceptivo para poder hacer una buena decisión.

C. La efectividad de un método se puede potencializar si se combinan dos métodos anticonceptivos.

D. El profesional de salud debe recomendar el método que con sus conocimientos considere que es el adecuado para la persona o pareja

173. Señale los métodos anticonceptivos conocidos como temporales:

A. Preservativo, dispositivo intrauterino (DIU), píldora anticonceptiva.

B. Espumas espermicidas, ligadura, método de Billings.

C. Pastilla del día después, implantes, vasectomía.

D. Histerectomía, temperatura basal, método MELA.

174. Señale las ventajas de los métodos anticonceptivos hormonales:

A. Reducción de sangrado y cólicos menstruales, previenen la ovulación y la transmisión en enfermedades de tipo sexual.

B. Periodos menstruales regulares y breves, reducen el riesgo de cáncer ovárico y de endometrio.

C. Reducen cambios fibroquísticos en las mamas, se puede tomar a día alterno, puede combinarse con otro método hormonal.

D. Reducen quistes ováricos, se usa durante la lactancia, uso en mujeres obesas, previenen problemas circulatorios.

175. Para el uso correcto del preservativo masculino se toma en cuenta ciertas condiciones, EXCEPTO:

A. Debe ser colocado justo antes de eyacular.

B. Debe ser colocado en el pene erecto.

C. Antes de ponerse no se debe desenrollar el condón.

D. Tiene una efectividad de hasta el 97% utilizado adecuadamente.

176. Señale el método anticonceptivo que afecta la producción de leche en las mujeres que están en periodo de lactancia:

A. Anticonceptivos orales (progestágenos).

B. Anticonceptivos orales (oxitocina y progestágenos).

C. Anticonceptivos orales (estrógenos).

D. Anticonceptivos orales (estrógenos y progestágenos).

177. ¿Cuáles son los conceptos descritos por Florence Nightingale en la teoría del entorno, que se deben manejar en la atención a pacientes?

A. Temperatura, confort, silencio, dieta y desinfección.

B. Desinfección, esterilización, descanso, temperatura y dieta.

C. Ventilación, temperatura, silencio, dieta e higiene.

D. Silencio, climatización, energía, dieta y temperatura.

178. Uno de los modelos de enfermería describe que el objetivo de la enfermería es "Ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, recuperación o a lograr una muerte digna". ¿Quién es la creadora de este concepto de enfermería?

- A. **Virginia Henderson.**
- B. Florence Nightingale.
- C. Martha Rogers.
- D. Marjory Gordon.

179. Adulto mayor, residente en asilo de ancianos desde hace 5 años, es transferido a un hospital por presentar disnea de mínimos esfuerzos, bradipnea, cefalea, presencia de roncus y estertores. Identifique el patrón funcional alterado:

- A. **Actividad y Ejercicio.**
- B. Autopercepción-autoconcepto.
- C. Adaptación-Tolerancia al estrés.
- D. Percepción y manejo de la salud.

180. ¿Cuál es el orden de valoración que se realiza en la auscultación de los focos cardíacos?

- A. Pulmonar, aórtico, tricúspide y mitral.
- B. Tricúspide, pulmonar, aórtico y mitral.
- C. **Aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral.**
- D. Tricúspide, mitral, pulmonar y aórtico.

181. Las siguientes son recomendaciones que se debe tomar para el lavado de manos, EXCEPTO:

- A. **Utilizar toalla de tela.**
- B. Fricción mecánica de las manos.
- C. Retirar las joyas y el reloj.
- D. Tiempo aproximado de 40 - 60 segundos.

182. Relacione la clasificación de desechos hospitalarios según corresponda:

TIPOS DE DESECHOS	MATERIALES UTILIZADOS
1. Desechos cortopunzantes.	a) Bajalenguas.
2. Desechos infecciosos.	b) Gasa con secreción faríngea.
3. Desechos especiales.	c) Líquido revelador de placas.
	d) Catéteres venosos.
	e) Fluidos corporales.
	f) Medicina caducadas.

Respuestas:

A. 1bd, 2ae, 3cf.

B. 1bc, 2ad, 3ef

C. 1ad, 2be, 3cf.

D. 1ae, 2dc, 3bf

183. Paciente hospitalizada con diagnóstico de diabetes mellitus, al realizar la valoración física de enfermería se observa erupciones cutáneas en todo su cuerpo, exudado con secreción purulenta, prurito y zona eritematosa. Identifique el patrón funcional alterado de acuerdo al enunciado:

A. Patrón nutricional metabólico.

B. Patrón rol relaciones.

C. Patrón Eliminación.

D. Patrón actividad -ejercicio.

184. Complete lo que corresponda en la siguiente información. Diagnóstico es un _____ clínico acerca de un _____, que deriva de un proceso _____ y deliberado de _____ y _____ de _____.

A. Juicio, individuo, sistemático, recolección, análisis, datos.

B. Caso, niño, cíclico, recolección, priorización, problemas.

C. Criterio, adulto, continuo, priorización, recolección, riesgos.

D. Componente, grupo, dinámico, problemas, reales, riesgo.

185. En la aplicación del proceso enfermero, usted como personal de Enfermería debe iniciar con la etapa de valoración, la cual incluye la anamnesis y el examen físico. Relacione los pasos de la técnica con las características para evidenciar la valoración:

TÉCNICA DE VALORACIÓN	CARACTERÍSTICAS/ACTIVIDADES
1. Recolección de datos.	a) Datos objetivos.
2.Examen Físico.	b) Fuentes primaria y secundarias.
3. Entrevista Clínica.	c) Sistemático y lógico.
	d) Auscultación y percusión.
	e) Patrones funcionales.
	f) Inicio, cuerpo y cierre.

Respuestas:

A. 1ac, 2ef, 3bd.

B. 1bc, 2de, 3af.

C. 1ae, 2bc, 3df.

D. 1be, 2ad, 3cf.

186. En el servicio de emergencia se recibe a un paciente NN, de 27 años de edad, soltero, el cual está acompañado por su madre. El paciente presentó fiebre (no cuantificada) en horas de la madrugada, sin recibir medicación alguna, al igual que escalofríos, dificultad para respirar, cefalea; por ello es traído a dicho centro asistencial, luego de ser valorado por el médico de guardia, deciden su ingreso con una impresión diagnóstica de Neumonía de lóbulo inferior izquierdo. Al tomar los signos vitales presenta: temperatura de 39.5 grados axilar, respiración 20 por minuto, tensión arterial: 110/70 mmgh y pulso: 110 por minuto, piel sudorosa y caliente, mucosas orales secas. Identifique el diagnóstico real del paciente utilizando el formato PES, para la planificación de los cuidados de enfermería:

A. Alteración del patrón del sueño relacionado a estadía hospitalaria evidenciado por irritabilidad y facies de cansancio.

B. Hipertermia relacionado con enfermedad, manifestado por piel sudorosa y caliente al tacto.

C. Intolerancia a la actividad relacionada entre el suministro y la demanda de oxígeno y evidenciado por disnea.

D. Alteración nutricional, y metabólica por defecto relacionada con dieta hipoalergénica evidenciado por pérdida de apetito.

187. Seleccione en qué dimensión de enfermería existen problemas o situaciones cuya prescripción y tratamiento requieren la colaboración de otros profesionales de la Salud para un tratamiento conjunto definitivo

A. Dependiente.

B. Curativa

C. Interdependiente. .

D. Independiente.

188. Al servicio de emergencia donde usted trabaja llega una paciente que sufrió una caída de 5 metros de altura con posible trauma craneo encefálico, se solicita que la valore con la aplicación de la escala de Glasgow. Identifique los criterios de evaluación:

A. Respuesta verbal, respuesta motora y apertura de ojos.

B. Respuesta verbal, signos vitales y estado de conciencia.

C. Respuesta motora, reflejos osteotendinosos y contracturas.

D. De coordinación, apertura de ojos y movimientos.

189. ¿Cuáles son los mecanismos físicos principales por los que un paciente pierde calor con facilidad?

A. Evaporación, condensación, ebullición, precipitación.

B. Condensación, evaporación, convección, radiación.

C. Radiación, conducción, convección, evaporación.

D. Cristalización, Isomerización, condensación, radiación.

190. El proceso de atención de enfermería sirve para brindar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Relacione las etapas del proceso enfermero con las fases que lo componen:

ETAPAS

1. Diagnóstico
2. Planificación
3. Valoración
4. Implementación

FASES

- a) Análisis, Síntesis y registro.
- b) Dominio, clases y resultados
- c) Campo, clases e intervenciones
- d) Obtención y organización de datos

Respuestas:

- A. 1b, 2c, 3a, 4d.
- B. 1d, 2b, 3a, 4c.
- C. 1c, 2d, 3b, 4a.
- D. 1a, 2b, 3d, 4c.

191. Las siguientes son medidas de seguridad para garantizar la toma correcta de la presión arterial, EXCEPTO:

- A. Fonendoscopio debajo del brazalete.
- B. Cierre completamente la válvula de perilla.
- C. Calibrar el tensiómetro periódicamente.
- D. Verificar que el brazalete no tenga aire.

192. Se aplica una inyección intramuscular en el musculo deltoides. Las siguientes son precauciones que debe tener, EXCEPTO:

- A. Aplicar el medicamento 5 a 8 cm debajo del Acromion.
- B. El brazo debe estar relajado.
- C. Valorar el estado del músculo deltoides.
- D. Aplicar el medicamento 3 a 5 cm debajo del Acromion.

193. Paciente de 45 años, ingresado en el servicio de emergencia de gastroenterología, por presentar un cuadro compatible con pancreatitis aguda. Durante la administración de la nutrición enteral el paciente refiere náusea y vómito. ¿Qué actividades deben realizarse?

- A. Reportar al médico, solicitar cambio de solución enteral, tomar signos vitales.
- B. Referir a la nutricionista, realizar lavado gástrico, aspirar residuo.
- C. Interrumpir la administración, comprobar sonda permeable y reportar al médico.
- D. Cambiar de nutrición enteral, dar por vía oral, reportar al médico.

194. Mónica es una paciente de 56 años de edad, tiene problemas de nutrición, pesa 75 Kg y mide 1.57 cm. Calcule el Índice de masa corporal IMC:

- A. IMC - 47.7 Obesidad grado II
- B. IMC - 30.4 Obesidad grado I.
- C. IMC - 23.88 Peso normal.
- D. IMC - 28.4 Sobrepeso.

195. Paciente sufre de Trombosis Venosa Profunda, desde hace 5 años, el médico le prescribió Heparina para que se administre por vía subcutánea. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de enfermería, no corresponde al tratamiento con anticoagulante?

A. Control de antibióticos, control de transfusión de hemoderivados.

B. Controlar la aparición de hematomas, control de hemorragias.

C. Controlar reacciones de hipersensibilidad, controles hematológicos.

D. Control y rotación del sitio de la administración, vía subcutánea.

196. De acuerdo a los criterios de valoración por patrones funcionales de salud. Identifique los aspectos que debe preguntar para valorar el patrón de percepción - manejo de la salud.

A. Problemas con el alcohol, tabaco, drogas.

B. Problemas para conciliar el sueño o descansar.

C. Problemas en su ingesta, condiciones de la piel.

D. Problemas conductuales y en su imagen corporal.

197. El pensamiento crítico es un proceso complejo que propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos. Para desarrollar esta capacidad se necesitan tres competencias, señale cuáles son:

A. Sentir, ser y hacer.

B. Saber, sentir y ser.

C. Saber, ser y hacer.

D. Hacer, ser e intuir.

198. Señale, ¿Cuáles son los valores normales de las constantes vitales para un adulto?

A. Frecuencia cardíaca 50-70 L/min, frecuencia respiratoria 12-20 R/min, tensión arterial 100/60 mmHg, temperatura 36,5-37o C y oximetría >90%.

B. Frecuencia cardíaca 60-100 L/min, frecuencia respiratoria 14-22 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 37o C y oximetría <95%.

C. Frecuencia cardíaca 60-120 L/min, frecuencia respiratoria 18-22 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 36,5-37o C y oximetría >95%.

D. Frecuencia cardíaca 60-100 L/min, frecuencia respiratoria 14-20 R/min, tensión arterial 120/80 mmHg, temperatura 36,5-37o C y oximetría >90%.

199. Paciente de 54 años, acude al servicio de emergencia por presentar, tiraje intercostal, fatiga, tos esporádica, malestar general y saturación de O2 de 80%. ¿Qué etiqueta diagnóstica Enfermero se debe priorizar en el caso propuesto?

A. Patrón respiratorio ineficaz.

B. Deterioro de la ventilación espontánea.

C. Disminución del gasto cardíaco.

D. Intolerancia a la actividad.

200. Un paciente refiere que luego de ingesta de alimentos condimentados presenta oliguria y dolor suprapúbico que le dificulta un poco al caminar, en la valoración: creatinina de 14 mg/dl y globo vesical, por lo que se procede a colocar sonda. ¿Cuál es el patrón prioritario?

A. Actividad-ejercicio.

- B. Cognitivo-perceptual.
- C. Nutricional-metabólico.
- D. Eliminación.**

201. Señale, ¿Cuáles son los principios fundamentales de la bioseguridad?

- A. Uso de barreras, integralidad, y distribución de recursos.
- B. Universalidad, aislamientos y eliminación de residuos.
- C. Universalidad, uso de barreras y eliminación de residuos.**
- D. Universalidad, uso de barreras y distribución de recursos.

202. Señale, ¿Cuál es el orden correcto para retirar los métodos de barrera una vez utilizados?

- A. Guantes, bata, mascarilla, protección ocular y gorro.**
- B. Bata, guantes, mascarilla, protección ocular y gorro.
- C. Guantes, mascarilla, protección ocular, gorro y bata.
- D. Guantes, gorro, mascarilla, bata y protección ocular.

203. Elija la respuesta correcta. ¿Cuáles son los derechos del paciente?

- A. Decidir libremente sobre su atención y consentimiento informado y ser afiliado /beneficiario.
- B. Recibir atención médica en casos de emergencia y suministrar información solicitada para establecer diagnóstico y tratamiento.
- C. Contar con un expediente clínico y mantener el respeto y consideración hacia el personal de la institución.
- D. Recibir atención médica adecuada, información suficiente, clara, oportuna y veraz.**

204. Determine, ¿Cuáles son los cinco correctos principales de la administración de medicación?

- A. Paciente, presentación, dosis, vía y hora.
- B. Paciente, medicamento, dosis, vía y hora.**
- C. Vía, hora, temperatura, habitación y cama.
- D. Fármaco, fecha, temperatura, dosis y vía.

205. Señale la teorizante de enfermería que considera las 14 necesidades básicas del ser humano como elementos importantes de la atención:

- A. Virginia Henderson.**
- B. Dorothea Orem.
- C. Callista Roy.
- D. Hildegard Peplau.

206. Un metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican los fenómenos particulares de interés para una disciplina. ¿Cuáles son los conceptos globales del metaparadigma enfermero?

- A. Entorno, teorías, cuidado y enfermería.
- B. Cuidado, enfermería, relaciones y salud.
- C. Salud, persona, enfermería y cuidado
- D. Persona, entorno, cuidado y salud.**

207. Indique a que término corresponde lo siguiente: "Se define como un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión previa de lo que va a ocurrir".

A. Modelo.

B. Teoría.

C. Rol.

D. Paradigma.

208. Complete la siguiente definición: "Las acciones de enfermería pueden ser ----- cuando dependan de la prescripción médica, ----- cuando sean propias de la enfermera, ----- cuando estas sean conjuntas con otros miembros del ----- de salud".

A. Equipo, dependientes, interdependientes, independientes.

B. Dependientes, independientes, interdependientes, equipo.

C. Interdependientes, dependientes, equipo, dependientes.

D. Independientes, Interdependientes, dependientes, equipo.

209. De acuerdo a las precauciones basadas en la forma de transmisión, por vía aérea, se deben tomar las siguientes medidas:

A. Una habitación individual con presión negativa, uso de la mascarilla de alta eficiencia (N95).

B. Dentro de la habitación no tocar los materiales sin guantes, uso de la mascarilla quirúrgica.

C. Uso de mandil para entrar en contacto con el paciente, uso de la mascarilla de alta eficiencia (N95)

D. Asignar en lo posible estetoscopio y tensiómetro para el paciente, uso de mascarilla de alta eficiencia (N95).

210. ¿Para planificar la atención al paciente, que aspectos valora el profesional enfermero utilizando el Patrón Funcional 1, Percepción-Manejo de salud de Marjory Gordon?

A. Hábitos higiénicos, vacunaciones.

B. Condiciones de piel y mucosas.

C. Funciones excretoras.

D. Percepción del nivel de energía.

211. Según el manual de bioseguridad del Ministerio de Salud Pública, los aislamientos hospitalarios son:

A. Aislamiento por contacto, gotas y por aire.

B. Aislamiento protector, gotas y entérico.

C. Aislamiento digestivo, gotas y por aire.

D. Aislamiento protector, gotas y contacto.

212. ¿Cómo se denomina al conjunto de medidas, protocolos y normas de comportamiento que minimizan el riesgo de quienes trabajan en la prestación de salud?

A. Seguridad.

B. Salud Ocupacional.

C. Ergonomía.

D. Bioseguridad.

213. Todo acto relacionado con el cuidado de la salud debe estar sustentado en el ejercicio de los siguientes principios bioéticos:

A. Principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

B. Principios de individualidad, beneficencia, integridad y justicia.

C. Principio de autonomía, beneficencia, misericordia y continuidad.

D. Principio de unidad, beneficencia, integridad y no maleficencia.

214. Escoja la respuesta correcta. ¿Qué tipo de aislamiento aplica en un paciente con Neumonía?

Aislamiento por gotas.

Aislamiento estricto.

Aislamiento de contacto.

Aislamiento aéreo.

215. Escoja la respuesta correcta. ¿Cuál es el sitio más frecuente para tomar el pulso arterial?

A. A nivel de la arteria pedial y poplitea.

B. A nivel de la arterial radial y braquial.

C. A nivel de la arteria carotídea y femoral.

D. A nivel de la arteria tibial y axilar.

216. Un paciente adulto presenta los siguientes signos vitales: 24 respiraciones por minuto, 170/90 mmHg de tensión arterial, 56 latidos por minuto y 35,4°C de temperatura. ¿A qué alteración corresponde cada uno de los datos vitales?

A. Taquipnea, hipertensión, bradicardia e hipotermia.

B. Bradipnea, hipotensión, bradicardia y febrícula.

C. Taquipnea, hipertensión, taquicardia y fiebre.

D. Bradipnea, hipotensión, taquicardia e hipotermia.

217. Paciente de 52 años acude a la consulta externa, por presentar dificultad para respirar, dolor torácico que aumenta con los movimientos de la respiración, refiere malestar general, fiebre, escalofríos, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y diaforesis. En su intervención de enfermería identifique y priorice el problema principal.

A. Dolor torácico.

B. Fiebre.

C. Taquicardia.

D. Dificultad para respirar.

218. Son muchos los métodos anticonceptivos que las parejas pueden ocupar para espaciar los nacimientos o planificar el número de hijos que desean, pero sólo uno de ellos además de ser un método anticonceptivo es un mecanismo que se utiliza para evitar la transmisión de enfermedades venéreas.

A. DIU.

B. Implante.

C. Preservativo.

D. Espermicidas

219. Seleccione la opción que corresponde al sitio donde se realiza el corte para ejecutar la esterilización masculina:

- A. Uréter.
- B. Vasectomía.
- C. Epidídimo.
- D. Conducto deferente.**

220. ¿Cuál es el centro regulador de la temperatura corporal?

- A. Bulbo raquídeo.
- B. Cerebelo.
- C. Tronco del encéfalo
- D. Hipotálamo.**

221. ¿Cuáles son los factores que afectan la temperatura corporal?

- A. Edad, ejercicio, valor hormonal, ritmo circadiano, estrés, entorno.**
- B. Emociones, sentimientos, valor de hemoglobina, valor lipídico, ritmo circadiano, edad.
- C. Ejercicio, entorno, valor hormonal, estrés, emociones, valores de hematocrito.
- D. Alimentación, ejercicio, hematocrito, hemoglobina, edad, emociones.

222. Dorothea Orem estableció la teoría del déficit del autocuidado como un modelo general compuesto por tres subteorías relacionadas entre sí, EXCEPTO:

- A. Teoría del déficit del cuidado.
- B. Teoría de las necesidades básicas.**
- C. Teoría del autocuidado.
- D. Teoría de sistemas de enfermería.

223. Seleccione los conceptos que usted debe aplicar para fomentar el pensamiento crítico en su práctica diaria:

- 1. Dirección.
- 2. Sistemática.
- 3. Búsqueda de la verdad.
- 4. Organización.
- 5. Capacidad de análisis.
- 6. Autoconfianza.
- 7. Negociación.
- 8. Control.

Respuestas:

- A. 1, 3, 6, 8
- B. 2, 4, 6, 7
- C. 1, 2, 4, 7
- D. 2, 3, 5, 6**

224. La teoría de enfermería de Virginia Henderson, se refiere a las 14 necesidades humanas. Las siguientes son necesidades fisiológicas que tiene la persona, EXCEPTO:

- A. Higiene corporal.**
- B. Respiración.
- C. Postura adecuada.
- D. Temperatura corporal.

225. De los siguientes tipos de catéter que se utiliza para la administración de medicación intravenosa, identifique dos caracteres de cada tipo:

TIPOS DE CATÉTER	CARACTERÍSTICAS
1. Catéter Venoso Periférico	a) Tiene material radio paco
2. Catéter Venoso Subcutáneo	b) Inserción en vena superficial
	c) Inserción en vena subclavia
3. Catéter Venoso Central	d) Inserción vena cava superior
	e) Con cánula corta
	f) Tiene un reservorio

Respuestas:

A. 1 bc, 2 de, 3 af.

B. 1bf, 2 ad, 3 ce.

C. 1 be, 2 df, 3 ac.

D. 1 ae, 2 bc, 3 df

226. ¿Cuál es la posición correcta para la colocación de un enema evacuante?

A. La posición Sims.

B. Trendelenburg.

C. Decúbito ventral.

D. Rossier.

227. Los siguientes son materiales que se utilizan para lograr en el paciente una alineación corporal anatómica correcta, EXCEPTO:

A. Tablero para pies.

B. Férulas de yeso.

C. Sacos de arena.

D. Elevador de Hoyer.

228. Seleccione la teoría de enfermería con la autora según corresponda:

Autora de la Teoría	Teoría de Enfermería
1. Nola Pender	a. Teoría del Autocuidado
2. Florence Nightingale	b. Modelo de suplencia
3. Dorothea Orem	c. Logro de Metas
	d. Teoría del entorno
	e. Teoría de los 21 problemas
	f. Modelo de promoción de la salud

Respuestas:

A. 1b, 2f, 3a.

B. 1f, 2d, 3a.

C. 1c, 2e, 3f.

D. 1e, 2b, 3d.

229. Paciente de 56 años de edad, con un peso de 65 Kg, tiene problemas de eliminación urinaria, por una alteración en el sistema renal. El paciente ha eliminado 530 ml de orina en las 24 horas. Calcule el gasto urinario del paciente:

- A. 0.54 mL/Kg/h
- B. 0.67 mL/Kg/h
- C. 0.33 mL/Kg/h
- D. 1.35 mL/Kg/h

230. Paciente refiere dolor lumbar que le dificulta realizar sus actividades diarias, el médico prescribe colocar calor local en el sitio del dolor. Seleccione las medidas de seguridad que debe aplicar en este procedimiento.

1. Colocación directa de la bolsa.
2. Sacar el aire residual de la bolsa.
3. Colocar la bolsa de 40 min a 1 hora.
4. Verificar la temperatura del agua.
5. Administración de antibióticos.
6. Compresión en la zona afectada.
7. Vigilar la zona de aplicación.
8. Cubrir la bolsa con una toalla.

Respuestas:

- A. 1, 3, 5, 6.
- B. 1, 4, 6, 7.
- C. 2, 3, 5, 8.
- D. 2, 4, 7, 8.

231. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?

- A. Frecuencia cardíaca x volumen sistólico.
- B. Frecuencia cardíaca x volumen diastólico.
- C. Frecuencia cardíaca x volumen cardíaco.
- D. Frecuencia cardíaca x volumen sanguíneo.

232. En la planificación para el cuidado del paciente crónico dentro y fuera del hospital es prioridad satisfacer las necesidades de confort. Los siguientes son procedimientos de confort que usted debe aplicar al paciente, EXCEPTO:

- A. Masajes y ejercicios.
- B. Baño de esponja en cama.
- C. Colocación de enema evacuante.
- D. Cambio de posiciones.

233. La mecánica corporal estudia el funcionamiento correcto y armónico del aparato músculo-esquelético y le permite a la enfermera realizar movimientos correctos durante la movilización, traslado o transferencia de la persona o paciente. ¿De los siguientes principios básicos, cuál no debería aplicar en una correcta mecánica corporal?

- A. Conservar bajo el centro de gravedad.
- B. Cuerpo apoyado sobre una base de sustentación.
- C. Posturas con sobrecarga biomecánica.
- D. Alinear las relaciones corporales.

234. Usted debe administrar alimentación por sonda naso gástrica según prescripción médica. Previa la administración de nutrición enteral, la enfermera debe tomar en cuenta las siguientes precauciones, EXCEPTO:

A. Velocidad de infusión rápida.

B. Comprueba permeabilidad.

C. Posicion semifowler.

D. Mida residuo gástrico.

235. Para garantizar la esterilización se realiza el monitoreo integral tanto en la carga como en los paquetes de equipos. Seleccione el producto utilizado para realizar el control de carga:

A. Indicadores químicos.

B. Cintas testigo.

C. Tarjetas de registro.

D. Indicadores biológicos.

236. La central de esterilización contribuye al proceso de asepsia y antisepsia del material hospitalario, en el cual la enfermera realiza las funciones de limpieza, desinfección y esterilización. Relacione los tipos de esterilización con los métodos en que se puede esterilizar y/o desinfectar los materiales:

TIPO DE ESTERILIZACIÓN

MÉTODOS

1. Por medios químicos

2. Por medios físicos

a) Gas de óxido de etileno

b) Calor seco

c) Peróxido de Hidrógeno

d) Clorhexidina

e) Vapor saturado

f) Formaldehído

g) Hipoclorito de Sodio

h) Rayos ultravioleta

Respuestas:

A. 1cdf, 2afg.

B. 1adg, 2cfh.

C. 1bce, 2adg

D. 1 acf, 2 beh.

237. ¿Cuál es el centro regulador de la respiración?

A. Tronco encefálico.

B. Hipotálamo.

C. Cerebelo.

D. Médula espinal.

238. Lea detenidamente para que pueda analizar y relacionar los 5 momentos para el la ización Mundial de la Salud.

Momentos de lavados de manos	Finalidades de lavado de manos
1. Antes del contacto directo con el paciente.	a) Para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.
2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica.	b) Para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación.
3. Después	

Respuestas:

A. 1e, 2d, 3c, 4b, 5a.

B. 1b, 2a, 3e, 4d, 5c.

C. 1c, 2b, 3a, 4d, 5e.

D. 1d, 2c, 3b, 4a, 5e.

239. De las siguientes soluciones, seleccione el antiséptico que se utiliza en asepsia de eventos quirúrgicos de larga duración:

A. Hipoclorito de sodio 1%.

B. Glutaraldehído.

C. Clorhexidina.

D. Alcohol 70% o al 75%

240. De la siguiente lista de actividades, indique aquellas que garantizan un cuidado seguro al paciente:

1. Uso de protocolos clínicos.

2. Implementación de medidas de desempeño.

3. Prevención de caídas.

4. Revisión de indicadores.

5. Desarrollo de plan de acciones.

6. Comunicación clara y precisa.

7. Identificación de procesos.

8. Control de infecciones.

Respuestas:

A. 2, 4, 5, 7.

B. 2, 3, 5, 6.

C. 1, 2, 4, 7.

D. 1, 3, 6, 8.

241. Para medir la calidad y seguridad de la atención de enfermería y controlar las infecciones asociadas a la atención de salud, se utilizan instrumentos para recolectar la información, uno de ellos son las listas de cotejo. Identifique los propósitos de este instrumento:

- A. Facilitar la agrupación de datos, registrar eventos, comparar el logro de objetivos.
- B. Definición de objetivos, aplicación de la matriz FODA, diagrama de Gantt.
- C. Liderazgo participativo, toma de decisiones, motivación y coordinación de actividades.
- D. Control de monitoreo, evaluación de las desviaciones y medidas correctivas.

242. Seleccione los indicadores centinelas causados por el equipo de salud durante el tratamiento del paciente:

- 1. Invalidez motora significativa.
- 2. Error en administración de medicación.
- 3. Defecto del nacimiento.
- 4. Úlceras por presión.
- 5. Incapacidad del paciente.
- 6. Extubación accidental.
- 7. Transfusión sanguínea incompatible.

Respuestas:

- A. 1, 4, 5, 6
- B. 3, 4, 5, 7
- C. 2, 4, 6, 7
- D. 2, 3, 5, 6

243. La OMS a través de una lista de verificación planteó tres etapas de revisión en el proceso quirúrgico. Seleccione y ordene en secuencia lógica las etapas de control de la cirugía segura:

- 1. Después de la programación quirúrgica.
- 2. Antes de la esterilización de materiales.
- 3. Antes de la inducción de la anestesia.
- 4. Después de la provisión de equipamiento.
- 5. Antes de la incisión cutánea.
- 6. Antes de que salga del quirófano.
- 7. Después de la preparación del paciente.

Respuestas:

- A. 1, 2, 4
- B. 3, 5, 6.
- C. 2, 4, 5.
- D. 3, 4, 7.

244. La OMS, plantea varios objetivos esenciales para la cirugía segura y evitar eventos adversos en los pacientes. Seleccione los objetivos de la cirugía segura para minimizar los efectos adversos quirúrgicos:

- 1. Operar al paciente correcto.
- 2. Comunicar efectivamente.
- 3. Preparar al paciente.
- 4. Inducción anestésica.

- 5.Minimizar el riesgo de infección.
- 6.Recuperación post anestésica.
- 7.Impedir la retención de compresas.

Respuestas:

- A. 1, 2, 5, 7.
- B. 3, 5, 6 , 7.
- C. 1, 4, 5, 6
- D. 2, 3, 4, 6.

245. Para evitar errores en el registro de la administración de la medicación es importante que en la historia clínica del paciente se registre la aplicación del medicamento. ¿Qué datos correctos registraría usted como profesional enfermera en el Kardex?

- A. Nombre del medicamento, paciente correcto, dosis, iniciales de la persona que administra.
- B. Nombre del medicamento, acción correcta, forma correcta, respuesta correcta.
- C. Nombre de medicamento, dosis, vía, hora, forma correcta, paciente correcto.
- D. Fecha, nombre del medicamento, dosis, hora, vía, función, iniciales de la persona que administra.

246. Seleccione las medidas de prevención que se debe aplicar para evitar las infecciones hospitalarias asociadas a la salud (IAAS):

- 1.Aplicación de medidas de bioseguridad.
- 2.Educación y entrenamiento al personal.
- 3.Sistema de distribución de medicación.
- 4.Uso racional de antimicrobianos.
- 5.Limpieza y desinfección de ambientes.
- 6.Programas de motivación.
- 7.Registro de incidentes en pacientes.

Respuestas:

- A. 1, 2, 4, 5.
- B. 1, 3, 6, 7.
- C. 2, 3, 5, 6.
- D. 2, 5, 6, 7.

247. Complete el siguiente enunciado: Las infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS) se definen como _____localizados o _____ que se producen como_____ de la permanencia o _____de un paciente en una institución de salud que no estaba presente a su _____.

- A. Procesos, consecuencia, generalizados, concurrencia, ingreso.
- B. Procesos, generalizados, concurrencia, consecuencia, ingreso.
- C. Procesos, generalizados, consecuencia, ingreso, concurrencia.
- D. Procesos, generalizados, consecuencia, concurrencia, ingreso.

248.Seleccione las etapas de la vigilancia epidemiológica en infecciones asociadas con la atención de salud (IAAS):

- 1.Definiciones de hechos a vigilar.
- 2.Programas de supervisión.

- 3.Recolección de datos.
- 4.Consolidación y análisis de datos.
- 5.Programas de prevención.
- 6.Capacitación al personal.
- 7.Divulgación de los resultados.

Respuestas:

A. 1, 3, 4, 7.

B. 1, 2, 6, 7.

C. 2, 4, 5, 6.

D. 2, 3, 5, 6.

249. De acuerdo al ciclo de manejo de la gestión de desechos sólidos en las instituciones de salud, existen algunos sitios de almacenamiento. ¿Cuál es la denominación del centro de acopio temporal de desechos hospitalarios?

A. Almacenamiento de generación.

B. Almacenamiento primario.

C. Almacenamiento intermedio.

D. Almacenamiento final.

250. Usted aplica medidas de confort en el paciente encamado con una hemiplejía del lado izquierdo con músculos espásticos. ¿Qué ejercicios usted realiza al paciente?

A. Ejercicios activos de músculos.

B. Relajación muscular y cambios posturales.

C. Ejercicios de reeducación muscular.

D. Ejercicios de resistencia muscular.

251. Complete la siguiente información: El código deontológico es el _____ sistematizado de normas que el mismo _____ disciplinar comparte y al que se _____.

A. Grupo, equipo, mantiene.

B. Código, principio, juzga.

C. Mecanismo, módulo, cumple.

D. Conjunto, grupo, compromete.

252. Se requiere contar con un consentimiento informado suscrito en los siguientes casos.

EXCEPTO:

A. Procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos.

B. Tratamientos de radioterapia y quimioterapia

C. Situaciones de emergencia que pone en riesgo la vida.

D. Procedimientos de reproducción asistida.

253. Consentimiento informado en la práctica asistencial de salud es:

A. Un documento legal dentro del proceso de comunicación que forma parte de la relación del profesional de salud y el paciente, por el cual una persona autónoma acepta, niega o revoca una intervención de un miembro del equipo de salud.

B. No importa quien haga firmar el consentimiento informado, interesa más que esté firmado por el paciente. Quien realiza la intervención tiene que asumir el deber de informar.

- C. Un paciente con su capacidad intelectual alterada debe firmar el consentimiento informado para poder realizar los procedimientos que necesite. El Consentimiento Informado apoya en cumplir con todos los Principios Éticos.
- D. El consentimiento informado es básicamente un proceso verbal en la atención de salud. Considerar que una vez iniciada una intervención ya no puede ser retirada, bajo ningún concepto, aunque haya dejado de ser útil o el paciente capaz la rechace, es cuestionable ética y jurídicamente.

254. Del siguiente listado, ordene las actividades de enfermería que se deben realizar por prioridad, de acuerdo a las necesidades humanas alteradas en los pacientes atendidos en un servicio de hospitalización:

- a. Administrar medicación oral para el dolor a un paciente que tuvo una cirugía hace 3 días.
- b. Gestionar los documentos de un paciente que será dado de alta dentro de 2 días.
- c. Cuidado de la sonda vesical de un paciente y vaciado de la funda recolectora que tiene un drenaje de más de 500 ml de orina en 8 horas.
- d. Notificar al médico de turno el nivel de conciencia en un paciente al que se le realizó craneotomía hace 2 días para probar tolerancia a líquidos.

Respuestas:

A. d, a, c, b.

B. c, b, d, a.

C. b, c, a, d.

D. a, b, d, c.

255. Antes de la colocación del brazalete de identificación se efectúa obligatoriamente la verificación del paciente usando un procedimiento de interacción verbal entre el personal de salud pertinente y el paciente (o en su defecto el acompañante, responsable o representante legal del mismo, en el caso de imposibilidad del paciente). Ordene los pasos del proceso correcto para realizar la verificación del paciente:

- 1. Preguntar nombre completo del paciente.
- 2. Se coloca el brazalete de identificación al paciente.
- 3. Se solicita al paciente la entrega de un documento de identificación.
- 4. Preguntar fecha de nacimiento del paciente.
- 5. Preguntar número de cédula de identidad/ciudadanía del paciente.

Respuestas:

A. 1, 3, 2, 4, 5.

B. 2, 3, 1, 5, 4.

C. 1, 2, 4, 5, 3.

D. 3, 1, 5, 4, 2.

256. Identifique el rol de enfermería en la seguridad del paciente.

A. El personal de enfermería debe recibir formación esporádica sobre seguridad del paciente en las unidades de salud.

B. Mantiene un entorno seguro reduciendo el riesgo de enfermedad y lesión potencial, disminuyendo la estancia en el hospital y aumentando el sentido de bienestar del paciente.

C. La seguridad del paciente es responsabilidad única del familiar que le acompaña.

D. El profesional en Enfermería se convierte en un promotor y proveedor de cuidados seguros y ocasionales.

257. ¿Cuál es la definición de la Enfermería como profesión? Respuestas:

A. Aquella que proporciona atención de enfermería improvisando, centrada en el paciente, segura, meticulosa y experta.

B. La que realiza actividades profesionales del cuidado enfermero sujetas a la prescripción médica.

C. Un cuerpo de conocimientos teóricos que conduce a habilidades, capacidades, normas definidas, código de ética y autonomía para tomar decisiones y ejercer.

D. La que considera que la aplicación del proceso enfermero es optativo en algunos pacientes.

258. ¿En qué consiste el Proceso de Atención de Enfermería?

A. Aplicación de habilidades y destrezas para el ejercicio de la práctica.

B. Proceso que se orienta a mejorar y resolver los problemas de salud.

C. Aplicación del método ordenado y científico en la práctica asistencial de enfermería.

D. Proceso que al ejecutarse humaniza la atención e integra el cuidado.

259. De los siguientes enunciados. ¿Cuál corresponde al pensamiento crítico en Enfermería?

A. Proceso de indagación continua y perseverancia combinada dirigido al logro de un objetivo que permite emitir juicios basados en evidencia.

B. Proceso permanente de crecimiento intelectual y emocional que implica aprender nuevos conocimientos, resolver problemas, hacer juicios.

C. Modelo sistemático y ordenado de pasos para recoger datos y resolver problemas, utilizado por los profesionales del equipo sanitario.

D. Implica evaluar la solución en un cierto plazo de tiempo para cerciorarse si es efectiva, realizando diversas opciones si se repite un problema.

260. Paciente de 45 años, debe recibir un antibiótico de depósito, intramuscular, ¿cuál es la zona más adecuada según las características del medicamento?

A. Dorso glútea.

B. Vasto lateral.

C. Deltoides.

D. Vento glútea

261. Indique la teorizante a la que corresponde el siguiente enunciado: "La categoría de enfermería humanística, donde el papel de la enfermera es la realización (suplencia o ayuda) de las acciones que la persona no puede realizar en un determinado momento de su ciclo de vital, enfermedad, infancia o edad avanzada".

A. Florence Nightingale.

B. Marjory Gordon.

C. Nola Pender.

D. Virginia Henderson.

262. Relacione el tipo de diagnóstico enfermero con la definición que corresponda de acuerdo a la taxonomía de la NANDA.

TIPO DE DIAGNÓSTICO ENFERMERO	DEFINICIÓN
1. Real.	a. Juicio clínico en relación con la vulnerabilidad, de una persona, familia o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a una afección de salud o proceso vital.
2. De riesgo.	b. Juicio clínico en relación con una respuesta humana no deseada, de una persona, familia grupo o comunidad, a una afección de salud o proceso vital.
3. De promoción de la salud.	c. Es un juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos enfermeros específicos que aparecen de manera conjunta.
4. Síndromes.	d. Juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud humano.

Respuestas:

A. 1b, 2a, 3c, 4d.

B. 1a, 2c, 3d, 4b.

C. 1b, 2a, 3d, 4c.

D. 1c, 2d, 3a, 4b.

263. Complete el enunciado: Luego de formular los diagnósticos enfermeros, se inicia la etapa de planeación durante la cual se establecen _____ y los _____ utilizando la taxonomía NOC.

A. Resultados - indicadores.

B. Evaluaciones - resultados.

C. Intervenciones - resultados.

D. Ejecuciones - dominios.

264. De las siguientes opciones, indique uno de los pasos de la fase de ejecución en el proceso de atención de enfermería:

A. Establecer los objetivos esperados.

B. Determinar el logro de los objetivos propuestos.

C. Ordenar los datos sobre el estado de salud.

D. Poner en práctica el plan de atención.

265. Paciente de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata, el médico insiste que debe recibir quimioterapia, pero se niega a recibir el tratamiento. Determine el principio vulnerado por el profesional en la toma de decisiones éticas.

- A. Veracidad.
- B. Beneficencia.
- C. Autonomía.**
- D. No Maleficencia.

266. ¿Cuál es la sanción a quien incurra en homicidio culposo por mala práctica profesional según el Artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador?

- A. De 1 a 3 años con pena privativa de libertad.**
- B. De 3 a 5 años con pena privativa de libertad.
- C. De 1 a 2 años con pena privativa de libertad.
- D. De 2 a 3 años con pena privativa de libertad.

267. Hombre de 52 años con tumor cerebral, que debe someterse a una exéresis del tumor, el neurocirujano explica a profundidad el procedimiento quirúrgico, riesgos y beneficios. El paciente lee el consentimiento y firma antes de la cirugía. Seleccione que principio de la Bioética se cumple en este caso.

- A. Beneficencia.
- B. Autonomía.**
- C. Justicia.
- D. No maleficencia.

268. Seleccione la secuencia para la administración de un enema de limpieza:

1. Mantener la sonda en el recto de manera continua hasta el final de la instalación del líquido.
2. Insertar el extremo de la sonda lentamente, señalando la punta en dirección del ombligo.
3. Colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo (Sims).
4. Lubricar de 6 a 8 cm de la punta de la sonda rectal con gel lubricante hidrosoluble.
5. Pinzar el tubo después de que se instile toda la solución.
6. Abrir la llave reguladora y permitir que la solución entre despacio.

Respuestas:

- A. 3, 4, 2, 1, 6, 5.**
- B. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- C. 3, 4, 2, 5, 6, 1
- D. 4, 5, 6, 1, 2, 3

269. Seleccione la secuencia correcta que la enfermera debe seguir para transferir a un paciente desde la cama a la silla:

1. Valora a la paciente para comprobar la correcta alineación en la posición sentada.
2. Facilita que el paciente se siente en la silla, flexionando las caderas y rodillas al tiempo que se va bajando al paciente a la silla.
3. Indica al paciente que utilice los reposabrazos de la silla para apoyarse.
4. Ayuda al paciente a sentarse en el borde de la cama y esperar unos minutos en esa posición.
5. Balancea al paciente hasta la posición de pies.
6. Flexiona las caderas y rodillas, alinea las rodillas con las del paciente

Respuestas:

- A. 1, 3, 4, 5, 6, 2.
- B. 4, 3, 6, 5, 1, 2.
- C. 4, 6, 5, 3, 2, 1.
- D. 4, 6, 5, 1, 3, 2.

270. Complete el enunciado: A un paciente de 57 años con tensión muscular en la región lumbar, se le aplica una compresa _____ porque promueve la _____ muscular y reduce el dolor de los espasmos y rigidez.

- A. caliente – relajación.
- B. fría – vasoconstricción.
- C. caliente – vasoconstricción.
- D. tibia – relajación.

271. Relacione los objetos de acuerdo con las categorías de esterilización, desinfección y limpieza:

CATEGORÍAS

- 1. Estériles
- 2. Desinfectados
- 3. Limpios

OBJETOS

- a) Estetoscopio
- b) Instrumental quirúrgico
- c) Equipamiento respiratorio
- d) Endoscopios gastrointestinales
- e) Catéteres cardíacos o intravasculares
- f) Brazaletes de tensiómetro

Respuestas:

- A. 1be, 2cd, 3af.
- B. 1be, 2af, 3cd.
- C. 1cd, 2be, 3af.
- D. 1af, 2cd, 3be.

272. Al realizar la valoración de enfermería a un paciente con fracturas costales tras sufrir un accidente de tránsito presenta: disnea, deformidad en la pared torácica, uso de los músculos accesorios para respirar, falta de aliento y aleteo nasal. ¿A qué diagnóstico enfermero corresponde este caso?

- A. Deterioro del intercambio de gases.
- B. Patrón respiratorio ineficaz.
- C. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
- D. Deterioro de la ventilación espontánea.

273. Relacione el uso de guantes con el procedimiento:

CONDICIÓN

- 1. Guantes Estériles

PROCEDIMIENTO

- a) Curación de acceso venoso central
- b) Canalización de vía periférica
- c) Colocación de sonda Foley

2. Guantes de Exploración clínica

d) Aseo de genitales

Respuestas:

A. 1ab, 2cd.

B. 1cd, 2ba.

C. 1ac, 2bd.

D. 1db, 2ac.

274. Paciente de 25 años, al realizar el control de las medidas antropométricas se determina un IMC de 28.6. ¿Cuál es su estado nutricional?

A. Obesidad mórbida.

B. Sobrepeso.

C. Obesidad.

D. Normal.

275. ¿En qué arteria se debe tomar el pulso en un paciente hemodinámicamente inestable?

A. Temporal.

B. Radial.

C. Tibial posterior.

D. Carótida.

276. De la siguiente lista seleccione los "correctos" para la administración de medicación:

1. Hora

2. Registro de la administración correcta.

3. Educar al paciente.

4. Control de electrolitos concentrados.

5. Conciliación de medicamentos.

6. Dosis.

Respuestas:

A. 2, 3, 4, 6

B. 3, 4, 5, 6

C. 1, 4, 5, 6

D. 1, 2, 3, 6

277. Relacione la acción de la mecánica corporal con el fundamento para la prevención de lesiones en profesionales sanitarios :

Acción	Fundamento
1. Mantener la espalda, el cuello, la pelvis y los pies alineados.	a. Una amplia base de sustentación incrementa la estabilidad.
2. Flexionar las rodillas; mantener los pies muy separados.	b. Los músculos de las piernas son más fuertes y de mayor tamaño.
3. Usar los brazos y las piernas (no la espalda).	c. El deslizamiento requiere de menos esfuerzo que el levantamiento.
4. Resbalar al paciente hacia uno mismo, empleando una sábana transversa.	d. Reduce el riesgo de lesión para las vértebras y los grupos musculares lumbares.

Respuestas:

A. 1d, 2a, 3b, 4c.

B. 1a, 2b, 3c, 4d.

C. 1b, 2c, 3a, 4d.

D. 1c, 2d, 3a, 4b.

278. Seleccione los procedimientos en los cuales se debe utilizar la asepsia quirúrgica:

1. Durante los procedimientos que requieren perforación intencional de la piel del paciente como colocación de implantofix.

2. Durante los procedimientos que requieran atención directa como la administración de medicación.

3. Durante los procedimientos que implican inserción de catéteres o instrumentos quirúrgicos en las cavidades del cuerpo.

4. Durante la pérdida de la integridad de la piel como resultado de un traumatismo, una incisión quirúrgica o quemaduras.

5. Durante procedimientos que implican medición de pérdidas insensibles, ingesta y excreta durante el turno.

Respuestas:

A. 1, 2, 5

B. 1, 3, 4

C. 2, 3, 4

D. 3, 4, 5

279. Un grupo de profesionales de enfermería en un servicio de salud, mantienen un ambiente de trabajo respetuoso y de colaboración. ¿A qué elemento del Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), se refiere el comportamiento de este grupo?

A. La enfermera y las personas.

B. La enfermera y la práctica.

C. La enfermera y la profesión.

D. La enfermera y sus compañeras de trabajo.

280. Señale la secuencia correcta para retirarse el equipo de protección personal:

1. Gafas protectoras.

2. Mascarilla.

3. Guantes.

4. Bata.

Respuestas:

A. 1, 2, 3, 4

B. 3, 1, 4, 2

C. 3, 4, 1, 2

D. 2, 1, 4, 3

281. Con relación al procedimiento de la medición de la presión arterial complete el siguiente enunciado:

El paciente no debe haber fumado ni tomado cafeína en los _____ previos a la medición. Se bombea aire en el manguito hasta que el esfigmomanómetro alcanza

_____ por encima del punto en el que desapareció el pulso braquial. Se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya a un ritmo de _____ por segundo.

Respuestas:

- A. 30 minutos - 30 mmHg - 2 a 3 mmHg.
- B. 25 minutos - 20 mmHg - 5 a 10 mmHg.
- C. 20 minutos - 40 mmHg - 10 a 20 mmHg.
- D. 15 minutos - 10 mmHg - 2 a 3 mmHg.

282. Seleccione los focos de auscultación cardiaca en el examen físico:

- a. Aórtico
- b. Endocárdico
- c. Pulmonar
- d. Tricúspide
- e. Pericárdico
- f. Mitral

Respuestas:

- A. b, d, e, f.
- B. a, b, c, f.
- C. b, c, e, f
- D. a, c, d, f.

283. Señale los enunciados que correspondan a las medidas de prevención de infección del sitio quirúrgico para evitar las IAAS.

- 1. Realizar profilaxis antibiótica únicamente cuando este indicada.
- 2. Erradicar las infecciones activas del paciente previas a la cirugía.
- 3. Los circuitos de terapia intravascular, deben reemplazarse cada 72 horas.
- 4. Utilizar drenajes por contraabertura a circuito cerrado y por el menor tiempo posible.
- 5. Instalar las vías centrales por vía yugular o subclavia.

Respuestas:

- A. 1, 2, 4
- B. 2, 3, 5.
- C. 1, 3, 4
- D. 3, 4, 5

284. Complete el enunciado: Hombre de 27 años con infección estafilocócica en piel, requiere aislamiento _____ con uso de _____ y batas desechables.

Respuesta:

- A. de contacto – mascarilla N95.
- B. de contacto - guantes.
- C. por gotas – mascarilla quirúrgica.
- D. por aire – guantes.

285. En el Centro de Salud del cantón Archidona, un paciente cuya lengua es el Quichua es atendido. Al no encontrarse ninguna otra persona que hablara esta lengua, el médico prescribe la medicación y entrega al paciente; por su parte la enfermera realiza la

consejería. Según La Ley de Derechos y Amparo al Paciente ¿Cuál de los derechos del paciente es principalmente vulnerado?

A. Derecho a la información.

B. Derecho a una atención digna.

C. Derecho a no ser discriminado.

D. Derecho a la confidencialidad.

286. Seleccione los cuidados que el paciente necesita para la preparación de la resonancia magnética.

1. Informar al paciente que no debe consumir alimentos durante al menos 1 hora antes del estudio.

2. Después del examen tiene que ingerir abundantes líquidos para eliminar los agentes de contraste.

3. Antes de que ingrese al examen se le indicará que debe retirarse todos los objetos metálicos.

4. Informar al paciente que suspenda los medicamentos con complementos de hierro.

5. Obtener información del paciente sobre antecedentes alérgicos o si tiene insuficiencia renal.

Respuestas:

A. 1, 3, 4

B. 2, 3, 4

C. 1, 3, 5

D. 2, 4, 5

287. Indique cuál referente teórica es la indicada para brindar cuidados a pacientes que presentan dificultad en la movilización y déficit en el autocuidado:

A. Dorothea E. Orem.

B. Hildegard Peplau.

C. Nola Pender.

D. Florence Nightingale.

288. Seleccione la fundamentación para la técnica de aplicación del calor:

A. Aliviar los espasmos musculares secundarias a lesión articular.

B. Reducir el metabolismo basal.

C. Acelerar la absorción de exudados acumulados en una zona.

D. Lograr una anestesia local.

289. Relacione los desechos sanitarios de acuerdo a la clasificación del Ministerio de Salud:

Clasificación	Desechos sanitarios
1. Desechos peligrosos	a) Biodegradables
2. Desechos y/o residuos no peligrosos	b) Reciclables
	c) Farmacéuticos
	d) Infecciosos
	e) Radioactivos
	f) Comunes

Respuestas:

A. 1abc, 2def.

B. 1aef, 2bcd.

C. 1bcd, 2aef.

D. 1cde, 2abf.

290. El cuerpo humano pierde calor por diferentes mecanismos. Relacione el mecanismo con su respectiva definición.

MECANISMO DE PÉRDIDA DE CALOR	DEFINICIÓN
1. Radiación	a. Transferencia de la energía de calor cuando un líquido se convierte en gas.
2. Conducción	b. Transferencia de calor hacia afuera por el movimiento del aire.
3. Convección	c. Transferencia de calor de un objeto a otro con contacto directo.
4. Evaporación	d. Transferencia de calor desde la superficie de un objeto a la superficie de otro sin contacto directo entre los dos.

Respuestas:

A. 1a, 2b, 3c, 4d.

B. 1b, 2a, 3d, 4c

C. 1d, 2c, 3b, 4a.

D. 1c, 2d, 3a, 4b.

291. Relacione el grupo químico del desinfectante con el mecanismo de acción que corresponda.

GRUPO QUÍMICO	MECANISMO DE ACCIÓN
1. Alcoholes	a. Inhibición de reacciones enzimáticas
2. Liberadores de cloro	b. Precipitación y desnaturalización de proteínas
3. Aldehídos	c. Inactivación de enzimas productoras de energía
4. Compuestos de amonio cuaternario	d. Alteración en el ADN, ARN y la síntesis de proteínas

Respuestas:

A. 1b, 2a, 3d, 4c.

B. 1a, 2b, 3c, 4d.

C. 1d, 2c, 3b, 4a.

D. 1c, 2d, 3a, 4b

292. Al servicio de emergencia en el que usted labora el equipo de trabajo de Enfermería se encuentra debatiendo cuál es la mejor etiqueta diagnóstica para un paciente con dificultad respiratoria leve. A pesar de las diferencias de criterio del grupo en el manejo del paciente, el líder toma la decisión de rechazar la opinión de sus compañeros porque él cree tener la mejor opción de etiqueta diagnóstica para su cuidado. ¿Qué actitud sugiere para fomentar el pensamiento crítico en esta situación?

A. Imparcialidad.

B. Integridad.

C. Independencia.

D. Perseverancia.

193. Durante su jornada de trabajo, brinda atención a un neonato que requiere de lactancia materna cada 3 horas. Las primeras veces que viene la madre a dar de lactar usted no logra una comunicación efectiva, pero en la medida que avanza el turno sigue intentando mejorar la comunicación hasta que lo logra. ¿Qué actitud de pensamiento crítico se pone de manifiesto en esta situación?

A. Confianza.

B. Perseverancia.

C. Integridad.

D. Independencia.

194. ¿Cuál de los métodos de esterilización se aplica al utilizar el autoclave?

A. Radiación.

B. Gas.

C. Agua hirviendo.

D. Calor húmedo.

195. Con relación a las vías de administración de medicamentos complete el siguiente enunciado: La vía _____ se utiliza para _____. La aguja entra en la piel con un ángulo de _____.

Respuestas:

A. intradérmica – hacer pruebas de alergia – 5°-15°.

B. subcutánea – realizar pruebas de alergia – 45° o 90°.

C. intradérmica – administrar insulina – 45° o 90°.

D. subcutánea – administrar heparina – 5°-15°.

196. Para la administración de medicamentos por vía intramuscular en paciente de 2 años, el ángulo de inserción de la aguja con respecto a la piel es de:

A. 30°

B. 45°

C. 90°

D. 15°

197. Para la administración de medicamentos por vía intradérmica: ¿Cuál es el ángulo de inserción de la aguja con respecto a la piel?:

A. 15°

B. 25°

C. 45°

D. 90°

198. La rama de la farmacología que estudia la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de los medicamentos se conoce como:

A. Farmacognosia.

B. Farmacoterapia.

C. Farmacodinamia.

D. Farmacocinética.

199. Un pequeño porcentaje de las personas a las que se les administra medicación puede tener una respuesta anormal determinada genéticamente. ¿Como se denomina a esta respuesta anormal?

A. Idiosincrasia.

B. Reacción tóxica.

C. Reacción alérgica.

D. Efectos colaterales.

300. La administración de un fármaco de tal forma que se logre una concentración estable en el organismo se conoce como:

A. Dosis de carga.

B. Dosis media.

C. Dosis mínima.

D. Dosis de mantenimiento.

301. Relacione las lesiones de la piel con sus características:

LESIÓN

CARACTERÍSTICA

- | | |
|-------------|---|
| 1. Pápula | a) Pérdida profunda de la superficie de la piel |
| 2. Nódulo | b) Elevación circunscrita de la piel (llena de líquido seroso) menor de 1cm |
| 3. Vesícula | c) Elevación palpable, menor de 1cm |
| 4. Úlcera | d) Masa sólida elevada de 1 - 2 cm |

Respuestas:

- A. 1a, 2b, 3c, 4d.
- B. 1b, 2c, 3d, 4a.
- C. 1c, 2d, 3b, 4a.**
- D. 1d, 2c, 3a, 4b.

302. Paciente ingresa al servicio de Medicina Interna por presentar dificultad respiratoria, bradipnea, ortopnea, relacionado con deformidad de la pared torácica. Seleccione la etiqueta diagnóstica de enfermería:

- A. Deterioro de la ventilación espontánea.
- B. Patrón respiratorio ineficaz.**
- C. Deterioro del intercambio de gases.
- D. Deterioro de la integridad tisular.

303. La fase lútea del ciclo menstrual inicia después de la ovulación. ¿Cuál de los cambios que se mencionan ocurre en esta fase?

- A. El endometrio, grueso y congestionado, se vuelve hemorrágico.**
- B. El endometrio alcanza la vascularización y el espesor máximos.
- C. Aumenta la producción de la hormona luteinizante (LH).
- D. Aumenta la producción de hormona estimulante del folículo (FSH).

304. Las maniobras de Leopold sirven para:

- A. Evaluar la frecuencia cardíaca fetal.
- B. Valorar la dilatación y borramiento cervical.
- C. Evaluar la frecuencia, duración e intensidad de las contracciones.
- D. Determinar la presentación, posición y actitud fetal.**

305. Como enfermera/o de la comunidad, usted atiende un paciente con Tuberculosis Pulmonar. Como dato significativo de su historia psicosocial se destacan las malas condiciones socioeconómicas del paciente. ¿En cuál de las filosofías, teorías o modelos de Enfermería, se destaca este factor dentro del entorno como supuesto principal?

- A. Filosofía de Virginia Henderson.
- B. Filosofía de Florence Nightingale.**
- C. Teoría de Hildegard E. Peplau.
- D. Teoría de Nola J. Pender.

306. Para la administración de penicilina G benzatínica se utiliza la vía _____ en un ángulo de _____

Respuestas:

- A. Intradérmica - 15°.
- B. Subcutánea - 45°.
- C. Intramuscular - 90°.**

D. Intravenosa - 25°.

307. Se indica administrar 500ml de Lactato de Ringer en un tiempo de 24 horas. Calcular el número de gotas a administrar por minuto.

A. 7 gotas.

B. 8 gotas.

C. 9 gotas.

D. 6 gotas.

308. Como profesional de enfermería del servicio de cirugía, usted atiende un paciente que se encuentra inmóvil por temor a que su herida quirúrgica se abra, atendiendo que en una ocasión su papá fue operado y presentó esa complicación. ¿Cuál de los siguientes criterios debe ser priorizado en la valoración?

A. Riesgo de movilidad postoperatoria limitada.

B. Ajuste emocional del paciente a la cirugía.

C. Antecedentes familiares de la complicación.

D. Posibilidad real de dehiscencia de herida.

309. En relación con la Parotiditis. Complete el enunciado: Es una enfermedad que se transmite por vía _____, las partículas son _____. En éste caso, como medida de bioseguridad, se utiliza _____.

A. directa – mayores de 5 micras – mascarilla quirúrgica.

B. directa – menores de 5 micras – mascarilla N95.

C. indirecta – mayores de 5 micras – mascarilla N95.

D. indirecta – menores de 5 micras – mascarilla quirúrgica.

310. Como personal de salud del Servicio de Gineco-Obstetricia, usted debe realizar la correcta identificación de un Recién Nacido para garantizar la calidad en los procesos de atención de salud. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta, con respecto a la información que se debe rotular en el brazalete de identificación del recién nacido?

A. Nombres y apellidos de la madre, fecha y hora del nacimiento, sexo.

B. Nombre: "RN NN", fecha y hora de ingreso, sexo.

C. Nombres y apellidos del recién nacido, fecha y hora del nacimiento, sexo.

D. Nombre: "RN NN", cédula de identidad de la madre, sexo.

311. Seleccione las intervenciones de enfermería en pacientes sometidos a colonoscopia.

1. Preparación intestinal previa al examen.

2. Administración de medio de contraste.

3. Consentimiento informado.

4. Colocación de sonda nasogástrica.

5. Manejo del dolor.

6. Alimentación sin grasa la noche anterior.

Respuestas:

A. 1, 3, 5

B. 2, 3, 4

C. 2, 4, 6

D. 1, 5, 6

312. Según Dorotea Orem, la función de enfermería es:

- A. Apreciar las necesidades básicas humanas.
- B. Facilitar atención para influir de alguna forma sobre el paciente con el fin de que evolucione y obtenga un alto nivel de autocuidado.
- C. Diagnosticar y tratar según la situación lo exige, a través de los Cuidados básicos de Enfermería.
- D. Ayudar a las personas sanas y enfermas.

313. Sobre las competencias y deberes de enfermero y enfermera que se establecen en la Ley de ejercicio profesional de enfermería del Ecuador, señale la afirmación correcta:

- A. Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en su campo.
- B. Pertenecer y participar activamente a un gremio profesional.
- C. En casos de catástrofes el personal puede, a su elección, prestar sus servicios.
- D. Dar atención aunque no sea de su competencia a toda la población sin discrimen alguno.

314. Según la Teoría de los Sistemas de Enfermería de Dorothea Orem. Relacione los casos que se presentan con el sistema que corresponde:

SISTEMAS

CASOS

- | | |
|----------------------------|--|
| 1.Totalmente compensador | a.Paciente con fracturas de fémur derecho, requiere ayuda para moverse. |
| 2.Parcialmente compensador | b.Paciente ambulatorio con diagnóstico de hipertensión arterial requiere orientación sobre medicación y medidas dietéticas |
| 3.Apoyo educativo | c.Paciente con Ventilación Mecánica,internado en Unidad de Cuidados Intensivos |

Respuestas:

- A. 1c, 2b, 3a.
- B. 1a, 2b, 3c
- C. 1b, 2a, 3c
- D. 1c, 2a, 3b

315. Paciente de 24 años, cuya religión no permite transfusiones sanguíneas, al examen físico se encuentra consciente, presenta fractura de fémur con sangrado abundante. Se informa al paciente y familiares que es necesario realizar una transfusión sanguínea, ante lo cual el usuario se opone; sin embargo, el equipo de salud decide administrar paquetes de sangre. De acuerdo con la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. ¿Qué derecho de este fue vulnerado?

- A. Derecho a decidir.
- B. Derecho a la información.
- C. Derecho a la confidencialidad.
- D. Derecho a no ser discriminado.

316. ¿Cuál de los siguientes medicamentos empleados en el tratamiento de los trastornos tiroideos, es considerado un medicamento LASA (Like alike - Sound alike)?

- A. Liotironina.
- B. Levotiroxina.
- C. Propiltiuracilo.
- D. Metimazol.

317. Todos los enunciados son considerados ventajas para otorgar cuidados de enfermería sistematizados; EXCEPTO:

- A. El proceso de atención de enfermería dificulta la la interrelación del cuidado directo.
- B. La valoración se hace en base a los signos y síntomas y a las respuestas humanas.
- C. La atención de enfermería es integral.
- D. Permite llevar a cabo todo el proceso de atención de enfermería.

318. Durante la intervención quirúrgica de un paciente sometido a apendicectomía, bajo prescripción médica se administra medicamentos como parte del protocolo anestésico y de profilaxis antibiótica. Entre los medicamentos administrados por vía intravenosa se encuentran: Cefazolina 1 g, Propofol 200 mg, Ondansetrón 8 mg y Paracetamol 1 g. ¿Cuál de los medicamentos administrados es considerado de alto riesgo?

- A. Propofol 200 mg.
- B. Cefazolina 1 g.
- C. Ondansetrón 8 mg.
- D. Paracetamol 1 g.

319. Paciente de 65 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, al momento se encuentra hospitalizado por presentar arritmia. Entre los medicamentos a administrar se encuentran: Insulina humana NPH 40 IU, Diltiazem 120 mg, Enoxaparina 40 mg y Morfina 10mg. ¿Cuál de los medicamentos administrados es un antihipertensivo?

- A. Insulina humana NPH.
- B. Enoxaparina.
- C. Morfina.
- D. Diltiazem.

320. Relacione las vías de administración con sus ventajas

Vías de administración

Ventajas

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Sublingual | a) Efecto sistémico prolongado |
| 2. Subcutánea | b) Segura no rompe la barrera cutánea |
| 3. Oral | c) La absorción es más lenta |
| 4. Transdérmica | d) Produce un efecto local |

- A. 1d, 2c, 3b, 4a.
- B. 1a, 2b, 3c, 4d.
- C. 1b, 2c, 3d, 4a.
- D. 1c, 2d, 3a, 4b.

321. Relacione las vías de administración de medicación con los ángulos para la inserción que correspondan:

Vías de administración

1. Intramuscular
2. Subcutánea
3. Intradérmica

Respuestas:

- A. 1a, 2b, 3c.
- B. 1c, 2a, 3b.**
- C. 1b, 2c, 3a.
- D. 1c, 2b, 3a.

Ángulos de inserción

- a) 45 a 90 grados
- b) 5 a 15 grados
- c) 90 grados

322. Relacione los cálculos de dosis y sus equivalencias de volumen:

DOSIS

1. 1ml
2. 1gr
3. 1 gota
4. 1mg

EQUIVALENCIAS DE VOLUMEN

- a) 3 microgotas
- b) 1000 microgramos
- c) 20 gotas
- d) 1000 miligramos

Respuestas:

- A. 1a, 2b, 3c, 4d.
- B. 1b, 2c, 3d, 4a
- C. 1c, 2d, 3a, 4b.**
- D. 1c, 2a, 3b, 4d.

333. En la preparación preoperatoria para cesárea, usted está realizando un cateterismo vesical. Durante el procedimiento la sonda se desliza al interior de la vagina. ¿Qué debe hacer usted?

- A. Pedir ayuda a otro profesional de enfermería.
- B. Usar una sonda estéril nueva.**
- C. Extraer la sonda y redirigirla hacia el meato urinario.
- D. Extraer la sonda y limpiarla con gasa para reutilizar.

334. Como enfermera/o del Servicio de Urología, usted debe brindar orientaciones a pacientes que egresan con sondas permanentes. Entre las medidas dietéticas está orientar sobre el consumo de algunos alimentos que acidifican la orina para reducir el riesgo de infección de las vías urinarias. ¿Cuál de los siguientes alimentos son los adecuados para este tipo de pacientes?

- A. Cereales integrales y carnes.**
- B. Frutas y productos lácteos.
- C. Verduras y frutas.
- D. Legumbres y verduras.

335. Entre las intervenciones de enfermería en pacientes con sonda vesical permanente, está la orientación sobre la ingestión de líquidos. ¿Qué cantidad de líquidos le recomienda beber al paciente?

- A. Hasta 2000 ml.
- B. Hasta 1000 ml.
- C. Hasta 3000 ml.**
- D. Hasta 1500 ml.

336. Al aplicar enemas de limpieza con el objetivo de eliminar las heces, se emplean varias soluciones. ¿Qué tipo de solución estimula el peristaltismo aumentando el volumen en el colon e irritando la mucosa?

- A. Espumosa.
- B. Hipotónica.
- C. Hipertónica.
- D. Isotónica.

337. En la entrega y recepción de turno, usted se dispone a identificar a cada uno de sus pacientes. ¿A través de cuál mecanismo usted realiza la verificación cruzada en pacientes conscientes?

- A. Se le pregunta al familiar y al auxiliar de enfermería.
- B. Se constata con el brazalete y la información del Kardex.
- C. Se le pregunta a la licenciada que entrega el turno y al auxiliar de enfermería.
- D. Se pregunta al paciente por su nombre completo y se verifica en el brazalete colocado en el brazo.

338. ¿Qué tipo de tendido de cama se debe realizar en un paciente ambulatorio?

- A. Cama abierta.
- B. Cama post quirúrgica.
- C. Cama ocupada.
- D. Cama cerrada.

339. ¿Cuál es la escala de valoración utilizada para medir el dolor?

- A. Escala de Aldrete.
- B. Escala de Cincinati.
- C. Escala visual análoga.
- D. Escala de Bromage.

340. Como profesional de enfermería usted asiste un procedimiento aséptico, el paciente se encuentra desorientado y accidentalmente toca el campo estéril con su mano. ¿Cuál es la acción a seguir?

- A. Descartar los implementos y colocar un nuevo campo estéril.
- B. Sujetar la mano del paciente para que no siga contaminando.
- C. Continuar con el procedimiento para evitar más contaminación.
- D. Mantener bajo vigilancia el campo estéril para evitar otra contaminación.

341. ¿Cuáles son los valores normales de los electrolitos séricos Sodio y Potasio?

- A. - 135 - 145 mEq/L y 3.5 - 5 mEq/L.
- B. - 110 - 120 mEq/L y 2.0 - 2.5 mEq/L..
- C. - 125 - 130 mEq/L y 1.5 - 2.5 mEq/L.
- D. - 150 - 160 mEq/L y 6.5 - 7 mEq/L.

342. Al realizar la auscultación pulmonar escucha un ruido áspero, rechinante, superficial durante la inspiración y la espiración y que no desaparece con la tos. Seleccione el ruido respiratorio adventicio que indica el caso.

- A. Sibilancias.

- B. Roncus.
- C. Estertores crepitantes.
- D. Roce pleural.**

343. Al realizar la valoración de las mamas en una niña de 14 años, usted observa que hay una recesión de la aréola, con lo que solo el pezón sobresale. ¿En cuál de los estadios de Tanner se encuentra?

- A. Estadio 5.**
- B. Estadio 4.
- C. Estadio 3.
- D. Estadio 2.

344. Relacione las vías de administración con sus respectivas ventajas.

VÍAS	VENTAJAS
1.Sublingual	a) Pocos efectos adversos. Efecto sistémico prolongado
2.Subcutánea	b) Efecto farmacológico rápido al pasar directo a la circulación sistémica
3.Transdérmica	c) Inicio de acción más rápida que la oral
4.Tópica	d) Pocos efectos adversos. Evita problemas de absorción digestiva

Respuestas:

- A. 1a, 2c, 3d, 4b.
- B. 1b, 2d, 3c, 4a.
- C. 1a, 2b, 3c, 4d.
- D. 1b, 2c, 3d, 4a.**

345. Según prescripción médica, se le pide administrar 50 mg de Tramadol intravenoso; la presentación que usted dispone en el servicio es de 100 mg/2ml. ¿Cuál es la dosis que corresponde administrar en el paciente?

- A. 1 ml.**
- B. 2.5 ml.
- V. 1.5 ml.
- D. 4 ml.

346. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio se encuentran contemplados en la biometría hemática?

- A. Hemoglobina-fórmula leucocitaria.**
- B. Amilasa-creatinina.
- C. Fibrinógeno- Dímero D.
- D. Bicarbonato –Exceso de base.

347. Seleccione las prácticas seguras administrativas/asistenciales para la atención de salud:

- 1.Control de abreviaturas peligrosas
- 2.Programa de mantenimiento de equipos médicos
- 3.Prácticas quirúrgicas seguras
- 4.Notificación de eventos relacionados con la seguridad
- 5.Administración correcta de medicamentos

6. Manejo correcto de bombas de infusión

Respuesta:

A. 3, 4, 6

B. 1, 2, 3

C. 2, 4, 5

D. 1, 5, 6

348. ¿Cuál es el desecho que mayor riesgo adicional representa para la salud humana en los servicios de cuidado directo y que requieren de un manejo especial?

A. Desechos infecciosos.

B. Desechos comunes.

C. Desechos especiales.

D. Desechos radioactivos.

349. Ordene las fases de la gestión interna de los desechos sanitarios:

1. Tratamiento interno.

2. Almacenamiento interno o temporal.

3. Almacenamiento final.

4. Generación, almacenamiento primario.

5. Recolección y transporte interno.

Respuestas:

A. 4, 2, 5, 1, 3

B. 2, 5, 1, 4, 3

C. 5, 3, 4, 1, 2

D. 4, 1, 2, 3, 5

350. ¿Cuáles de los siguientes aspectos debe tener en cuenta al valorar el riesgo de úlcera por presión según la escala de Braden?

1. Respuesta verbal.

2. Percepción sensitiva.

3. Nutrición.

4. Apertura ocular.

5. Fuerza de cizallamiento.

6. Caída previa.

Respuestas:

A. 1, 2, 4

B. 1, 3, 6

C. 2, 3, 5

D. 4, 5, 6

351. Seleccione la definición de mecánica corporal:

A. Uso coordinado de los músculos para mantener el equilibrio y alineación.

B. Esfuerzo coordinado de un músculo que determina el equilibrio.

C. Uso coordinado de los músculos que no produce movimientos.

D. Uso de la fuerza física al levantar objetos.

352. Identifique el efecto que produce la aplicación del frío.

A. Reduce la vasoconstricción.

B. Reduce la hemorragia.

C. Aumenta el flujo sanguíneo.

D. Aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos.

353. Seleccione los alimentos recomendados en una dieta hipoalergénica.

A. Chocolate-huevos-banana.

B. Leche-mariscos-trigo.

C. Galleta de arroz-papa hervida-ensaladas cocidas.

D. Maíz-embutidos-maníes.

354. Paciente de 66 años con diagnóstico de cáncer de páncreas, que decide poner fin a la terapia con citostáticos a pesar de las orientaciones del personal de salud para que continúe con la medicación, tras un debate con el paciente, los miembros de la familia y el equipo de salud, se acató la voluntad del paciente. ¿Qué principio de la bioética se pone de manifiesto?

A. Autonomía.

B. Beneficencia.

C. No maleficencia.

D. Justicia.

355. Según prescripción médica le piden administrar furosemida 10 mg intravenoso y usted cuenta en el servicio con una ampolla de 20 mg/2 ml ¿Cuántos ml usted debe administrar?

A. 4 ml.

B. 20 ml.

C. 1 ml.

D. 40 ml.

356. ¿A qué aislamiento corresponde un paciente que llega al servicio con diagnóstico de Celulitis?

A. Aislamiento por contacto.

B. Aislamiento por aire.

C. Aislamiento por gotas.

D. Aislamiento estándar.

357. Identifique las ventajas de la higiene de mano con un preparado de base alcohólica.

A. Proporciona limpieza a las manos visiblemente sucias.

B. Garantiza la asepsia después de exponernos con la sangre.

C. Minimiza el uso de guantes ante una tarea aséptica.

D. Elimina de la mayoría de los gérmenes patógenos.

358. ¿Cuál es la meta en esencia del modelo de enfermería de Virginia Henderson?

A. La adaptación del paciente al medio ambiente.

B. La identificación de las necesidades humanas básicas.

C. El máximo grado de crecimiento personal del paciente.

D. La indiferencia del paciente y su familia.

359. El profesional en Enfermería de turno debe proporcionar un baño de esponja a paciente femenina de 75 años con problemas de movilidad. indique que parte del cuerpo bañaría en último lugar, tomando como referencia el protocolo del baño en paciente encamado.

- A. Zona perineal.
- B. Región torácica.
- C. Región abdominal.
- D. Miembros inferiores

360. Paciente acude al servicio de Consulta Externa por presentar incapacidad para ingerir alimentos, diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso importante. Seleccione la etiqueta diagnóstica prioritaria según la NANDA-I.

- A. Déficit de autocuidado: alimentación.
- B. Disposición para mejorar la nutrición
- C. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades.
- D. Patrón de alimentación ineficaz.

361. ¿Cuántas necesidades humanas básicas del paciente plantea el Modelo de Virginia Henderson?

- A. Diez.
- B. Catorce.
- C. Doce.
- D. Veintiuno.

362. ¿Cuál es la causa de flebitis en un paciente que presenta zona eritematosa como consecuencia de la administración de soluciones ácidas?

- A. Flebitis Química.
- B. Flebitis Bacteriana.
- C. Flebitis Mecánica.
- D. Flebitis Física

363. ¿Cuál es la etiqueta diagnóstica en un paciente de 59 años, hipertenso sin tratamiento habitual, que es ingresado en el servicio de emergencia por referir dolor precordial intenso que se irradia al brazo izquierdo, presenta frialdad, palidez y vómitos?

- A. Perfusión tisular periférica ineficaz.
- B. Incumplimiento del régimen terapéutico.
- C. Déficit de volumen de líquidos.
- D. Perfusión tisular cardíaca ineficaz.

364. Paciente de 68 años que padece de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), al chequear los signos vitales se constata una saturación de oxígeno de 84%, ante esta situación el médico ordena la administración de oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Qué dispositivo para la administración de oxígeno se debe colocar al paciente?

- A. Mascarilla simple.
- B. Cánula nasal.
- C. Mascarilla Venturi.
- D. Mascarilla de reciclamiento parcial.

365. "Un juicio clínico sobre las respuestas de una persona o grupo a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base de los cuidados para el logro de los objetivos, de los que enfermería es la responsable". Esta definición pertenece a:

- A. Diagnóstico de Enfermería.
- B. Proceso de Atención de Enfermería-PAE.
- C. Cuidado de Enfermería.
- D. Problema de Enfermería.

366. Tomando como referencia los diagnósticos de enfermería con estructura NANDA.

¿Cuál es la formulación correcta del diagnóstico con etiqueta "Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos"?

- A. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con cirugía abdominal, manifestado por obstrucción intestinal
- B. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos relacionado con obstrucción intestinal, ascitis, sepsis, lesión traumática, quemaduras.
- C. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con cirugía abdominal, manifestado por ascitis. I.
- D. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos, relacionado con lesión traumática, manifestado por la evolución de la fractura de cadera.

367. ¿Cuál de los elementos es una habilidad del pensamiento crítico para la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería?

- A. Uso del conocimiento.
- B. Perseverancia.
- C. Independencia.
- D. Confianza.

368. Señale el diagnóstico de enfermería que corresponde a la definición operacional: La inspiración y/o espiración que no proporcionan ventilación adecuada.

- A. Deterioro del intercambio de gases.
- B. Limpieza ineficaz de la vía aérea.
- C. Estado respiratorio: ventilación.
- D. Patrón respiratorio ineficaz.

369. Relacione las actividades de enfermería con la fase correcta del Proceso de Atención:

FASE DEL PROCESO

- 1. Valoración
- 2. Diagnóstico
- 3. Planificación
- 4. Ejecución
- 5. Evaluación

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

- a) Análisis e interpretación de datos
- b) Determina el logro de los objetivos propuestos
- c) Realización de una explotación física
- d) Determina las prioridades inmediatas
- e) Práctica del plan de cuidados

Respuestas:

- A. 1b, 2a, 3d, 4e, 5c.
- B. 1c, 2d, 3a, 4e, 5b.
- C. 1b, 2a, 3e, 4d, 5c
- D. 1c, 2a, 3d, 4e, 5b.

370. La teorizante que permite desarrollar una relación interpersonal entre el paciente y el profesional de enfermería es:

- A. Hildegard Peplau.
- B. Dorotea Orem.
- C. Virgia Henderson.
- D. Nola Pender.

371. ¿Cuál es la longitud y el peso del útero en una mujer nulípara?

- A. El útero en una mujer nulípara mide 10-15 cm de longitud y el peso promedio es de 500 gramos
- B. El útero en la mujer nulípara mide 6-8 cm de longitud y el peso promedio es de 60 gramos. .
- C. El útero en una mujer nulípara mide 4 cm de longitud y el peso promedio es de 40 gramos.
- D. Esta opción de repuesta es incorrecta porque útero en una mujer nulípara mide 9-10 cm de longitud y el peso promedio es de 110 gramos.

372. Ordene las secciones anatómicas de las trompas de Falopio desde la porción proximal a la distal:

- 1. Intersticial
- 2. Ampollar
- 3. Ístmica
- 4. Infundibular

Respuestas:

- A. 1, 3, 2, 4
- B. 1, 2, 3, 4
- C. 3, 4, 1, 2
- D. 3, 1, 2, 4

373. Paciente hospitalizado presenta picos febriles entre 39 °C y 40 °C a las 16 horas de su hospitalización la temperatura desciende a los 36.5 °C. ¿Cuál es el patrón de fiebre?

- A. Continua.
- B. Remitente.
- C. Intermittente.
- D. Recurrente.

374. Relacione correctamente el nombre de las autoras con las categorías conceptuales de las teorías de enfermería:

1. Myra Levine	A. La Enfermería "consistía en hacerse responsable de la salud de las personas" y lo planteó en "Notas de Enfermería".
2. Florence Nightingale	B. La Enfermería se define "como una práctica del cuidado, cuya ciencia sigue una moral y una ética del cuidado y la responsabilidad".
3. Patricia Benner	C. La Enfermería se define como "proceso fundamental para las enfermeras y para otras tareas propias del cuidar", en donde el cuidar implica preocuparse por un semejante.
4. Kari Martinsen	D. La Enfermería tiene como objetivo "promover la adaptación y mantener la globalidad a través de la interacción humana".

Respuestas:

- A. 3C, 2B, 4D, 1A.
- B. 1C, 4B, 2A, 3D.
- C. **4C, 3B, 2A, 1D.**
- D. 1B, 2C, 4D, 3A.

375. Ordene la secuencia de las actividades a cumplir en la aplicación de la metodología del proceso enfermero?

- 1. Formular un plan de cuidados.
- 2. Poner en práctica el plan de cuidados de enfermería.
- 3. Evaluar los resultados del plan de cuidados realizado.
- 4. Recoger datos para determinar exactamente cuáles son los problemas a resolver.

Respuestas:

- A. **4, 1, 2, 3.**
- B. 3, 1, 4, 2.
- C. 2, 4, 3, 1.
- D. 1, 2, 3, 4.

376. Ordene las etapas del proceso de atención de enfermería.

- 1. Ejecución
- 2. Planificación
- 3. Valoración
- 4. Evaluación
- 5. Diagnóstico

Respuestas:

- A. 5, 3, 1, 4, 2
- B. 1, 2, 4, 3, 5
- C. 4, 5, 2, 1, 3
- D. **3, 5, 2, 1, 4**

377. ¿Quién es considerada como la principal representante de la enfermería que logró postularla como ciencia?

- A. Virginia Henderson.
- B. Maryory Gordon.
- C. Martha Rogers.
- D. Florence Nightingale.

378. Seleccione el supuesto que guarda relación con la teoría planteada por Florence Nightingale:

- A. Un entorno sano y favorable influye en el estado de salud físico y psíquico del hombre.
- B. Los métodos de asistencia deben basarse en la relación de ayuda y/o de suplencia de enfermería hacia el paciente.
- C. La enfermería es un proceso terapéutico interpersonal, que hace posible la salud.
- D. Los factores cognitivo-perceptivos motivan las actividades de promoción de la salud.

379. Una paciente de 17 años solicita orientación sobre la aplicación de la nueva vacuna para VPH. Según la teoría de los sistemas planteada por Dorothea E. Orem. ¿Cuál se aplica en este caso?

- A. Parcialmente compensador.
- B. Apoyo educativo.
- C. Totalmente compensador.
- D. Autocuidado.

380. En el desarrollo histórico de la práctica de la enfermería, la religión ha jugado un papel fundamental. Seleccione la orden religiosa que se ocupó del cuidado de las personas con lepra, sífilis y trastornos crónicos de la piel.

- A. Los Hermanos Alexianos.
- B. Las Diaconisas de Kaiserswerth.
- C. Los Caballeros de San Lázaro.
- D. Los Caballeros Hospitalarios.

381. Paciente que sufre un accidente de tránsito con traumatismo craneoencefálico moderado y es trasladado a un hospital privado para recibir atención de emergencia, no cuenta con seguro médico. ¿Cuál debe ser la decisión correcta del equipo de salud?

- A. El paciente debe ser recibido y atendido.
- B. Exigir al paciente o familiares algún medio de pago previo a la atención de salud.
- C. Trasladar inmediatamente al paciente a un centro de salud del MSP.
- D. El equipo de salud no podrá exigir el cobro por los servicios prestados una vez recuperado el paciente.

382. ¿En qué etapa del proceso de Enfermería: organiza, analiza, sintetiza y resume los datos recogidos?

- A. Diagnóstico.
- B. Planeación.
- C. Evaluación.
- D. Valoración.

383. Enfermería al proporcionar los Cuidados, debe respetar los principios bioéticos. Indique, ¿Cuáles son estos principios?

- A. Beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía.
- B. La responsabilidad y solidaridad.
- C. La veracidad, confidencialidad, fidelidad, tolerancia.
- D. Solidaridad y tolerancia.

384. Dentro de la institucionalización del cuidado enfermero, surgen mujeres encargadas de brindar la atención a los enfermos, entre ellas las matronas romanas. ¿Cuál matrona se destacó en esa época?

- A. Febe
- B. Fabiola.
- C. Peplau.
- D. Henderson.

385. ¿Cuál es el objeto de la disciplina del saber enfermero?

- A. La enfermedad
- B. El cuidado.
- C. La salud.
- D. Los pacientes.

386. Según Abraham Maslow y su teoría de las necesidades humanas, describe la supervivencia y desarrollo del sujeto como un proceso de búsqueda constante de seguridad. En qué nivel de la pirámide se encuentran las necesidades de seguridad del ser humano:

- A. Segundo nivel.
- B. Primer nivel.
- C. Tercer nivel.
- D. Cuarto nivel.

387. Seleccione los tres primeros pasos del procedimiento para la toma de muestra de laboratorio:

1. Reenfundar las agujas y descartarlas en el contenedor respectivo.
2. Utilizar técnica aséptica y medidas de bioseguridad.
3. Realizar el lavado de manos respectivo.
4. Evitar las salpicaduras de secreciones con alcohol antiséptico.
5. Colocar la sangre en el tubo de recolección para la muestra por la paredes

Respuestas:

- A. 1, 4, 5
- B. 2, 3, 5
- C. 1, 3, 4
- D. 2, 3, 4

388. Usted se encuentra en el área de Coronarios y debe administrar medicamentos bajo medidas de seguridad, pero evidencia la inexistencia de protocolos. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta el personal de enfermería?

- A. Suceso adverso.
- B. Seguridad del paciente.
- C. Error activo
- D. Factor contribuyente.

389. La enfermera está dando una charla sobre educación sexual y reproductiva a los adolescentes en la comunidad. ¿A qué método mecánico o de barrera se refiere cuando indica que, es un casquete en forma de domo que se coloca en el fondo de la vagina sobre el orificio cervical, evitando el ingreso de los espermatozoides en el útero?

- A. Dispositivo intrauterino (DIU).
- B. Aro plástico.
- C. Diafragma.
- D. Espermicida.

390. La calidad es un concepto que ha evolucionado hasta nuestros días, existe un pensador que hace referencia a la calidad como la satisfacción del cliente. ¿Cuál es el autor que hace referencia al enunciado?

- A. Joseph M. Juran.
- B. Walter A. Shewhart.
- C. Avedis Donabedian.
- D. W. Edwards Deming.

391. Según el modelo de causalidad, a las acciones u omisiones, incluyendo errores y violaciones, que tienen consecuencias adversas inmediatas, se les denomina:

- A. Fallas activas.
- B. Fallas recurrentes.
- C. Fallas latentes.
- D. Fallas inactivas.

392. Son medidas que involucran a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. ¿A qué principio básico de Bioseguridad se refiere este enunciado?

- A. Uso de barreras.
- B. Universalidad.
- C. Medios de eliminación de material contaminado.
- D. Equipos de seguridad.

393. Usted como líder del servicio de Emergencia debe orientar al personal de nuevo ingreso para evitar dificultades, a pesar de su experiencia en otras áreas. La inducción es necesaria para orientar al personal de enfermería ya que se enfrenta a un área desconocida. Este enunciado a qué teorizante hace referencia.

- A. Madeline Leininger.
- B. Jean Watson.
- C. Patricia Benner.
- D. Kristen Swanson.

394. En su práctica hospitalaria, como líder del servicio debe orientar a los profesionales enfermeros de nuevo ingreso, y al hablarles sobre la diferencia que tiene la enfermería de otras disciplinas sanitarias, describe el concepto de cuidar como la esencia y el dominio central, unificador y dominante para satisfacer las necesidades del paciente. ¿Cuál es la teorizante que describe este modelo?

- A. Madeline Leininger.
- B. Patricia Benner.
- C. Kristen Swanson.
- D. Jean Watson.

395. Al recibir el turno identifica un paciente poco colaborador con el equipo de salud, el personal no logra establecer una relación empática lo que dificulta proporcionarle una atención adecuada para su recuperación. ¿Cuál es la teorizante que usted aplicaría para este caso?

- A. Betty Neuman.
- B. Callista Roy.
- C. Hildegard Peplau.
- D. Jean Watson

396. Paciente acude al Centro de Salud por presentar dificultad para dormir, manifiesta que no puede descansar por problemas emocionales los cuales interfieren su estilo de vida. ¿Cuál es la teorizante que se pone de manifiesto?

- A. Virginia Henderson.
- B. Nola Pender.
- C. Martha Rogers.
- D. Callista Roy.

397. Usted como personal de enfermería debe establecer objetivos esperados en el plan de atención. ¿En qué fase se identifica estos objetivos?

- A. Ejecución.
- B. Evaluación.
- C. Diagnóstico.
- D. Planificación.

398. Como profesional de enfermería, debe brindar cuidado interpersonal para promover la salud y prevenir la enfermedad a través de las intervenciones en su quehacer diario, permitiendo generar la curación del cuerpo y alma. ¿A qué teorizante hace referencia?

- A. Patricia Benner.
- B. Jean Watson.
- C. Kristen Swanson.
- D. Madeline Leininger

399. De los siguientes enunciados, seleccione los objetivos que se establecen en los modelos teóricos enfermeros que sustentan la disciplina.

1. Proporcionar conocimientos para mejorar la administración, la práctica la formación y la investigación en la enfermería.
2. Desarrollar planes curriculares para la formación de la enfermería.

3. Explicar la práctica enfermera como diferente y distinta de la práctica de medicina.
4. Formular reglamentos que interpreten la normativa y legislación en enfermería.
5. Orientar la investigación para extender las bases del conocimiento de la enfermería.
6. Proveer una estructura y una lógica sistemática para las actividades de la enfermería.

Respuestas:

- A. 1, 2, 5, 6
- B. 2, 3, 4, 6
- C. 1, 2, 3, 5
- D. 1, 4, 5, 6

400. Al aplicar en la práctica de enfermería, la reflexión sobre las propias experiencias, identificando las maneras en que se puede mejorar el propio desempeño. ¿A qué habilidad del pensamiento crítico se refiere?

- A. Inferencia.
- B. Análisis.
- C. Autorregulación.
- D. Explicación.

401. Personal de enfermería con experiencia de 2 años, planifica sus intervenciones con base a protocolos, sin embargo, identifica que existe limitaciones para cumplir las actividades, por lo que coordina y diseña planes de mejora para el cuidado del paciente. De acuerdo a la teoría de Patricia Benner ¿cuál es el nivel de experiencia que demuestra el profesional?

- A. Competente.
- B. Experta.
- C. Eficiente.
- D. Principiante.

402. Paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, acude a la unidad de salud en área rural y es recibido por el profesional de enfermería, refiere sentirse agitado, confuso y con dificultad para respirar. Al momento taquiarritmia de 140 latidos por minuto, diaforesis, retracción intercostal y esternoclavicular. Repentinamente, cae desplomado sobre la camilla lo que sugiere un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la primera acción a realizar según el protocolo de RCP básico?

- A. Activar el sistema de emergencia disponible.
- B. Comprobar si el paciente responde
- C. Pedir ayuda en voz alta a personas cercanas
- D. Conseguir un desfibrilador externo automático (DEA) y equipo para emergencias (o delegar a alguien).

403. Recién nacida de 4 horas de vida, se encuentra en alojamiento conjunto con su madre y cursa el período de transición o adaptación a la vida extrauterina. En la monitorización se identifican los siguientes signos: 37 grados centígrados frecuencia respiratoria 50 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuta, 96%, RN sin signos de hipotonía. ¿A que corresponde con estos resultados?

- A. Recién nacida con alteración en todos los signos.
- B. Recién nacida con dificultad respiratoria.

- C. Recién nacida con taquicardia.
- D. Recién nacida con signos vitales normales.**

404. Paciente de 21 años llega al servicio de ginecología para tratamiento clínico y usted como personal de enfermería debe proporcionar cuidados de la salud y ejercer los principios bio éticos que principios tener en cuenta

Autonomía beneficencia no maleficencia y justicia

405. Mujer de 23 años primípara permanece en la sala de partos en conjunto con su recién nacido masculino a término. Durante el parto no se presentan complicaciones ni riesgo, la mujer solicita información sobre cuándo debe iniciar la lactancia materna. ¿Qué información le ofrece?

- A. Iniciar la lactancia materna cuando pase a hospitalización
- B. Iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora antes que abandone la sala de partos**
- C. Iniciar la lactancia materna una hora después de abandonar la sala de partos
- D. Iniciar la lactancia materna cuando pase recuperación

406. Paciente masculino de 45 años es llevado al quirófano para resolución quirúrgica de emergencia. Durante el transquirúrgico el cirujano solicita al instrumentista preparar una solución con heparina y otra con antibiótico, debido al estrés del momento se confunden las soluciones preparadas, el médico solicita la solución con heparina, pero el instrumentista le pasa la solución con antibiótico. El instrumentista reconoce su error frente al equipo quirúrgico y lo soluciona de inmediato. ¿Cuál es el atributo característico que presenta el instrumentista quirúrgico al reconocer su error:

- A. Autocontrol emocional.
- B. Honestidad y conducta ética.**
- C. Habilidades organizativas.
- D. Habilidades para la resolución de problemas.

407. Un paciente de 23 años, luego de sufrir caída desde su propia altura, presenta pérdida de la

conciencia, y una herida cortante antebrazo derecho, llega al servicio de emergencia, recibe valoración médica y usted cumple las indicaciones, usted como profesional de enfermería realiza el diagnóstico enfermero, que implica la utilización de los datos de la valoración. ¿A qué proceso corresponde la toma de decisiones?

- A. Valoración, diagnóstico, intervenciones.
- B. Conocimiento, estándares, actitudes, comportamientos del paciente.
- C. Agrupación de datos, identificación de los problemas de salud del paciente, formulación del diagnóstico.**
- D. Recogida de datos, entrevista, anamnesis.

408. Un paciente de 45 años atendido en emergencia por presentar dificultad respiratoria. A la valoración de enfermería presenta derivien taquipnea, fiebre y saturación de oxígeno de 75% al ambiente. Es diagnosticado de neumonía, como parte del tratamiento le prescriben oxígeno 6 litros por minuto. ¿Cuál de los siguientes dispositivos para administrar oxígeno es adecuado utilizar en este caso

- A. Mascarilla simple.
- B. Mascarilla sin reciclamiento.**
- C. Mascarilla de reciclamiento parcial.
- D. Mascarilla aerosol.

409. Enfermero responsable de la supervisión y gestión de las unidades de hospitalización, debe elaborar el censo diario, respecto al numero de ingresos con el numero de camas disponibles, con el fin de descongestionar are as, permitir la fluidez y evitar estancias prolongadas. ¿Qué indicador permite elaborar el informe?

- A. Porcentaje de ocupación.
- B. Giro cama.
- C. Índice de ocupación.**
- D. Índice de rotación.

410. Mujer de 20 años casada, de profesión estudiante, acude al centro de salud porque refiere haber sufrido recientemente insultos, ritos y menosprecio por parte de su esposo, manifiesta que este acontecimiento se repite con frecuencia y que ha repercutido de nanera negativa en su vida académica y social. ¿A qué tipo de violencia hace referencia?

- A. Basada en género
- B. Física.
- C. Psicológica.**
- D. Sexual.

411. Paciente de 28 años, portadora de una sonda de alimentación gastrica, con diagnóstico de VIH hace 5 años. ha tenido dificultades para mantener una alimentación adecuada, lo cual ha resultado en pérdida de 5 kilos de peso en menos de un mes, cuál es el tipo de fórmula para la notición enteral adecuado en este coso

- A. Fórmula polimérica.
- B. Fórmula modular.
- C. Fórmula elemental,
- D. Fórmula especializada**

412. Paciente de 77 años con antecedentes patológicos de evento cerebro vascular, desde hace 10 años la recuperación ha sido lenta, tiene limitación para varias actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. En la valoración se le presentan varios objetos de aseo personal pero no conoce sus nombres y tampoco dice que se pueden hacer con ellos.

413. ¿Qué alteración presento?

Agnosia

414. El profesional de enfermería se prepara para proporcionarle los cuidados postmortem, antes de que el cuerpo se tome consistente, debido al cambio de pH y ausencia de ácido adeniltrifosfórico provocando rigidez muscular. ¿Cuál es la etapa postmortem a la que se hace referencia?

- A. Descomposición:
- B. Rigor mortis.**
- C. Algor mortis.
- D. Lividez cadavérica o coloración cianótica.

415. Una gestante de 27 años, de 38 semanas de embarazo fue intervenida quirúrgicamente por parto por cesárea y se mantiene en hospitalización. A la valoración de enfermería se presenta tos, falta de aire, en los miembros inferiores se inspecciona que existe edema, dolor, sensación de calor local y color violáceo. ¿Qué problema tiene la puérpera?

- A. Várices postcesárea.
- B. Infección de la herida.
- C. Enfermedad tromboembólica.**
- D. Erisipela.

416. Paciente masculino de 48 años ingresa al servicio de emergencia por una caída, refiere cefalea intensa (escala de EVA de 8/10), acúfenos y escotomas de una duración de 2 horas aproximadamente, se decide su ingreso para observación y realización de pruebas de imagen. ¿Cuáles son los signos de alarma de alteración neurológica que el profesional de enfermería debe valorar?

- A. Dolor o malestar torácico, edema periférico y palpitaciones.
- B. Dolor, convulsiones, vértigo y debilidad muscular.**
- C. Disnea, convulsiones, dolor torácico y hemoptisis.
- D. Dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos y diarrea.

417. Madre acude al centro de salud, con su hijo de 1 año, por presentar cuadro de 2 días de evolución con devia, sibilancias, tiraje subcostal e intercostal, la saturación se encuentra en 78%, siendo necesario la administración de oxígeno por medio de un sistema de alto flujo. ¿Qué dispositivo de oxígeno de alto flujo debe colocar a este niño?

- A. Cánula nasal pediátrica.
- B. Mascarillas con reinhalación parcial.
- C. Mascarilla Venturi.**
- D. Mascarilla simple.

418. Un equipo de profesionales del Centro de Salud, se movilizan a dar asistencia en una comunidad rural donde persisten desigualdades en las condiciones socioeconómicas. Durante la visita domiciliar una familia refiere la falta de infraestructura sanitaria desde hace varios años y enfermedades parasitarias.

La profesional de enfermería observa diferentes factores intermedios relacionados con prácticas sanitarias inadecuadas de la vivienda y en la toma de decisiones del cuidado de los padres al niño menor de dos años. ¿En cuál determinante de la salud trabaja el profesional enfermero?

- A. Ambiental.
- B. Social.**
- C. Biológico.
- D. Conductual.

419. Profesional enfermero jefe de servicio se caracteriza por tomar decisiones sin participación del grupo, asignar trabajo sin dar explicación, es dominante, personaliza los elogios y las críticas al grupo, ¿Qué tipo de liderazgo ejerce este enfermero de acuerdo a la teoría de los estilos de liderazgo?

- A. Complaciente.

- B. Democrático,
- C. Liberal,
- D. Autocrático.**

420. Paciente femenina de 80 años en el área de clínica con un diagnóstico de insuficiencia cardiaca. Al momento se encuentra dependiente, inquieta, agitada. ¿Cuál es la primera medida a tomar en este caso para evitar riesgo?

- A. Adelantarse a las necesidades.
- B. Ofrecer ayuda cuando sea necesario.
- C. Proporcionar intimidad el momento necesario.
- D. Dejar las barandillas levantadas al dejarse de la cabecera.**

421. Recién nacido masculino permanece en alojamiento conjunto con la madre en la sala de parto, durante la atención de enfermería se realiza antropometría, recibe la profilaxis ocular y antihemorrágica, se inicia lactancia materna. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica de Salud sustentan estas actividades?

- A. Artículo 6.**
- B. Artículo 12.
- C. Artículo 69.
- D. Artículo 14.

422. Paciente de 24 años, en segundo día de hospitalización en el área de cirugía general, con diagnóstico de apendicitis flemonosa, se le realizó una laparotomía exploratoria, al momento refiere leve dolor abdominal. A la exploración física paciente despierto. abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, con presencia de un drenaje Jackson Pratis en hipocondrio derecho. eliminando líquido seroso, 30 ml en 24 horas. ¿Qué características tiene este sistema de drenaje?

- A. Drenaje activo, cerrado, aspiración negativa, con una capacidad aproximada de 100 ml.**
- B. Drenaje pasivo, abierto, no aspirativo formado por un fragmento de goma.
- C. Dispositivo pasivo, flexible de forma cóncava que actúa por capilaridad.
- D. Drenaje tipo T, puede ser abierto o cerrado y tiene una acción por gravedad.

423. Primigesta con 36 semanas de gestación ingresa a la unidad de salud. A la valoración de enfermería presenta estado de conciencia alerta, signos vitales: frecuencia cardíaca 119 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, presión arterial: 140 sistólica, diastólica 110 milímetros de mercurio, temperatura 37 grados centígrados; saturación de oxígeno 96 %, proteinuria dos cruces en tirilla re activa. Al examen físico el profesional enfermero encuentra edema en extremidades inferiores. Aplicando la escala de Score MAMÁ. ¿Cuál es el puntaje y pasos a seguir en este caso?

- A. Puntaje 6; aplicar Score MAMA cada hora y registrar.
- B. Puntaje 11: aplicar Score MAMÁ cada dos horas y registrar.
- C. Puntaje 8; aplicar Score MAMA cada treinta minutos y registrar.**
- D. Puntaje 4: aplicar Score MAMA cada cuatro horas y registrar

424. ¿Cuál es la clasificación de los servicios de salud por niveles de atención según el MAIS-FCH

- A. Prehospitalaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención.

- B. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de atención.
- C. Primer nivel segundo nivel tercer nivel de atención.
- D. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel de atención y prehospitolaria.**

425. Un profesional de enfermería se encuentra en la fase de selección de un instrumento adecuado para evaluar los niveles de ansiedad. como parte de la elaboración de una propuesta de investigación. ¿En qué etapa del proceso de investigación se encuentra el profesional de enfermería?

- A. Identificación del problema.
- B. Análisis de los datos.
- C. Ejecución del estudio.
- D. Diseño del estudio.**

426. Hombre de 34 años, soltero, refiere que tiene tos desde hace 15 días, vive en hacinamiento arrendando un cuarto, está sin trabajo. Al momento presenta fiebre, expectoración con manchas sanguinolentas. El profesional enfermero averigua en el interrogatorio que la hermana del paciente falleció con tuberculosis hace 8 días. ¿cuál es la acción correcta a seguir en este caso?

- A. La segunda muestra de esputo recoger en ocho días en el domicilio del paciente.
- B. Se toma la primera muestra de esputo en 15 días en frasco previamente rotulado.
- C. Solicitud para examen bacteriológico y recolección de muestra de esputo para**
- D. baciloscopia.**
- E. La búsqueda de SR exclusivamente en visitas domiciliarias, reuniones comunitarias.

427. Paciente femenina de 15 años en una visita domiciliaria refiere mala comunicación con sus padres, conflictos frecuentes y como producto de ello bajo rendimiento académico. En la valoración enfermera identifica que se trata de una familia disfuncional. ¿En base a qué dominio de la NANDA construye el diagnóstico para esta familia?

- A. Dominio 1: Promoción de la salud.
- B. Dominio 5: Percepción/cognición.
- C. Dominio 7: Relación de roles.**
- D. Dominio 10: Principios de vida.

428. Mujer de 20 años casada, de profesión estudiante, acude al centro de salud porque refiere haber sufrido recientemente insultos. gritos y menosprecio por parte de su esposo, manifiesta que este acontecimiento se repite con frecuencia y que ha repercutido de manera negativa en su vida académica y social. ¿A qué tipo de violencia hace referencia?

- A. Basada en genero,
- B. Física.
- C. Sexual.
- D. NO Psicológico.**

429. Un profesional en enfermería está realizando el plan de egreso de un adulto mayor (65 años) con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Parkinson e indica a la hija que debe retirar las alfombras del piso para la prevención de caídas en el domicilio. ¿Bajo el metaparadigma de qué teorizante actúa?

- A. Callista Roy.
- B. Virginia Henderson.**

- C. Dorotea Orem.
- D. Betty Neuman.

430. Paciente femenina de 80 años en el área de clínica con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Al momento se encuentra dependiente, inquieta, agitada. ¿Cuál es la primera medida a tomar en este caso para evitar riesgo?

- A. Adelantarse a las necesidades.
- B. Proporcionar intimidad el momento necesario.
- C. Dejar las barandillas levantadas al alejarse de la cabecera.
- D. Ofrecer ayuda cuando sea necesario.

431. Mujer de 30 semanas de gestación, multípara, presenta ruptura prematura de membranas durante 72 horas, sensibilidad uterina. Al momento inicia trabajo de parto. 5 contracciones en 10 minutos, duración de la contracción 40 segundos; se encuentra en fase activa, 7 centímetros de dilatación y 80 % de borramiento. Al examen físico se detecta presentación fetal cefálica, situación fetal longitudinal izquierda, FCF 145 latidos por minuto, secreción uterina de mal olor. ¿Cuál es la probable complicación de la madre?

- A. Polihidramnios!
- B. Corioamnionitis.
- C. Leucomalacia.
- D. Cordocentesis.

432. Madre acude con su hijo de 6 meses al control del niño sano, a la valoración de enfermería no se identifican alteraciones en los: signos vitales ni en los reflejos arcaicos y durante la aplicación del test de Denver II se presentan todas las dimensiones normales para la edad. ¿A qué programa del MSP responde la actividad de valoración al lactante?

- A. Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo.
- B. Atención integral por ciclos de vida.
- C. Estrategia Nacional de Inmunizaciones.
- D. Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador.

433. Una enfermera investigadora está realizando un estudio en el que divide al azar a 80 pacientes de sexo masculino entre 20 a 40 años, fumadores, que asisten a una clínica de apoyo, en dos grupos. Uno de los grupos recibe folletos estándares sobre cómo dejar de fumar, mientras que el otro grupo participa en un programa educativo innovador que incluye un grupo de apoyo específico para dejar de fumar. La enfermera tiene la intención de comparar la efectividad del tratamiento estándar con el programa educativo, con el objetivo de determinar cuál de los dos enfoques es más eficaz. ¿Qué tipo de muestreo se está usando?

- A. Por conveniencia.
- B. Conglomerados.
- C. Bola de nieve.
- D. Aleatorio.

434. En la actualidad la salud digital ha creado sistemas de registros clínicos electrónicos, que constituyen nuevos espacios de la enfermería. Al momento se trabaja con algunas herramientas en la práctica clínica para el registro de datos. De unidades del MSP su trabajo en la Plataforma salud (PRAS). ¿Qué registra enfermería en el Sistema PRAS:

- A. Acceso al campo de signos vitales y datos antropométricos.
- B. Información que el médico u otro profesional puede modificar.
- C. Acceso a la productividad "diaria", "mensual.
- D. **Actividades y procedimientos de la gestión de enfermería.**

435. Un paciente de 55 años, con antecedentes de cirrosis hepática crónica, ingresa al hospital con sangrado gastrointestinal. A la valoración presión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm y temperatura 36.5° C. El paciente presenta palidez y somnolencia. Los resultados de laboratorio muestran una hemoglobina de 7.5 g/dL y un hematocrito de 24%. El médico prescribe una transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Como profesional de enfermería. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más adecuada antes de iniciar la transfusión?

- A. Administrar la transfusión de concentrado de glóbulos rojos a goteo rápido.
- B. Administrar antipiréticos y antihistamínicos al paciente antes del procedimiento.
- C. **Verificar la identificación del paciente y la compatibilidad de grupo sanguíneo y factor Rh.**
- D. Elevar la cabecera del paciente a un ángulo de 30 grados durante la transfusión.

436. Paciente femenina de 15 años en una visita domiciliaria refiere mala comunicación con sus padres, conflictos frecuentes y como producto de ello bajo rendimiento académico. En la valoración enfermera identifica que se trata de una familia disfuncional. ¿En base a qué dominio de la NANDA construye el diagnóstico para esta familia?

- A. **Dominio 7: Relación de roles.**
- B. Dominio 5: Percepción/cognición.
- C. Dominio 1: Promoción de la salud.
- D. Dominio 10: Principios de vida.

437. Paciente masculino de 80 años, hospitalizado y diagnosticado con insuficiencia cardíaca. Al momento presenta dificultad respiratoria, fatiga, a la valoración física presenta edema en extremidades inferiores +/- y requiere asistencia para iniciar con la deambulaci3n. ¿Qué riesgo principal puede presentar al momento de iniciar la deambulaci3n?

- A. Taquicardia.
- B. Bradicardia,
- C. Hipertension.
- D. **Hipotensi3n ortostática.**

438. Una gestante de 27 años, de 38 semanas de embarazo fue intervenida quirúrgicamente por parto por cesárea y se mantiene en hospitalizaci3n. A la valoraci3n de enfermería se presenta tos, falta de aire, en los miembros inferiores se inspecciona que existe edema, dolor, sensaci3n de calor local y color violáceo. ¿Qué problema tiene la puérpera?

- A. Erisipela.
- B. Várices postcesárea.
- C. **Enfermedad tromboembólica.**
- D. Infecci3n de la herida.

439. Una profesional de enfermería debe administrar a su paciente una medicación costosa que le proporciona la casa de salud en la que se encuentra hospitalizado; se debe administrar por dos ocasiones durante el turno. Antes de la administración de la segunda dosis el paciente fallece. La enfermera recuerda que uno de sus familiares rehúe esa medicación. Según el código deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE). ¿Cuál de las siguientes acciones es la más apropiada y acorde con los principios éticos y deberes de la enfermera en esta situación?

- A. Llevar la medicación sobrante para su familiar sin reportar.
- B. Llevar la medicación sobrante para su familiar reportando al jefe de servicio.
- C. Devolver a la farmacia el sobrante de la medicación.
- D. Solicitar al médico autorización para llevarse el medicamento sobrante.

440. Una paciente primigesta de 35 años, ingresa al servicio de emergencia obstétrica, donde luego de la valoración: presión arterial 180/110mmHg, frecuencia cardíaca 110 por minuto, temperatura de 36 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, saturación de oxígeno 93%, proteinuria positiva, refiere cefalea holocraneana, escotomas y zumbidos de oídos, el médico confirma diagnóstico de preeclampsia severa e indica administrar sulfato de magnesio como prevención de eclampsia; este medicamento se administra en dos fases, una de impregnación y otra de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis a administrar a la paciente en la fase de impregnación?

- A. 30 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (6g) + 70 mililitros de solución isotónica, pasar a 300mL/ hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos.
- B. La dosis es 20 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (4 g) + 80 mililitros de solución isotónico, pasar a 300mL/hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos (4 g en 20 minutos).
- C. 100 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (20g) + 400 mililitros de solución isotónica, pasar a 50mL/hora en bomba de infusión o 17 gotas/minuto con equipo de venoclisis (2 g/hora).
- D. La dosis de 50 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (10 g) + 450 mililitros de solución isotónica, pasar a 50mL/hora en bomba de infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (1 g/hora).

441. Un paciente de 56 años ingresa a la sala de emergencias con dolor torácico opresivo (escala de EVA 10/10), sudoración profusa, disnea y palidez. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en las derivaciones anterolaterales. El médico indica que es un infarto agudo de miocardio (IAM). Al realizar la valoración inicial, el enfermero identifica la presencia de signos y síntomas que respaldan el diagnóstico médico. ¿Cuál de las siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería es prioritaria?

- A. Dolor agudo.
- B. Riesgo de deterioro de la función cardiovascular.
- C. Deterioro de la integridad cutánea.
- D. Ansiedad.

442. Luego de una última valoración del neonato, se lo entrega a su madre con verificación cruzada en el servicio de obstetricia y se le explican las indicaciones para domicilio, incluido las citas de los próximos controles. ¿Cuándo debe retirarse el brazalete de identificación?

- A. En la última toma de signos vitales.

- B. En el último examen de sangre realizado.
- C. Cuando llegue a su casa.
- D. Al vestirse con su ropa casual para egresar.

443. En un hospital de ii nivel, los resultados de las encuestas aplicadas a los pacientes indican insatisfacción en la atención de enfermería. ¿Qué acción debe desarrollar el líder del servicio para mejorar la satisfacción del cliente?

- A. Realizar un proceso de mejora continua, para cambiar la percepción de los pacientes.
- B. Mantener el sistema actual de trabajo y esperar nueva información.
- C. Aplicar sanciones de acuerdo con el reglamento institucional al personal de enfermería por los resultados obtenidos.
- D. Cambiar de servicios al personal de enfermería

444. Paciente varón de 50 años, hospitalizado, diagnosticado de infección respiratoria, Presenta TA- 135/80 mmHg. 1= 38° C, FC= 90 1pm, FR= 28 rpm. El profesional de enfermería decide

Implementar medidas para controlar la infección y mejorar la comodidad del paciente, ¿Cuál de las siguientes Intervenciones refleja la aplicación del modelo de enfermería de Florence Nightingale?

- A. Realizar terapia respiratoria para mejorar la función pulmonar del paciente.
- B. Coordinar interconsulta con especialista en enfermedades respiratorias.
- C. Administrar antipiréticos para reducir la fiebre del paciente.
- D. Proporcionar al paciente un ambiente limpio y bien ventilado.

445. Paciente femenina de 65 años acude a la consulta externa porque refiere problemas y dolor durante las relaciones sexuales, además manifiesta que sus hijos rechazan que ella tenga relaciones sexuales por su avanzada edad. Usted planifica una asesoría sobre sexualidad para ella y su familia. ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta?

- A. Respetar el ritmo, tiempo y formas de comunicación de la adulta mayor.
- B. Desarrollar la asesoría sin establecer límites de tiempo.
- C. Utilizar siempre terminología médica.
- D. Valorar los conocimientos solo previo a la asesoría.

446. Un estudio tiene como objetivo: Identificar si hay diferencias en la incidencia de úlceras por presión en los enfermos a los que se realiza la prevención con la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y a los que no se les aplica. Tras calcular el tamaño de la muestra necesario, se estudiaron a 192 pacientes que ingresaron en el centro sin úlceras por presión y que tenían la movilidad y la actividad alteradas (según la escala de riesgo EMINA). La técnica de flujo continuo ha sido accidental, a medida que iban ingresando los pacientes en el hospital. La incidencia de úlceras por presión es menor en el grupo de intervención, lo que indica que los ácidos grasos hiperoxigenados son útiles para prevenir el desarrollo de este tipo de úlceras. ¿Qué tipo de estudio es?

- A. Prospectivo.
- B. Retrospectivo.
- C. Mixto.
- D. Analítico.

447. Paciente masculino de 25 años se encuentra hospitalizado. El personal de enfermería se encuentra proporcionando un ambiente seguro y limpio, sin exceso de frío, valorando y cambiándolo de posición para evitar presión e irritación. ¿Qué intervención (NIC) en el manejo ambiental se está aplicando?

- A. Manejo de la energía.
- B. Ayuda en el autocuidado.
- C. Comodidad.
- D. Orientación en el sistema sanitario.

448. Paciente mujer de 53 años acude a la consulta externa porque refiere sofocos, fatiga, dolores de cabeza e irritabilidad. Al interrogatorio manifiesta que ha cambiado su lívido, ausencia de menstruaciones desde hace 15 meses y cambios de humor frecuentes. ¿Qué acontecimiento está cursando la paciente?

- A. Perimenopausia.
- B. Menopausia prematura.
- C. Menopausia.
- D. Posmenopausia.

449. Usted está realizando un barrido documentado de vacunación en niños menores a 5 años casa a casa, ¿Qué modalidad de atención es la que está aplicando?

- A. Extramural.
- B. Domiciliaria.
- C. Prehospitalaria.
- D. Intramural.

450. Paciente masculino de 27 años acude al servicio de emergencia por presentar disnea, tos productiva y cianosis periférica. A la valoración presenta signos vitales: Temperatura 39 grados centígrados, frecuencia respiratoria 26 por minuto, 110 pulsaciones por minuto y una presión arterial de 140/90 milímetros de mercurio. ¿Con qué alteraciones está el paciente?

- A. Normotérmico, apnéico, bradicárdico y normotenso.
- B. Hipotérmico, bradipnéico, bradicárdico, hipotenso.
- C. Hipertérmico, taquipnéico, taquicárdico e hipertenso.
- D. Hipotérmico, taquipnéico, taquicárdico, normotenso.

451. ¿Cómo se denomina a la actividad quirúrgica cuya indicación surge como consecuencia de una patología aguda grave de la madre o del feto, con riesgo vital materno-fetal, que hace aconsejable la finalización del embarazo rápidamente?

- A. Episiotomía.
- B. Cesárea de urgencia.
- C. Cerclaje cervical.
- D. Parto instrumental.

452. Madre acude con su hijo de 6 meses al control del niño sano, a la valoración de enfermería no se identifican alteraciones en los signos vitales ni en los reflejos arcaicos y durante la aplicación del test de Denver II se presentan todas las dimensiones normales para la edad. ¿A qué programa del MSP responde la actividad de valoración al lactante?

- A. Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador.
- B. Estrategia Nacional de Inmunizaciones.

C. Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo.

D. Atención integral por ciclos de vida.

453. Paciente primigesta de 25 años cursa un embarazo de 10 semanas, acude al control prenatal refiriendo que no se ha estado alimentando adecuadamente porque presenta muchas náuseas y vómitos. La valoración de enfermería identifica que el peso anterior se encontraba dentro del rango normal. ¿Qué debe hacer para evaluar la ganancia de peso en el nuevo mes?

A. Estimar EG con la FUM.

B. Solicitar una ecografía obstétrica.

C. Medir y registrar los signos vitales.

D. Medir y registrar peso y talla, calcular el IMC.

454. Una embarazada de 28 años acude a consulta externa para su quinto control prenatal y refiere preocupación ya que durante su gestación ha ganado mucho peso, iniciando con un peso normal para su talla y evolucionando hasta tener obesidad. ¿Cuál de las siguientes hormonas es la causante de este cambio?

A. Leptina.

B. Oxitocina.

C. Renina.

D. Luteinizante.

455. Luego de una última valoración del neonato, se lo entrega a su madre con verificación cruzada en el servicio de obstetricia y se le explica las indicaciones para domicilio, incluido las citas de los próximos controles. ¿Cuándo debe retirarse el brazalete de identificación?

A. En la última toma de signos vitales.

B. En el último examen de sangre realizado.

C. Cuando llegue a su casa.

D. Al vestirse con su ropa casual para egresar.

456. Paciente de 33 años acude al área de inyectología para aplicarse una dosis intramuscular de benzetacil 2400000 UI por prescripción médica y diagnóstico de faringoamigdalitis. El profesional de enfermería delega la función al interno de enfermería.

¿En qué sitio debe administrar el fármaco?

A. Músculo glúteo menor, que descansa sobre el glúteo medio.

B. Músculo glúteo mayor, que descansa sobre el glúteo menor.

C. Músculo glúteo mediano, que descansa sobre el glúteo menor.

D. Músculo glúteo menor, que descansa sobre el glúteo mayor.

457. Un profesional de enfermería se encuentra en la fase de selección de un instrumento adecuado para evaluar los niveles de ansiedad, como parte de la elaboración de una propuesta de investigación. ¿En qué etapa del proceso de investigación se encuentra el profesional de enfermería?

A. Identificación del problema.

B. Análisis de los datos.

C. Ejecución del estudio.

D. Diseño del estudio.

458. Un profesional de enfermería administra una dosis de gluconato de potasio en bolo, sin tener en cuenta los correctos para la administración del medicamento. El monitor muestra asistolia. Las maniobras de resucitación consiguen que sobreviva, pero con graves secuelas cerebrales. ¿Cómo se clasifica este evento?

- A. Evento centinela
- B. Evento adverso no evitable.
- C. Complicación
- D. causievento

459. Un profesional de enfermería está trabajando en una unidad de cuidados paliativos y tiene a su cargo a un paciente oncológico. Durante su turno, recibe una invitación a un evento familiar. Se siente retirado a aceptar la invitación, ya que el paciente está estable en ese momento y hay otros colegas presentes en la unidad. Según el Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermería (CIE), ¿Cuál de las siguientes acciones es la más coherente con los principios éticos y deberes?

- A. Aceptar la invitación y entregar la responsabilidad a un colega.
- B. Rechazar la invitación y permanecer en la unidad.
- C. Aceptar la invitación sin informar al supervisor.
- D. Aceptar la invitación y regresar a la entrega del turno.

460. Paciente de 18 años ingresa al área de emergencia y refiere dolor abdominal. Al examen físico se evidencia abdomen distendido, doloroso a la palpación superficial, matidez a la percusión y ruidos hidroaéreos disminuidos a la auscultación. El médico indica colocar sonda nasogástrica para descompresión. ¿Qué paso antecede a la inserción de la sonda?

- A. Medir desde el arco dental hasta el cuello y después hasta el apéndice xifoideo.
- B. Medir desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz y de desde la nariz hacia el apéndice xifoideo.
- C. Medir desde el lóbulo de la oreja hacia el apéndice xifoideo y luego hacia el ombligo.
- D. Medir desde la punta de la nariz hacia el apéndice xifoideo hasta el ombligo.

461. En el centro de salud se realizó una campaña de vacunación con éxito y se desecharon IETs con errores. ¿A qué tipo de desechos corresponden?

- A. Desechos farmacéuticos.
- B. Desechos sanitarios.
- C. Otros desechos peligrosos.
- D. Residuos aprovechables.

462. En la Guerra de Crimea Florence Nightingale contribuyó al mejoramiento del entorno de los

soldados hospitalizados. ¿Qué acción realizó para demostrar al gobierno británico la necesidad de disminuir la mortalidad del 42% al 2%?

- A. Fomentar la adaptación de los soldados al entorno.
- B. Fomenta y promueve la enfermería transcultural.
- C. Promociona la salud para su recuperación.
- D. Documentó y presentó datos estadísticos sobre los elementos esenciales.

463. Un paciente de 50 años con insuficiencia renal crónica, ha sido sometido a un trasplante renal. Durante el período postoperatorio, presenta oliguria, dolor abdominal

intenso, náuseas y vómitos. presión arterial elevada y edema en los miembros inferiores. El médico diagnostica un posible rechazo del trasplante renal o disfunción del injerto. Como profesional de enfermería ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más apropiada para este paciente?

- A. Administrar analgésicos y antieméticos prescritos.
- B. Evaluar los niveles de creatinina y urea en sangre.**
- C. Colocar al paciente en posición de Trendelenburg.
- D. Aumentar la dosis de inmunosupresores según prescripción.

464. Mujer de 30 años sin antecedentes personales, ingresa al servicio de emergencias por presentar debilidad, hormigueo en piernas y brazos. A la exploración física la paciente presenta parálisis de las piernas, brazos y fasciculaciones musculares, ROTS 0/++++, se genera un diagnóstico presuntivo de síndrome de Guillain-Baré, se activa el sistema de vigilancia epidemiológica inmediatamente.

¿Qué sistemas de vigilancia basada en indicadores se activa inicialmente?

- A. Subsistema SIVE Alerta.**
- B. Subsistema SIVE-Mortalidad.
- C. Subsistema SIVE-Hospital.
- D. Subsistemas SIVE: Vigilancia especializada.

465. Paciente hospitalizado con un diagnóstico de Insuficiencia respiratoria. Al momento refiere que necesita un baño. A la valoración física se encuentra estable. Durante el baño experimenta falta de aliento y dificultades para respirar con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, La cama está en posición plana. ¿A qué posición se debe cambiar la cama?

- A. Posición Semi-Fowler.
- B. Posición Fowler.**
- C. Posición Trendelenburg.
- D. Posición Trendelenburg invertida.

466. Paciente de 56 años ingresa a la sala de emergencias con dolor torácico opresivo (escala de EVA 10/10), sudoración profusa, disnea y palidez. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en las derivaciones anterolaterales. El médico indica que es un infarto agudo de miocardio (IAM). Al realizar la valoración inicial, el enfermero identifica la presencia de signos y síntomas que respaldan el diagnóstico médico. ¿Cuál de los siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería es prioritaria?

- A. Riesgo de deterioro de la función cardiovascular.
- B. Dolor agudo.**
- C. Deterioro de la integridad cutánea.
- D. Ansiedad.

467. Niño de 2 años acude a control de niño sano en compañía de su madre, en la preparación se le toma medidas antropométricas: talla 85 cm, peso 12.7 kg, los signos vitales están dentro de los parámetros normales. Mientras esperan la atención médica, se observa que al niño le llama la atención una pelota en la sala de juegos y lo acerca a través de otro objeto para obtenerlo. De acuerdo con los patrones de conducta según la edad. ¿Qué tipo de desarrollo demostró el niño según la actuación?

- A. Desarrollo físico.

- B. Desarrollo cognitivo.
- C. Desarrollo lingüístico.
- D. Desarrollo emocional.

468. Paciente mujer de 48 años, en recuperación postanestésica, luego de reducción abierta más fijación interna por fractura subcapital de húmero derecho. Al momento alerta, orientada, constantes vitales dentro de parámetros normales, apósito de herida quirúrgica ligeramente manchado de líquido serohemático, presenta parestesia y disminución de la movilidad de los dedos del miembro afectado. ¿Cuál de las siguientes es la valoración más adecuada en esta paciente?

- A. De la función cardiovascular.
- B. Del estado neurovascular.
- C. Neurológica.
- D. De la función respiratoria.

469. Mujer de 50 años, refiere pérdida inexplicable de peso, polidipsia y poliuria, sin otros síntomas acompañantes. Según las Guías de Práctica Clínica del MSP del Ecuador. ¿Cuál es un criterio diagnóstico para Diabetes Mellitus tipo 2?

- A. Glucemia en plasma después de carga oral de glucosa igual o mayor a 126 mg/dl
- B. Hemoglobina glicosilada Alc (HbA1c) mayor o igual a 5.6%
- C. Glucemia en ayuno medida en plasma venoso igual o mayor a 110 mg/dl
- D. Glucemia casual en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl

470. Paciente femenina de 25 años, maestra de escuela con antecedentes de alergia grave a la penicilina. Acude por presentar ardor faríngeo y T: 38.5 °C, niega tos. Al examen físico: se observa hipertrofia amigdalina bilateral, exudado blanquecino y linfadenopatías cervicales anteriores dolorosas. En el Centro de Salud no posee disponibilidad de pruebas rápidas para estreptococos. ¿Cuál de los siguientes tratamientos reduce los síntomas, previene la propagación y disminuye el riesgo de complicaciones como la fiebre reumática?

- A. Azitromicina 500 miligramos vía oral cada día por tres días.
- B. Cefalexina 500 miligramos vía oral cada 12 horas.
- C. Gentamicina 160 miligramos intramuscular cada día por tres días.
- D. Amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días.

471. Una madre de familia acude con su hija adolescente de 14 años porque desde el último año ha presentado irregularidad en los ciclos menstruales. Indica que la menarquia se presentó a los 12 años y 6 meses de edad y durante el primer año se presentaron todos los meses. No tiene antecedentes clínicos de importancia. Al examen físico se aprecian caracteres sexuales secundarios presentes. La paciente no ha iniciado vida sexual activa. Los signos vitales son estables. El examen físico pediátrico no demuestra ninguna alteración y el estudio de imagen de ecografía pélvica es normal. ¿Cuál es la decisión a tomar en esta paciente?

- A. Realizar un examen ginecológico minucioso.
- B. Realizar una laparoscopia diagnóstica.
- C. Educación y orientación sobre el ciclo menstrual femenino.
- D. Prescribir inductores de ovulación.

472. Una paciente de 18 días de nacida a término por parto céfalo-vaginal con peso adecuado. Acude al centro de salud por presentar taquipnea, tos que moviliza secreciones, aleteo nasal, vómito en número de 5. Al examen físico FR: 65 rpm, rinorrea transparente, pulmonar con murmullo vesicular conservado, leve estridor laríngeo. Se decide su ingreso a observación y se requiere hidratar a la paciente. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un objetivo de la reposición de los líquidos de mantenimiento en esta paciente?

- A. Diluir la concentración de orina.
- B. Evitar la deshidratación.**
- C. Evitar la hipocalcemia.
- D. Producir hormona antidiurética.

473. Un niño de 10 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar inició el tratamiento antituberculoso hace 45 días, experimentó efectos secundarios notables, como insomnio, náuseas, diarrea, irritabilidad e hipoacusia. La madre, preocupada por estos síntomas, ha decidido interrumpir la administración de los medicamentos indicados. Personal de salud realiza una visita domiciliar sin encontrar a este núcleo familiar. ¿ En qué tipo de tratamiento se clasifica a este caso?

- A. Pérdida en el seguimiento**
- B. Paciente curado.
- C. Multidrogoresistencia (MDR).
- D. Fracaso al tratamiento.

474. Paciente de 28 años con 12 semanas de gestación. Acude al primer control prenatal. El tipo de sangre es O y el factor Rh es positivo. La pareja es de tipo sanguíneo A y factor Rh

positivo. Su primogénito de 4 años nació de parto normal y tuvo el grupo sanguíneo del padre. No tiene antecedentes patológicos personales de importancia. Los signos vitales al examen físico son normales. El examen de abdomen y región pélvica no demuestra ninguna alteración. La paciente tiene mucha ansiedad porque el primer hijo tuvo que ir a neonatología por ser de grupos sanguíneos diferentes y teme que pase igual en esta nueva gestación. ¿Que orientación debe dar a esta paciente?

- A. Solicitar complementariamente en el examen de sangre la fracción DU.
- B. Realizar estudio genético al padre en este embarazo.
- C. La incompatibilidad ABO es la más frecuente y menos agresiva en embarazos sucesivos.**
- D. Debe realizarse estudio genotípico para determinar sensibilización en futuros embarazos.

475. Usted labora en el área de esterilización y es responsable de la recepción de ienimentit realiza la clasificación del mismo para cumplir con los diferentes procedimientos de lempa

desinfección y esterilización. ¿Qué elementos utiliza para la limpieza?

- A. Agua, alcohol, detergente, glutaraldehídos.
- B. Agua y productos enzimáticos.**
- C. Alcohol medicinal e industrial, jabón líquido.
- D. Jabón, agua, desinfectantes químicos.ponder

476. Madre acude al centro de salud, con su hijo de 1 año, por presentar cuadro de 2 días de evolución con disnea, taquipnea tiraje subcostal e intercostal, la saturación se encuentra en 78%, siendo necesario la administración de oxígeno por medio de un sistema de alto flujo. ¿Qué dispositivo de oxígeno de alto flujo debe colocar a este niño?

- A. Mascarilla Venturi.
- B. Mascarilla simple.
- C. Mascarillas con reinhalación parcial.

477. Adenocarcinoma de páncreas, Cuál de las siguientes situaciones define adecuadamente la relación entre diabetes?

- A. La diabetes no guarda relación con el cáncer pancreático.
- B. En la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas, la diabetes se instaura cuando aparece la ictericia
- C. La diabetes está presente en un tercio de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y en muchos de ellos
- D. Los pacientes con diabetes de larga evolución tienen un riesgo superior al 50% de desarrollar cáncer de páncreas

478. Una paciente femenina de 8 horas de nacida con bajo peso al nacimiento. Al momento presenta hipofonía, hipotensión arterial y una convulsión tónico clónico presenta apnea respiratoria, flacidez, hipotermia. FC 110 lpm. Usted considera posible hipoglucemia. ¿Cuál es una posible causa?

- A. Hipoinsulinismo
- B. Aumento de gluconeogénesis
- C. Disminución de las necesidades de glucosa por hipoxia.
- D. Disminución de las reservas tisulares de glucógeno.

479. Paciente de 20 años femenina, acude al centro de salud, por presentar corte a nivel de región frontal derecha de 3 centímetros de longitud, debido a golpe contuso contra una superficie de metal. Como antecedente se observa cicatriz quetoidea e hipertrófica en hombro derecho (vacuna BCG)- Requiere sutura. ¿Qué medidas usaría para prevenir este tipo de cicatrización por la sutura previa?

- A. Corticoide intralesional preventivo.
- B. Eliminación de la tensión, lociones de hidratación.
- C. Braquiterapia con iridio 192.
- D. Uso de tensión perpendicular a las líneas de Langer.

480. Administración y lectura de la tuberculina

Administrar la tuberculina por vía intradérmica y realizar la lectura a las 48-72 horas.

481. Estudio de imagen para la pancreatitis

Tomografía abdominal contrastada.

482. Sangrado color achocolatado:

- a) endometriosis
- B) adenomiosis
- c) dismenorrea

483. Una paciente femenina de 30 años que trabaja como profesora en centros de estimulación temprana y no tiene antecedentes patológicos, acude porque desde hace 48 horas y sin causa aparente presenta alza térmica no cuantificado, cansancio, cefalea y presencia de manchas rojas y ampollas en Cabeza que producen escozor. No existen antecedentes de viaje. A examen físico: frecuencia cardíaca 90 por minuto, frecuencia respiratoria 12 presión arterial 110/70, temperatura colar 38.5° C. lesiones eritematosas de unos 5 mm de diámetro dispersas en tronco cara y cuero cabelludo, intercaladas resto del examen físico no tiene alteración. Examen de laboratorio, Glucosa: 90 mg/dl, Urea: 20 mg/dl; Creatinina: 0.59 mg/dl; Sodio: 140 miliequivalentes PCR 6.75, leucocitos: 6 500, neutrófilos 50%; linfocitos 45%, glóbulos rojos 5 090 000, hemoglobina: 14 gr/dl, hematocrito: 45%. torax sin arteración. ¿ Qué diagnóstico tiene la paciente?

- A. sitis secundaria.
- B. Viruela del mono
- C. Varicela
- D. Foliculitis.

484. Niño de 7 años con peso bajo para la edad y talla normal para la edad.

Emancipación leve

485. Paciente de 2 meses de edad, traído por su madre o emergencias por fiebre e irritabilidad de 5 días de evolución. La fiebre es de 39 grados centígrados, varios picos al día, de difícil control con antitérmicos, se acompaña de gran irritabilidad. Acudió a pediatra, quien prescribió acetaminofén alternado con ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, paciente en regular estado general, irritable, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización infecciosa. Exámenes: leucocitos 15.000/mm³, neutrófilos 70%, hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000/mm³, proteína C reactiva 100 mg/l, elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos+++, urocultivo pendiente resultado ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente?

- A. Hospitalizarlo sin antibioticos hasta recibir resultados de urocultivo
- B. Hospitalizarlo con ceftriaxona intravenosa
- C. Observarlo 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitalizarlo
- D. Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.

486. Mujer primipara de 18 años tras un trabajo de parto prolongado logra obtener un recién nacido masculino con dificultad respiratoria al nacimiento, luego de realizar la atención inmediata se evidencia que el recién nacido no llora ¿Qué intervención debe realizar?

- A. Despejar las vías aéreas, secar completamente y mantenerlo caliente
- B. Aplicar ABCDE
- C. Oxigenoterapia con cánula nasal
- D. Reanimación neonatal básica

487. Paciente masculino de 15 meses acude a control en el centro de salud sin patología aparente ni antecedentes personales ni familiares, esquema de vacunación, examen físico normal. Desarrollo neuromotor adecuado para la edad. Se recomienda continuar la lactancia y alimentación complementaria, y control en 6 meses. ¿ Qué vacuna debe administrarse a los 15 meses de acuerdo con el esquema nacional de vacunación?

- A. Primeros dos de SRP
- B. Primera dosis de Hepatitis A

C. Dosis única de Varicela

D. Dosis única de HPV.

488. Una mujer de 46 años acude a Emergencias por presentar un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen. La paciente billares por cuanto ha sido evaluada por ultrasonido en dos ocasiones anteriores en el último año por dolores cólicos en el hipocondrio derecho. Esta vez acompañado de vómito por dos ocasiones sin que se modifique el dolor. Los signos vitales muestran T:37.8°C; FC:92 ipm; TA: 130/80mmHg; FR: 18rpm, abdomen muestra cálculos en la vesícula, líquido alrededor de la misma y un grosor de la pared de 9 milímetros. ¿Cuál de los siguientes signos es el más presentaría en el examen físico del abdomen?

A. Psoas

B. Rovsing

C. Blumberg

D. Murphy

489. Mujer de 27 años, soltera, gesta 0, con múltiples parejas sexuales, algunas de ellas ocasionales. Acude a su consulta porque desea cambiar el preservativo anticonceptivo ya que ha escuchado de su eficacia baja. ¿cuál de los siguientes metodos esta contraindicado por la posibilidad de infección pélvica?

A. Hormonales combinados inyectables.

B. Anticonceptivos orales combinados

C. Implante subdérmico con progestágeno

D. Dispositivo intrauterino con cobre.

490. Paciente masculino de 34 años, con antecedentes de asma desde la adolescencia e hipertensión arterial en tratamiento desde hace tres días con carvedilol 6.25 mg cada 12 horas: acude a emergencia por cuadro de crisis asmática grave que no mejora a la administración de salbutamol la esposa del paciente refiere que la crisis asmática inicio mientras se encontraba en su oficina frente al computador el dia de hoy. Al examen físico el paciente se encuentra con taquipnea, disnea y sibilancias marcadas con saturación de oxigeno de 80% a la auscultación: pulmones murmullo vesicular presente con presencia de sibilancias bilaterales en bases y ápices pulmonares. ¿Que desencadeno la crisis asmática del paciente ?

A. Uso de fármacos bloqueadores como carvedilol

B. Infección Viral

C. Exposición a irritantes

D. Alergia alimentaria

491. Paciente de 396 años, multípara con 30 semanas de gestacion, con antecedentes de tabaquismo y legrado hace 6 años por aborto espontaneo. Acude por sangrado vaginal. ¿cual es el principal signo que orienta el diagnostico de placenta previa?

A. Hemorragia al inicio del embarazo

B. Hemorragia profusa

C. Hemorragia de coloración cafe

D. Hemorragia indolora

492. Paciente masculino de 23 años, quien refiere que hace 2 meses sufrió un asalto con arma blanca cerca de llegar a su casa. Desde ese episodio, sueña con el asalto y no puede

dormir bien, en 2 ocasiones ha mojado la cama. También indica que tiene miedo de salir a la calle porque "no confía en nadie". Las pocas veces que ha salido lo ha hecho en compañía de un familiar, pero se ha mantenido atento a los movimientos de las personas que transitaban. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente?

- A. Trastorno de la Personalidad Paranoide
- B. Agorafobia
- C. Trastorno de estrés postraumática.
- D. Trastorno de la Ansiedad Generalizada

493. Un paciente masculino de 18 años sin antecedentes patológicos acude a consulta porque desde hace 3 meses presentan "barros y espinillas", en la cara en moderada cantidad, en algunas ocasiones lesiones causan dolor. Ha utilizado jabones con antibiótico de venta libre sin mejoría. En el examen físico: signos vitales estables, presencia de lesiones compatibles con comedones abiertos y cerrados en moderada cantidad ubicados en toda la cara +, 2 lesiones papulopustulosas aisladas ¿cuál es el diagnóstico del paciente?

- A. Acné grave
- B. Acné conglobata
- C. Acné leve
- D. Acné moderado

494. Paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre. Ingresa al hospital en expulsivo, parto céfalo vaginal. Se recibe un RN masculino con llano fuerte, FC 140 lpm, Apgar 9. Líquido amniótico de mal olor, rotura de membranas de 21 horas. ¿Qué factores de riesgo presenta el RN?

- A. Líquido amniótico transparente con grumos
- B. Parto céfalo vaginal, en expulsivo
- C. Rotura de membrana de 21 horas. VERIFICAR
- D. madre adolescente

495. Paciente con diabetes tipo 1, acude a la emergencia por presentar vómitos y deposiciones diarreicas por varias ocasiones, se realiza una glucemia y se evidencia 400mg/dl. El médico le indica iniciar tratamiento para cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la intervención de enfermería prioritario en el caso?

- A. Registrar ingresos en la hidratación del paciente
- B. Administrar volumen de líquidos parenterales
- C. Realizar un electrocardiograma y reportar alteraciones
- D. controlar el electrolito no en pruebas de orina

496. Un Rn a término Rh + y madre Rh-, con hemoglobina de 11g/dl. ¿Qué tipo de anemia presenta?

- A. Anemia por pérdidas sanguíneas
- B. Anemia por aumento de la destrucción de hematíes
- C. Anemia por disminución de la producción de hematíes
- D. Anemia fisiológica

497. Un paciente oncológico de 35 años en el postoperatorio inmediato de gastrectomía manifiesta dolor 7/10 según escala de Eva. ¿Cuál es la combinación de los analgésicos utilizados según la escala analgésica de la OMS modificada?-

- A. fármacos no opioides, métodos ablativos, terapia adyuvante
- B. opioides fuertes, medicamentos no opioides, terapia de adyuvante
- C. opioides débiles, técnicas de neuromodulación, terapia coadyuvante
- D. opioides débiles, medicamentos no opioides, terapia de adyuvante

498. Paciente de 30 años con antecedentes de enfermedad de Crohn diagnosticada hace tres años refiere tener mucha sed y visión borrosa. A la valoración de enfermería paciente astenica, mucosas orales secas, vía central a nivel de subclavia derecha recibiendo nutrición parenteral total (NPT) con: lípidos 250ml, aminoglucósidos 450 ml, dextrosa al 50 por ciento 300 ml, obteniendo un gasto urinario de 3 mg/kg-h. se realizan exámenes de laboratorio con los siguientes resultados: sodio Na 138 mEq/L, potasio K 3.7 mEq/L, cloro 100 mEq/L, hemoglobina glicosilada $HbA1c$ 6 % ¿qué complicación presenta en la paciente con relación a la NPT?

- A. hipoglucemia de rebote
- B. desequilibrio hidroelectrolítico
- C. hiperglucemia
- D. sobrecarga de líquido

499. Un paciente de 72 años con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) presenta: disnea, tos crónica y expectoración muco purulenta. A la valoración el profesional de enfermería identifica sibilancias audibles y una disminución de la saturación de oxígeno evidenciado en resultados de gasometría arterial. ¿Cuál de las siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería corresponde en este caso?

- A. Riesgo de aspiración
- B. Riesgo de deterioro de la integridad tisular.
- C. Disminución de la tolerancia a la actividad.
- D. Deterioro del intercambio de gases

500. Un paciente de 23 años luego de sufrir una caída desde su propia altura, presenta pérdida de la conciencia y una herida cortante en el antebrazo derecho, llega al servicio de emergencia, recibe valoración médica y usted cumple con las indicaciones como profesional de enfermería, realiza el diagnóstico de enfermería, que implica en la utilización de los datos de valoración. ¿A qué aplicación del proceso corresponde la toma de decisiones?

- A. Conocimiento de estándares, dificultades de comportamientos del paciente.
- B. Agrupación de datos e identificación de los problemas de salud del paciente, formulación del diagnóstico.
- C. Valoración diagnóstica e intervenciones.
- D. Recogida de datos, entrevista anamnesis.

501. Mujer de 20 años primigesta que acude al servicio de emergencias por trabajo de parto en fase activa, al momento presenta contracciones regulares, dilatación de 9, borramiento del 90% y eliminación de líquido amniótico. ¿Qué formulario es indispensable en este caso?

- A. 008
- B. 056
- C. 053

D. 051

502. Paciente de 78 años acude al centro de salud, con antecedentes de artritis reumatoidea diagnosticada hace 5 años, refiere dolor en manos. Al examen físico el paciente presenta edema a nivel de faringes, eritema, aumento de la temperatura corporal y limitación en la articulación de manos. Por prescripción médica la enfermera administra Tramadol 100 mg y Metoclopramida 10 mg y se recomienda a la paciente continuar con las prescripciones médicas indicadas de acuerdo a la evidencia. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente?

- A. El uso de opioides débiles inyectar ácido hialurónico en las articulaciones o plasma rico en plaquetas.
- B. Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa.
- C. Uso de antiinflamatorios no esteroides (AINES) corticoides.**
- D. Uso de técnicas de neuromodulación o métodos ablativos como la estimulación nerviosa transcutánea.

503. Mujer de 30 años sin antecedentes personales ingresa al servicio de emergencias por presentar debilidad hormigueo en piernas y brazos a la exploración física la paciente presenta parálisis de las piernas brazos y fasciculaciones musculares, ROTS 0/++++ se genera un diagnóstico presuntivo de síndrome de Guillain Barré se activa el sistema de vigilancia epidemiológica inmediatamente Qué sistemas de vigilancia basada indicadores se activan inicialmente.

- A. Subsistemas y SIVE alerta**
- B. subsistemas y SIVE de mortalidad
- C. subsistemas y SIVE hospital
- D. subsistemas y SIVE de vigilancia especializada

504. Paciente atendido en emergencia luego de accidente de tránsito, es diagnosticado de shock hipovolémico, médico prescribe la administración de paquetes globulares. Durante la administración, el paciente presenta un shock anafiláctico, paro cardio respiratorio que no revierte pese a maniobras de RCP, por colocar paquete globular equivocado. ¿Cómo se denomina la situación descrita?

- A. Evento centinela**
- B. evento adverso no evitable
- C. complicación
- D. cuasi evento

505. Un profesional de enfermería está trabajando en una unidad de cuidados paliativos y tiene a su cargo a un paciente oncológico, durante su turno recibe una invitación a un evento familiar se siente tentado o aceptar la invitación ya que el paciente está estable en este momento y hay otros colegas presentes en la unidad según el código deontológico del Consejo internacional de enfermería (CIE) ¿Cual de las siguientes acciones es la más coherente con los principios éticos y deberes?.

- A. Acepta la invitación y entrega la responsabilidad a un colega
- B. rechazar la invitación y permanecer en la unidad**
- C. aceptar la invitación sin informar al supervisor
- D. aceptar la invitación y regresar a la entrega del turno

506. Paciente se encuentra en el servicio de terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave al momento se encuentra inconsciente entubado presenta náuseas. a la valoración física se observa que el paciente necesita higiene oral por su estado de inconsciencia. ¿De qué se debe proteger el paciente durante la higiene oral?

- A. vómito O emesis
- B. aspiración**
- C. secreción salival
- D. reflejo faríngeo

507. El personal de salud centro tipo b aplica el enfoque de atención primaria de salud renovada en la prestación de servicios con la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población Al momento dispone de un plan local de salud alineado a las exigencias del MAIS en la valoración detecta la participación comunitaria y multisectorial en forma eficiente ¿Cuál es el enfoque central de la atención primaria renovada en el ámbito de salud en este caso?

- A. Fortalecer la atención de salud en la comunidad centrados en la prevención**
- B. promoción y atención integral
- C. priorizar la atención médica especializada para tratar enfermedades crónicas
- D. reducir los costos de los tratamientos médicos para hacerlos más accesibles a la población mejorar acceso a servicios de salud de alta complejidad en hospitales

508. Paciente de 18 años ingresa al área de emergencia y refiere dolor abdominal, al examen físico se evidencia abdomen distendido doloroso la palpación superficial Matidez a la percusión y ruidos hidroaéreos disminuidos a la auscultación. el médico indica colocar Sonda nasogástrica para descompresión ¿qué pasa antecede a la inserción de la Sonda?

- A. Medir desde el arca dental hasta el cuello y después hasta el apéndice xifoides
- B. Medir desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz y desde la nariz hacia el apéndice xifoides**
- C. medir desde el lóbulo de la oreja hacia el apéndice xifoides y luego hacia el ombligo
- D. medir desde la punta de la nariz hacia el apéndice xifoides hasta el ombligo

509. Paciente femenina de 20 años acude a la consulta externa solicitando un turno para la atención prenatal, cursa un embarazo de 15 semanas refiere que anteriormente residía en otra ciudad y sus controles lo realizaba ahí a la valoración de enfermería la xc gestante presenta signos vitales normales y sin riesgo ¿Qué documentos necesarios que presenta la gestante para el control prenatal?

- A. La libreta integral de salud**
- B. carnet de vacunación
- C. la prueba confirmatoria de embarazo
- D. la cédula de identidad

510. Paciente de 28 años portadora de una sonda de alimentación gástrica con diagnóstico de VIH hace 5 años enfrentado dificultades para mantener una alimentación adecuada lo cual ha resultado en pérdida de 5 kg de peso en menos de un mes ¿Cuál es el tipo de fórmula para la nutrición enteral adecuada en este caso?

- A. fórmula polimérica
- B. fórmula modular
- C. fórmula elemental
- D. fórmula especializada**

511. Paciente femenina de 60 años refiere que tiene una masa en la mama derecha sin presencia de dolor al examen físico Se observa cambios en el tamaño y temperatura de la piel además de edema médico sospecha de posible diagnóstico de cáncer de mama ¿Qué actividad de enfermería es la más adecuada en este caso?

- A. **Evaluar los sentimientos y conocimientos sobre su posible diagnóstico**
- B. Preparar a la paciente para la radioterapia
- C. Preparar a la paciente para la mastectomía simple
- D. Preparar a la paciente para la quimioterapia

512. Una paciente de 50 años con insuficiencia renal crónica ha sido sometida a un trasplante renal durante el periodo postoperatorio presenta oliguria dolor abdominal intenso náuseas y vómitos, presión arterial elevada y edema en los miembros inferiores. El médico diagnostica posible rechazo de trasplante renal o disfunción del injerto. como profesional de enfermería ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más apropiada para este paciente?

- A. Administrar analgésicos y antieméticos prescritos
- B. **evaluar los niveles de creatinina y urea en sangre**
- C. colocar al paciente en posición tren del emburgo
- D. aumentar la dosis de inmunosupresores según prescripción

513. Paciente de 22 años se encuentra en el servicio de hematología con diagnóstico de anemia aplásica, refiere tener mucho cansancio, a la exploración física somnoliento, facias pálidas mucosas orales semihúmedas en los resultados de laboratorio se evidencia hemoglobina HB: 7g/dl, hematocrito hto: 26 g/dl, eritrocitos: 2500000/mm³, Se decide transfundir paquetes globulares ¿Qué cuidados de enfermería se deben realizar durante la transmisión de hemoderivados?

- A. **El tiempo máximo aceptable para completar la transfusión es de 4 horas registrar los signos vitales al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia**
- B. El tiempo máximo aceptable para completar la transfusión es de 5 horas registrar los signos vitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la transfusión
vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de en la vigilancia
- C. El tiempo máximo aceptable para completar la Transfusión es de 2 horas registrar los signos vitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la Transfusión
vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia
- D. El tiempo máximo aceptable para completar la Transfusión es de 1 hora registrarlos sin hospitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia

514. Paciente de 34 años soltero refiere que arrienda un cuarto está sin trabajo al momento presenta fiebre expectoración con moco sanguinolentos profesional enfermero averigua el interrogatorio que la hermana del paciente falleció con tuberculosis hace ocho días ¿Cuál es la acción correcta seguir en este caso?

- A. La búsqueda de Sr exclusivamente en visitas domiciliarias reuniones comunitarias
- B. Se forma la primera muestra de esputo en 15 días en frasco previamente rotulado
- C. Solicitud para examen bacteriológico y recolección de muestra de esputo para baciloscopia
- D. La segunda muestra de esputo recoger en ocho días en el domicilio del paciente

515. Niño de 2 años acude a control de niño sano en compañía de su madre en la preparación se toman las medidas antropométricas como talla 85 cm peso 12. kilogramos los signos vitales están dentro de los parámetros normales mientras esperan la atención médica Se observa que al niño le llama la atención una pelota en la sala de juegos y lo acerca a través de otro objeto para obtenerlo de acuerdo en los patrones de conducta según

la edad ¿Qué tipo de desarrollo demostró el niño según la actuación?

- A. desarrollo físico
- B. desarrollo cognitivo
- C. desarrollo Lingüístico
- D. desarrollo Emocional

516. Un paciente de 55 años con Antecedentes de cirrosis hepática Crónica ingresa al hospital con sangrado gastrointestinal a la valoración presión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm y temperatura 36.5 grados Celsius, paciente presenta palidez y somnolencia los resultados de laboratorio muestra una hemoglobina de 7.5 g/dl y un hematocrito de 24% en médica prescribe una transfusión de concentrado de glóbulos rojos como profesional de enfermería ¿cuál de los siguientes intervenciones es la más adecuada antes de iniciar la transfusión?

- A. Administrar antipiréticos de antihistamínicos al paciente antes del procedimiento
- B. Verifica la identificación del paciente y la compatibilidad del grupo sanguíneo y factor RH
- C. Elevar la cabecera del paciente a un ángulo de 30 grados durante la Transfusión
- D. Administrar la Transfusión de concentrado de glóbulos rojos a goteo rápido

517. Profesional de enfermería se prepara para proporcionarle los cuidados post mortem antes de que el cuerpo se torne consistente debido al cambio de pH y ausencia de ácido adenil trifosfórico provocando rigidez muscular ¿Cuál es la etapa post mortem a la que se hace referencia?

- A. Lividez cadavérica o coloración cianótica
- B. rigor mortis
- C. descomposición
- D. algor mortis

518. Paciente hospitalizado con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Al momento refiere que necesita un baño. A la valoración física se encuentra estable. Durante el baño experimenta falta de aliento y dificultades para respirar con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. La cama está en posición plana. ¿A qué posición se debe cambiar la cama?

- A. Posición Trendelenburg invertida.
- B. Posición Trendelenburg.
- C. Posición Semi-Fowler.
- D. Posición Fowler.

519. Paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial acude a la unidad de salud en área rural y han recibido por el personal de enfermería refiere sentirse agitado confuso y con dificultad para respirar al momento está taquiarritmia de 140 latidos por minuto diaforesis retracción intercostal y esternoclavicular repentinamente cae desplomado sobre la camilla lo que sugiere un paro cardiorrespiratorio ¿Cual es la primera acción al realizar según el protocolo de rcp básico?

- A. Comprobar si el paciente responde
- B. conseguir un desfibrilador externo automático DEA y equipo para emergencias o delegar a alguien
- C. pedir ayuda en voz alta persona cerca
- D. activar el sistema de emergencia disponible

520. Un recién nacido tiene 4 horas de vida producto a término pesa 2800 gramos talla 50 cm perímetro cefálico 32 cm actualmente presenta apgar p8 al primer minuto de nacimiento y 9 a los 5 minutos ha permanecido en alojamiento conjunto y apego precoz con la madre al examen físico. Se observa buen reflejo de succión y deglución ¿cuál es la profilaxis oftálmica y antihemorrágica en este caso?

- A. Profilaxis anti hemorrágica 1 mg de vitamina k oftálmica con eritromicina 0.5% o tetraciclina al 1%
- B. profilaxis antihemorrágica 1 mg de vitamina k profilaxis oftalmica una gota de gentamicina
- C. Profilaxis Oftálmica Dos gotas de oftagen profilaxis antihemorrágica 1 mg de vitamina k. Profilaxis antihemorrágica 0,5 mg de vitamina K profilaxis oftálmica 2 gotas de
- D. tetrizolina

521. Pacientes femenino de 38 años de un día de hospitalización posparto tercera gestación segundo hijo vivo y un muerto sin antecedentes patológicos personales usted con la enfermera del servicio durante su turno olvida registrar la medicación analgésica luego de administrar ¿qué principio éticos está vulnerando en el paciente?

- A. Principio de autonomía y continuidad
- B. principio de beneficencia y no maleficencia
- C. Principio de autonomía beneficencia misericordia justicia
- D. principio de autonomía beneficencia misericordia y continuidad

522. Un enfermero responsable de la supervisión y gestión de las unidades de hospitalización debe elaborar el censo diario respecto al número de ingresos con el número de camas disponibles con el fin de no congestionar áreas permitir la fluidez y evitar estancias prolongadas ¿qué indicador permite elaborar el informe?

- A. Giro cama
- B. índice de ocupación
- C. índice de rotación
- D. porcentaje de ocupación

523. En la guerra de Crimea florence nightingale contribuyó al mejoramiento del entorno de los soldados hospitalizados ¿Qué acción realizó para demostrar al gobierno británico la necesidad de disminuir la mortalidad del 42 al 2%?

- A. Fomentar la adaptación de los soldados al entorno
- B. Fomenta y promueve la enfermería transcultural
- C. Promociona la salud para su recuperación
- D. Documento y presentó datos de estadísticos sobre los elementos esenciales

524. Mujer de 35 años para que ingrese a emergencias de mal estado en general al interrogatorio sus familiares refieren parto en domicilio más presencia de ¿sangrado en abundante cantidad luego de la atención brindada en la institución de salud la mujer falleció a la media hora por shock hemorrágico ¿Cómo se denomina este suceso?

- A. Error por omisión
- B. Eventos centinela
- C. Evento adverso
- D. Muerte materna

525. Usted realiza una visita a domiciliaria y se encuentra una paciente femenina de 20 años que cursa un embarazo de 10 semanas al momento del interrogatorio no refiere ninguna molestia no se ha realizado ningún control prenatal y a la valoración del scormama Presenta una puntuación de cero ¿qué instrumento utiliza para localizar a su paciente en una visita subsecuente?

- A. El familiograma
- B. El ecomapa
- C. La historia clínica
- D. El mapa parlante

526. Paciente de masculino de 83 años con un y en ese de 31 y antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 4 años con tratamiento continuo acude al control en su centro de salud en compañía de su familiar usted nota que la información que maneja el familiar de su paciente es deficiente para minimizar los riesgos de la atención en salud domiciliario ¿Cómo se denomina la precaución para minimizar el riesgo o eliminar los peligros de Quién trabaja como cuidador?

- A. Precaución 8 higiene respiratoria
- B. Precaución 3 uso de guantes
- C. Precaución 2 equipo de protección personal
- D. Precaución 1 higiene de manos

527. Una paciente primigesta de 15 años, ingresa al servicio de emergencia obstétrica, donde luego de la valoración: presión arterial 180/110 mmHg, frecuencia cardíaca 110 por minuto, temperatura de 36 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, saturación de oxígeno 93%, proteinuria positiva, refiere cefalea holocraneana, escotomas y zumbidos de oídos, el médico confirma diagnóstico de preeclampsia severa e indica administrar sulfato de magnesio como prevención de eclampsia; este medicamento se administra en dos fases, una de impregnación y otra de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis a administrar a la paciente en la fase de impregnación?

- A. 30 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (6g) + 70 mililitros de solución isotónica, pasar a 300 ml/ hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos.

- B. La dosis es 20 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (4 g) + 80 mililitros de solución isotónico, pasar a 300 ml/hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos (4 g en 20 minutos).
- C. 100 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (20g) + 400 mililitros de solución isotónica, pasar a 50 ml/hora en bomba de infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (2 g/hora).
- D. La dosis de 50 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (10 g) + 450 mililitros de solución isotónica, pasar a 50 mL/hora en bomba de Infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (1 g/hora).

528. Paciente de 77 años Con antecedentes patológicos de evento cerebrovascular desde hace 10 años la recuperación ha sido lenta tiene limitación para varias actividades instrumentales y básicas de la vida diaria en la valoración se les presentan varios objetos de aseo personal pero no conoce sus nombres y tampoco dice que se puede hacer con ellos ¿qué alteración presenta?

- A. Ataxia
- B. Afasia
- C. Agnosia
- D. Apraxia

529. Mujer de 20 años durante la visita a domiciliaria indica que vive con su abuelo quien padece de diabetes mellitus quien ya no es autónomo y requiere de mucha atención por lo que se señala que se siente cansada por el rol que ASUME a la valoración de enfermería se identifica varias dificultades para cumplir con la responsabilidades asignadas ¿Qué función de la familia se evidencia en este caso?

- A. Cuidado
- B. Reproductora
- C. Socialización
- D. AutoNomía

530. Mujer de 30 semanas de gestación, multipara, presenta ruptura prematura de membranas horas, sensibilidad uterina. Al momento inicia trabajo de parto. 5 contracciones duración de la contracción 40 segundos: se encuentra en fase activa, 7 centímetro 80% de borramiento. Al examen físico se detecta presentación fetal cefálica longitudinal Izquierda, FCF 145 latidos por minuto, secreción uterina de mal olor. ¿C complicación de la madre?

- A. Cordocentesis.
- B. Corioamnionitis.
- C. Leucomalacia.
- D. Polinidramnios

531. Paciente masculino de 25 años se encuentra hospitalizado el personal de enfermería se encuentra proporcionando un ambiente seguro y limpio sin exceso de frío valorando y cambiándolo de posición para evitar presión e irritación ¿qué intervención NIC en el manejo ambiental se está aplicando?

- A. Manejo de la energía
- B. Ayuda en el autocuidado
- C. Comodidad

D. Orientación en el sistema sanitario

532. Paciente de 65 años acudió la consulta externa para que refiere problemas de dolor durante las relaciones sexuales además manifiesta que sus hijos rechazan que ella tenga relaciones sexuales por su avanzada edad usted planifica una asesoría sobre sexualidad para ella y su familia ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta?

- A. Respetar el ritmo tiempo y formas de comunicación del adulto mayor
- B. Desarrollar la asesoría sin establecer límites de tiempo
- C. Utilizar siempre terminología médica
- D. Valora los conocimientos solo previo a la asesoría

533. Paciente femenina de 28 años embarazada acude a una consulta externa para su quinto control prenatal y refiere preocupación ya que durante su gestación ha ganado Mucho peso iniciando con un peso normal para su talla y evolucionando hasta tener obesidad ¿Cuál de las siguientes hormonas es la causante de este cambio?

- A. Leptina
- B. Oxitocina

534. luego de 8 semanas del parto una madre lactante acude al centro médico para solicitar una evaluación completa Refiere que no ha observado ninguna clase de secreción vaginal y necesita información sobre cuándo su cuerpo regresará al Estado normal y el aparcamiento del período para poder retomar con su vida sexual ¿Cuál es la información que se debe proporcionar para el retorno de actividad sexual posterior al puerperio?

- A. La ovulación no está marcada por el retorno del sangrado menstrual normal
- B. Se inicia su vida sexual debe iniciar anticoncepción
- C. Episodios de lactancia sin continuidad retrasa la evolución
- D. El sangrado no es anovulatorio

535. Un paciente de 45 años entendido en emergencia por presentar dificultad respiratoria la valoración de enfermería presenta disnea taquipnea fiebre y saturación de oxígeno de 75% al ambiente, es diagnosticado de neumonía como parte del tratamiento la prescriben oxígeno 6 litros por minuto ¿cuál de los siguientes dispositivos para administrar oxígeno es adecuado utilizar en este caso?

- A. Mascarilla sin reciclamiento
- B. Mascarilla de reciclamiento parcial
- C. Mascarilla aerosol
- D. Mascarilla simple

536. Niño de 9 años acudió contra el médico acompañado de su madre el momento no refiere problemas ni molestias a la valoración de enfermería Se observa que la niña no registra vacuna contra el HPV razón por la cual realizan este procedimiento ¿A qué estrategia del MSP corresponde a esta actividad?

- A. Atención integral por ciclos de vida
- B. Estrategia Nacional de salud y nutrición
- C. Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
- D. Estrategia Nacional de inmunización

537. Un estudio tiene como objetivo identificar si hay diferencias en la incidencia de úlceras por presión en los enfermos a los que se realiza la prevención con la aplicación de ácidos grasos Hperoxigenados ya los que no se les aplica tras calcular el tamaño de la muestra necesaria se estudiaron a 192 pacientes que ingresaron en el centro sin úlceras por presión y que tenían la movilidad y la actividad alteradas según la escala de riesgos EMNA. La técnica de flujo continuo ha sido accidental a medida que iban ingresando los pacientes en el hospital. La incidencia de úlceras por presión es menor en el grupo de intervención lo que indica que los ácidos grasos hiperoxigenados son útiles para prevenir el desarrollo de este tipo de úlceras ¿Qué tipo de estudio es?

- A. **Prospectivo**
- B. Retrospectivo
- C. Mixto
- D. Analítico

538. Un profesional de enfermería se encuentra en la fase de selección de un instrumento adecuado para evaluar los niveles de ansiedad como parte de la elaboración de una propuesta de investigación ¿En qué etapa del proceso de investigación se encuentra el profesional de enfermería

- A. Identificación del problema
- B. Análisis de los datos
- C. Ejecución del estudio
- D. **Diseño del estudio**

539. Paciente varón de 50 años hospitalizado diagnosticado de infección respiratoria presente atención arterial 135/ 80 mmhg, temperatura 38 grados Celsius, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, profesional de enfermería decide implementar medidas para controlar la infección y mejorar la comodidad del paciente ¿cuál de los siguientes intervenciones refleja la aplicación del modelo de enfermería de Florence Nightingale?

- A. Realizar terapia respiratoria para mejorar la función pulmonar del paciente
- B. Coordinar interconsulta con especialista en enfermedades respiratorias
- C. Administrar antipiréticos para reducir la fiebre del paciente
- D. **Proporcionar al paciente un ambiente limpio y bien ventilado**

540. Se presenta en la unidad de salud Una gestante de 11 semanas para su primer control prenatal con preocupación a la valoración de enfermería en la anamnesis la usuaria manifestó consumo recurrente de ácido valproico carbamazepina y corticosteroides sin saber que estaba embarazada ¿Qué efecto se debe considerar?

- A. Anágeno
- B. **Teratógeno**
- C. Eutrófico
- D. Telógeno

541. Paciente de 33 años acude al área de inyectología para aplicarse a una dosis de intramuscular benzetazil 24 millones unidades internacionales por prescripción médica y diagnóstico de faringoamigdalitis. este profesional de enfermería delega la función al interno de enfermería ¿en qué sitio debe administrar el fármaco?

- A. Músculo glúteo menor que descansa sobre el glúteo medio

- B. Músculo glúteo mayor que descansa sobre el glúteo menor
- C. Músculo glúteo mediano que descansa sobre glúteo menor
- D. Músculo glúteo menor que descansa sobre glúteo mayor

542. Usted labora en el área de esterilización Y el responsable de la recepción de instrumental utilizado realiza la clasificación del mismo para cumplir con los diferentes procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización. ¿Qué elementos utilizan para la limpieza?

- A. Agua, alcohol ,detergente, glutaraldehídos
- B. Agua y productos enzimáticos
- C. Jabón, agua, desinfectantes químicos
- D. Alcohol medicinal e Industrial jabón líquido

543. Paciente de 9 años que durante sus 5 días de hospitalización presenta fiebre junto al revisar el registro diario de temperaturas observa un ascenso menor a 1°C en cada día. ¿Cómo se le conoce a este patrón de fiebre?

- A. Fiebre remitente
- B. Fiebre continua
- C. Fiebre recurrente
- D. Fiebre intermitente

544. En una comunidad se reportan índices elevados de personas con diabetes sin control de la enfermedad por lo tanto el establecimiento de salud decide ejecutar una intervención a la valoración de enfermería se propone que sería oportuno educar sobre el autocuidado y prevención de las complicaciones ¿Qué técnica educativa y comunicacional es la más adecuada para este caso?

- A. Minga
- B. Salas de espera
- C. Casa abierta
- D. Comunicación virtual

545. En un hospital de segundo nivel los resultados de los impuestos aplicadas a las pacientes indican insatisfacción en atención de enfermería ¿Qué acción debe desarrollar el líder del servicio para mejorar la satisfacción del cliente?

- A. Realizar un proceso de mejora continua para cambiar la percepción de los pacientes
- B. Mantener el sistema actual de trabajo y esperar nueva información
- C. Aplicar sanciones de acuerdo con el reglamento institucional al personal de enfermería por los resultados obtenidos
- D. Cambiar de Servicios al personal de enfermería

546. Una gestante de 27 años de 38 semanas de embarazo fue intervenida quirúrgicamente por parto por cesárea se mantiene en hospitalización a la valoración de enfermería presenta tos falta de aire, miembros inferiores e inspecciona que existe edema dolor sensación de calor local y color violáceo ¿Qué problema tiene la puerpera?

- A. Enfermedad tromboembólica
- B. Infección de la herida
- C. Erisipela
- D. Varices Post cesárea

547. Luego de una última valoración de una nota se entrega a su madre con verificación Cruzada en el servicio de obstetricia y se le explica las indicaciones para domicilio incluido las citas de los próximos controles ¿Cuándo se debe retirar el brazalete de identificación?

- A. En la última toma de signos vitales
- B. En el último examen de sangre realizado
- C. Cuando llegue a su casa
- D. Al vestirse con su ropa casual para egresar

548. Paciente de 53 años acude a la consulta externa que refiere sofocos fatiga dolores de cabeza e irritabilidad. Al interrogatorio manifiesta que ha cambiado su libido ausencia de menstruaciones desde hace 15 meses y cambios de humor frecuentes. ¿Qué acontecimiento está cursando la paciente?

- A. Perimenopausia
- B. Menopausia prematura
- C. Menopausia
- D. Posmenopausia

549. Está realizando un barrido documentado de vacunación en niños menores a 5 años casa a casa. ¿Qué modalidad de atención es la que está aplicando?

- A. Extramural
- B. Domiciliaria
- C. prehospitalaria
- D. Intramural

550. Madre acude con su hijo de 6 meses acude a CS al control de niño sano a la valoración de enfermería no se identifican alteraciones en los signos vitales ni en los reflejos arcaicos y durante la aplicación del test de Denver 2 se presentan todas las dimensiones normales para la edad a ¿Qué programa del MSP responde la actividad de valoración al lactante?

- A. Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador
- B. Estrategia Nacional de inmunizaciones
- C. Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
- D. Atención integral por ciclos de vida

551. Madre de 32 años acude a cita programada a los 8 días postparto. Actualmente hematócrito de valores normales, mamas hipersecretoras, loquios serohemáticos en moderada cantidad de características propias, episiorrafia en buen proceso de cicatrización. En exploración física se encuentran involución uterina. ¿Qué tipo de cambios fisiológicos experimenta la puérpera?

- A. Depresión posparto
- B. Progresivos
- C. Psicológicos
- D. Regresivos

552. Paciente primigesta de 25 años cursa un embarazo de 10 semanas acude al control prenatal refiriendo que no se ha estado alimentando adecuadamente por que presenta muchas náuseas y vómitos. a la valoración de enfermería identifica que el peso anterior se

encontraba dentro del Rango normal ¿Qué se debe hacer para evaluar la ganancia de peso en el nuevo mes?

- A. Estimar EG con la FUM
- B. Solicitar una ecografía obstétrica
- C. Medir y registrar los signos vitales
- D. Medir y registrar PESO Y talla calcular el imc

553. Los mapas parlantes son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en forma gráfica los actores sociales del proceso vivido por actores locales, los factores de riesgo y de protección ambiental estilos de vida sanitaria y biológica ¿Cuáles son los pasos para elaborar el mapa parlante?

- A. Actualización del croquis, coordinación con comités de la comunidad, ejecución de visitas domiciliarias
- B. Asignación de la población, Identificación de necesidades y problemas de la población
- C. Actualización del censo información actualizada de la población, y mapeo de parlante
- D. Elaboración del croquis,sectorización, IDENTIficación de sectores y familias de riesgo

554. ¿Cómo se denomina a la actividad quirúrgica cuya indicación surge como consecuencia de una patología aguda grave de la madre o del feto con riesgo vital materno fetal que hace aconsejable la finalización del embarazo rápidamente?

- A. Cesárea de urgencia
- B. Parto instrumental
- C. Episiotomía
- D. Cerclaje cervical

555. Paciente Mujer de 48 años en recuperación post anestésica luego de reducción abierta más fijación interna por fractura subcapital de húmero derecho al momento alerta orientada constantes vitales dentro de parámetros normales, apósitos de herida quirúrgica ligeramente manchados de líquidos serohemático, presenta parestesias y disminución de la movilidad de los dedos del miembro afectado. ¿Cuál de las siguientes es la valoración más adecuada en esta paciente ?

- A. De la función respiratoria
- B. Del estado neurovascular
- C. De la función cardiovascular
- D. Neurológica

556. Madre de varón de 3 años acude al área de emergencia refiere que hace una hora el niño ingirió de forma accidental insecticida organo fosforados presentando somnolencia, sialorrea, náuseas, palidez, incontinencia urinaria y digestiva, miosis, diaforesis. ¿Cuál es el antídoto para administrar al niño ?

- A. Atropina
- B. Bicarbonato de sodio
- C. Fisostigmina
- D. Naloxona

557. Paciente masculino de 27 años acude al servicio de emergencia por presentar disnea tos productiva y cianosis periférica a la valoración presenta signos vitales temperatura 39 grados Celsius, frecuencia respiratoria 26 por minuto 110 pulsaciones por minuto y una presión arterial de 140/ 90 milímetros de mercurio. ¿Con qué alteraciones está el paciente?

- A. Normotérmico, apnéico, bradicárdico y normotenso
- B. Hipotérmico, bradipnéico, bradicárdico, hipotenso
- C. Hipertérmico, taquipnéico, taquicárdico, hipertenso**
- D. Hipotérmico, taquipnéico, taquicárdico, normotenso

558. Un enfermero que se encuentra en su turno de la tarde en el área de emergencia se le asigna la tarea de asistir en una sutura pequeña al término del procedimiento inmediatamente se retira los guantes ¿Qué tipo de higiene de manos se debe realizar?

- A. Fricción antiséptica prequirúrgica
- B. Fricción antiséptica
- C. Lavado social
- D. Lavado antiséptico**

559. Paciente con diabetes tipo 1, acude a emergencia por presentar vómitos y deposiciones diarreicas por varias ocasiones, se realiza una glucemia y se evidencia 400mg/dl. El médico le indica iniciar el tratamiento para cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la intervención prioritaria del profesional de enfermería?

- A. Controlar el electrolito Na en pruebas de orina
- B. Registrar ingresos en la hidratación del paciente
- C. Administrar volumen de líquidos parenterales**
- D. Realizar una electrocardiograma y reparar alteraciones

560. El profesional enfermero jefe de servicio se caracteriza por tomar decisiones sin participación del grupo, asignar el trabajo sin ofrecer explicación, es dominante, es personalizado en los elogios y las críticas al grupo. ¿Qué tipo de Liderazgo ejerce este enfermero de acuerdo con la teoría de los estilos de Liderazgo?

- A. Democrático
- B. Complaciente
- C. Liberal
- D. Autocrático**

561. En el transquirúrgico de una laparotomía exploratoria y antes del cierre de la herida quirúrgica Los profesionales de enfermería circulante e instrumentista realizan el conteo de material blanco y se percatan que falte una compresa ¿Cuál es la primera acción que se debe realizar?

- A. Iniciar la búsqueda de la compresa
- B. Solicitar una radiografía
- C. Realizar el informe del incidente
- D. Informar al cirujano y repetir el recuento**

562. Un profesional de enfermería está realizando el plan de egreso de un adulto mayor de 65 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y parkinson e indica a la hija que debe retirar las alfombras del piso para la prevención de caídas en domicilio. ¿Bajo qué meta paradigma de teorizante actúa?

- A. Dorothea orem
- B. Betty neuman
- C. Callista roy**
- D. Virginia henderson

563. Un paciente de 56 años ingresa a la sala de emergencias con dolor torácico opresivo escala de Eva 10 sobre 10, sudoración profusa, disnea y palidez. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en las derivaciones anterolaterales. El médico indica que es un infarto agudo de miocardio IAM. Al realizar la valoración inicial, el enfermero identifica la presencia de signos y síntomas que respaldan el diagnóstico médico. ¿Cuál de las siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería es prioritaria?

- A. Dolor agudo**
- B. Riesgo de deterioro de la función cardiovascular
- C. Deterioro de la integridad cutánea
- D. Ansiedad

564. ¿Cuál es la clasificación de los servicios de salud por niveles de atención según el MAIS-FSC?

- A. prehospitalaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención
- B. primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención
- C. primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y cuarto nivel de atención
- D. primer nivel, segundo nivel tercer nivel, cuarto nivel de atención y prehospitalario**

565. Mujer de 30 años, durante La visita domiciliaria refiere que su familia está conformada por ella, su esposo y su hijo, a la valoración de enfermería se identifica que es una familia funcional sin riesgos, en donde ambos esposos estuvieron casados y tienen hijos con sus parejas anteriores. ¿ A qué tipo de familia corresponde el caso?

- A. Extendida
- B. de acogida
- C. comunal
- D. mixta**

566. En la actualidad la salud digital ha creado sistemas de registros clínicos electrónicos, que de la enfermería. Al momento se trabaja con algunas herramientas en la práctica clínica para el registro de datos. Se observa en unidades MSP su trabajo en la plataforma de salud PRASS. ¿ que registra enfermería en el sistema PRASS?

- A. Acceso al campo de signos vitales y datos antropométricos
- B. Actividades y procedimientos de la gestión de enfermería**
- C. Información que el médico u otro profesional puede modificar
- D. Acceso a la productividad “diaria,” “mensual”

567. Paciente de 37 años de postoperatorio inmediato de colecistectomía, Permanece en reposo relativo, desde hace 7 horas refiere vértigo, lo que le impide movilizarse y manifiesta incomodidad. ¿Cuál sería el cuidado prioritario de enfermería para asegurar su higiene y confort en este caso?

- A. realizar el baño de Esponja
- B. climatizar la habitación
- C. ayudar a la deambulación

D. **cambiar pijama y frazadas**

568. Paciente de 37 años, en reposo relativo tras una colecistectomía ha comenzado a presentar vertigo durante las últimas 7 horas, lo que le impide caminar. También reporta diaforesis e incomodidad. ¿Cuál es la intervención de enfermería más adecuada para garantizar la higiene y el confort en este caso?

A. **realizar el baño de Esponja**

B. climatizar la habitación

C. ayudar a la ambulación

D. cambiar pijama y frazadas

569. Paciente masculino de 45 años es llevado al quirófano para resolución quirúrgica de emergencia. Durante el trans quirúrgico el cirujano solicita al instrumentista preparar una solución con heparina y otra con antibiótico, debido al estrés del momento se confunden las soluciones preparadas, el médico solicita la con heparina, pero el instrumentista le pasa la solución con antibiótico. el instrumentista reconoce su error frente al equipo quirúrgico y lo soluciona de inmediato. ¿Cuál es el atributo característico que presenta el instrumentista quirúrgico al reconocer su error?

A. autocontrol emocional

B. habilidades para la resolución de problemas

C. **honestidad y conducta ética**

D. habilidades organizativas

570. El personal de enfermería realiza una visita domiciliaria a paciente masculino de 48 años que según dispensarización del grupo 4, Sufre de deterioro psico orgánico grave secundario por múltiples infartos cerebrales desde hace un año, Durante los dos últimos años ha requerido múltiples hospitalizaciones por neumonías a repetición e infecciones de escaras y vive con su señora, quién se está encargando de atenderlo. Actualmente está postrada en su cama y se encuentra en mal estado nutritivo y frente a un nuevo cuadro de neumonía, con mala respuesta a tratamiento domiciliario. la licenciada procede a la valoración de signos vitales y observación de la piel en zonas de presión, al examen físico se destacan lesiones cutáneas en manos y pies, sugerentes de sarcoma de kaposi previo consentimiento informado de práctica pruebas para detección de VIH, resultando reactivo a test hizo confirmación la profesional recomienda valoración médica y traslado al hospital para apoyo de servicio social. ¿ Principio bioético aplicó la profesional?

A. **beneficencia**

B. no maleficencia

C. autonomía

D. justicia

571. Paciente de 20 años acude al centro de salud y es diagnosticado con amigdalitis aguda sin antecedentes personales, el médico prescribe penicilina 1,200,000 unidades internacionales. Usted como personal de enfermería realizan la prueba de sensibilidad al medicamento. ¿ Qué vía de administración utiliza para realizar esta prueba?

A. vía subcutánea

B. vía intravenosa

C. vía intramuscular

D. **vía intradérmica**

572. Paciente femenino de 60 años refiere que tiene una masa en la mano derecha sin presencia de dolor, al examen físico se observa cambios en el tamaño y temperatura de la piel además de edema, médico sospechó posible diagnóstico de cáncer de mama. ¿ Qué actividad de enfermería es la más adecuada en este caso?

- A. Preparar a la paciente para la radioterapia
- B. evaluar los sentimientos y conocimientos sobre su posible diagnóstico**
- C. preparar a la paciente para la mastectomía simple
- D. Preparar a la paciente para la quimioterapia

573. Paciente femenino de 15 años en una visita a domiciliaria refiere más la comunicación con sus padres, Conflictos frecuentes y como producto de ello bajo rendimiento académico. en la valoración enfermera identifica que se trata de una familia disfuncional. ¿ en base a qué dominio de la Nanda construye el diagnóstico para esta familia?

- A. dominio 7 relación de roles**
- B. dominio 5 percepción cognición
- C. dominio 1 promoción de la salud
- D. dominio 10 principios de vida

574. Mujer de 23 años primípara permanece en sala de partos en conjunto con su recién nacido masculino a término. Durante el parto no se presentan complicaciones ni riesgos, la mujer solicita información sobre cuándo se debe iniciar la lactancia materna. ¿ Qué información le ofrece?

- A. iniciar la lactancia materna una hora después de abandonar la sala de partos
- B. inicia la lactancia materna cuando pase a hospitalización
- C. inicia la lactancia materna cuando pase a recuperación
- D. iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora ,antes que abandone la sala de partos**

575. Paciente de 21 años llega al servicio de ginecología para tratamiento clínico y usted como personal de enfermería debe proporcionar cuidados de la salud y ejercer los principios bioéticos ¿Qué principios debe tener en cuenta?

- A. Unidad, beneficencia, integridad y no maleficencia
- B. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y Justicia**
- C. Individualidad, beneficencia, integridad y Justicia
- D. Autonomía, beneficencia, misericordia y continuidad

576. Un paciente de 65 años está recibiendo una transfusión sanguínea debido a una anemia crónica. durante la Transfusión el paciente presenta escalofríos, fiebre, taquicardia y dolor lumbar.¿Cuál es la intervención prioritaria que debe realizar el profesional de enfermería?

- A. Detener inmediatamente la transfusión sanguínea**
- B. Informar al paciente que estos síntomas son normales durante una transfusión
- C. Aumentar la velocidad de la Transfusión para terminar más rápido.
- D. Administrar medicación analgésica al paciente

577. Durante una consulta de control para vacunación, una madre lleva a su hijo de 2 años y 1 mes. Tras la evaluación de la enfermera, se constata que el niño ha recibido las dos dosis de Sarampión, Rubéola y Parotiditis, además del cuarto refuerzo para difteria tétanos y tosferina, y completó las vacunas del primer año de vida. Actualmente, se está realizando una campaña para vacunar contra la influenza. Según la normativa del Ministerio de Salud Pública, ¿Cuál vacuna no debería administrarse en este momento?.

- A. Fiebre amarilla
- B. Influenza
- C. Varicela
- D. Poliomieltis.

578. Un recién nacido masculino de 16 horas de vida, producto de un parto a término con un peso de 3200 g, recibe la inmunización con la vacuna BCG (Bacilo Calmette- Guérin). ¿Qué tipo de protección inmunitario ha adquirido el recién nacido?

- A. Inmunidad activa naturalmente adquirida
- B. Inmunidad activa patológicamente adquirida
- C. Inmunidad activa biológicamente adquirida.
- D. Inmunidad activa artificialmente adquirida

579. Un equipo de profesionales del centro de salud se moviliza para dar asistencia a una comunidad rural donde persisten desigualdades en las condiciones socioeconómicas. Durante la visita domiciliaria una familia refiere la falta de infraestructura sanitaria hace varios años y enfermedades parasitarias. La profesional de enfermería observa diferentes factores intermedios relacionados con prácticas sanitarias inadecuadas de la vivienda y en la toma de decisiones del cuidado de los padres al niño menor de 2 años. ¿En cuál determinante de salud trabaja el profesional enfermero?

- A. Ambiental
- B. Biológico
- C. Conductual
- D. Social

580. Un enfermero está a cargo de la extracción y la colocación de una vía intravenosa en un paciente que presenta sospecha de hepatitis C. ¿Qué principio de Bioseguridad debe implementarse para prevenir riesgo de infección durante este procedimiento?

- A. Uso de barreras físicas.
- B. De bioética
- C. De inmunización
- D. De asepsia

581. Un recién nacido de madre Rh- y padre Rh +, con hemoglobina de 11g/dl, se evalúa en sus primeras horas de vida. Con esta información ¿Qué tipo de anemia es la más probable en este caso?

- A. Anemia por pérdida sanguínea.
- B. Anemia por aumento de la destrucción de hematíes
- C. Anemia fisiológica.

582. Un profesional de enfermería ha sido asignado para evaluar la eficacia de un protocolo de atención recientemente implementado en su institución, con el objetivo de disminuir las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué tipo de investigación sería la más adecuada para obtener resultados fiables en este caso?

- A. Investigación experimental
- B. Investigación correlacional
- C. Investigación descriptiva
- D. Investigación exploratoria.

583. Mujer de 50 años refiere pérdida inexplicable de peso polidipsia y poliuria sin otros síntomas acompañantes según las guías de práctica clínica del msp del Ecuador Cuál es el criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2

- A. Glucemia en plasma después de la carga oral de glucosa igual o mayor a 126 mg/dl
- B. Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 5.6%
- C. glucemia en ayuno medida en plasma venoso igual o mayor a 110 mg/dl
- D. glucemia casual en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl

584. Un paciente de 24 años de edad sin antecedentes patológicos personales acude a consulta nutricional. Al examen físico presenta signos vitales dentro de parámetros normales. IMC 23 kg/m². La paciente manifiesta que tiene patrones alimentarios adecuados, se identifica como Musulmana, por lo que no consume cerdo. Es referida del área de salud mental debido a su ansiedad por comer. ¿Cuál es el término que define los principios, normas y creencias que tiene la paciente?

- A. moral
- B. ética
- C. dignidad
- D. deontología

585. Mujer de 20 años casada, de profesión estudiante, acude al centro de salud porque refiere haber sufrido recientemente insultos, gritos y menosprecio por parte de su esposo, manifiesta que este acontecimiento se repite con frecuencia y que ha repercutido de manera negativa en su vida académica y social. ¿A qué tipo de violencia hace referencia?

- A. física
- B. sexual
- C. basada en el género
- D. psicológica

586. Durante el paro nacional, varios profesionales de la salud no llegaron a su establecimiento de salud de base, por lo que tuvieron que trasladarse a otros centros a cumplir con sus horas laborales. En el centro de salud Santa Bárbara se optó por realizar visitas domiciliarias a familias con niños menores de 3 años, aprovechando los servicios de una licenciada en terapia del lenguaje, en este sentido. ¿Qué criterio se tomó en cuenta para la selección de esta modalidad de atención a las familias mediante visitas domiciliarias?

- A. Criterio demografico
- B. Criterio administrativo
- C. Criterio socioeconomico
- D. Criterio epidemiológico

587. paciente masculino de 40 años con diagnóstico de cáncer de próstata. Al momento acude a su sexta sesión de quimioterapia ambulatoria. El paciente manifiesta que en los últimos días ha presentado fatiga que limita su capacidad para participar en actividades.

¿Qué bienestar del paciente está afectado?

- A. espiritualidad
- B. físico**
- C. psicológico
- D. social

588. Paciente de 24 años en segundo día de hospitalización en el área de cirugía general, Con diagnóstico de apendicitis flemonosa, se le realizó una laparotomía exploratoria, al momento, refiere dolor abdominal. a la exploración física paciente despierto abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, con presencia de un drenaje Jackson pratts e hipocondrio derecho, eliminando líquido seroso, 30 ml en 24 horas. ¿ Qué características tiene este sistema drenaje?

- A. Drenaje tipo T, puede ser abierto cerrado y tiene una acción por gravedad
- B. Dispositivo pasivo, flexible de forma cóncava que actúa por capilaridad
- C. Drenaje activo, cerrado, aspiración negativa, con aproximada de 100 ML**
- D. Drenaje positivo, abierto, no aspirativo formado por un fragmento de Goma

589. Una enfermera investigadora Está realizando un estudio en el que divide al azar al 80 pacientes de sexo masculino entre 20 a 40 años, fumadores, que asisten a una clínica de apoyo, específica para dejar de fumar. La enfermera tiene la intención de comparar la efectividad del tratamiento estándar con el programa educativo, con el objetivo de determinar cuál de los dos enfoques es más eficaz. ¿ Qué tipo de muestras se está usando?

- A. Por conveniencia
- B. Conglomerados**
- C. Bola de nieve
- D. Aleatorio

590. Paciente masculino de 36 años, es traído al centro de salud por familiares, por presentar caída de aproximadamente de 4 metros de altura, al ingreso estuporoso, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 36.5, saturación de oxígeno de 95% al aire ambiente, vía aérea permeable, columna cervical sin alteración, tórax normal, abdomen normal, cabez herida de 5 cm en cuero cabelludo en región temporo.parietal derecha, Glasgow 8/15, pupilas normorreactivas.

¿Cuál será su conducta inicial?

- A. tramitar tomografía simple de cráneo
- B. intubación endotraqueal y traslado a hospital de mayor nivel
- C. observar por 6 horas y reevaluación
- D. canalización de dos vías periféricas y traslado a hospital de mayor nivel.**

591. Paciente masculino de 80 años hospitalizada y diagnosticada con insuficiencia cardíaca. Al momento presenta dificultad respiratoria, fatiga la exploración física, presenta edema en extremidades inferiores y +/+++ requiere asistencia para iniciar con nada deambulacion. ¿Qué riesgo principal puede presentar al momento de iniciar la deambulacion?

- A. Taquicardia
- B. Hipotension ortostatica**
- C. Hipertension
- D. Bradicardia

592. Paciente femenino de 80 años en el área clínica con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Al momento se encuentra dependiente, inquieta, agitada. ¿Cuál es la primera medida a tomar en este caso para evitar riesgo?

- A. Adelantarse a las necesidades
- B. Proporcionar intimidad en el momento necesario
- C. Dejar las barandillas levantadas al alejarse de la cabecera**
- D. Ofrecer ayuda cuando sea necesario

593. Madre acude al centro de salud con su hijo de un año por presentar cuadro de dos días de evolucion con disnea, taquipnea de tiraje subcostal e intercostal, La saturación se encuentra en 78% siendo necesario la administracion de oxígeno por medio de un sistema de alto flujo. ¿Qué dispositivo de oxígeno de alto flujo debe colocar a este niño?

- A. Mascarilla Venturi**
- B. Cánula nasal pediátrica
- C. Mascarilla simple
- D. Mascarilla con reinhalación parcial

594. Primigesta con 36 semanas de gestación ingreso a la unidad de salud a la valoración de enfermería presenta estado de conciencia alerta, signos vitales frecuencia cardíaca 119 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, presión arterial 140 sistólica, diastólica 110 mm de Mercurio, temperatura 37 grados centígrados, saturación de oxígeno 96%, proteinuria 2 cruces en tirilla reactiva. En el examen físico el profesional enfermero encuentra edema en extremidades inferiores. aplicando la escala de SCORE MAMA. ¿Cuál es el puntaje y pasos a seguir en este caso?

- A. puntaje 6 aplicar SCORE MAMA cada hora y registrar
- B. puntaje 11 aplicar SCORE MAMA cada dos horas y registrar
- C. puntaje 8 aplicar SCORE MAMA cada 30 minutos y registrar**
- D. puntaje 4 aplicar SCORE MAMA cada 4 horas y registrar

595. ¿Cuáles son los componentes del metaparadigma enfermero?

- A. Salud, teoría, conceptos, entorno.
- B. Enfermería, médicos, salud, paciente.
- C. Persona, entorno, salud, enfermería.
- D. Persona, salud, entorno, teoría.**

596. Un equipo de profesionales del Centro de Salud se movilizan para dar asistencia en una comunidad rural donde persisten desigualdades en las condiciones socioeconómicas. Durante la visita domiciliaria, una familia refiere la falta de infraestructura sanitaria desde hace varios años y enfermedades parasitarias. La profesional de enfermería observa diferentes factores intermedios relacionados con prácticas sanitarias inadecuadas de la vivienda y en la toma de decisiones del cuidado de los padres al niño menor de dos años. ¿En cuál determinante de la salud trabaja el profesional enfermero?

- A. Ambiental.
- B. Social.**
- C. Biológico.
- D. Conductual.

597. Paciente masculino de 48 años ingresa al servicio de emergencia por una caída, refiere cefalea intensa (escala de EVA 8/10), acúfenos y escotomas de una duración de 2 horas aproximadamente. Se decide su ingreso para observación y realización de pruebas de imagen. ¿Cuáles son los signos de alarma de alteración neurológica que el profesional de enfermería debe valorar?

- A. Dolor o molestia torácica, edema periférico y palpitaciones.
- B. Dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos y diarrea.
- C. Disnea, convulsiones, dolor torácico y hemoptisis.
- D. Dolor, convulsiones, vértigo y debilidad muscular.**

598. Paciente de 67 años, con dolor epigástrico, reflujo de larga evolución acude a consulta externa de cirugía, al ser referido desde gastroenterología con diagnóstico de hernia hiatal tipo 1 por deslizamiento de 5 cm. al examen físico el cirujano constata dolor epigástrico intenso y exámenes de imagen acordes con el diagnóstico, se programan cirugía laparoscópica para corregir la hernia hiatal. ¿qué complicaciones consideraría con este tipo de cirugía?

- A. Trombosis venosa**
- B. Alcalosis respiratoria
- C. Aumento del retorno venoso
- D. Disminución de catecolaminas

599. Una gestante de 18 años acude a su primera consulta prenatal a las 15 semanas de embarazada. Refiere que su hermano tiene un cuadro de varicela y solicita información sobre prevención de esta enfermedad. Al momento está asintomático y al examen físico está afebril. ¿Cuál es la recomendación para la paciente acerca de las vacunas?

- A. Si no ha sido vacunada contra varicela, se recomienda la vacuna después del parto**
- B. Si fuera seronegativa para rubéola se recomienda vacunarse durante el embarazo.
- C. Administrar la primera dosis antitoxina tetánica después de las 20 semanas.
- D. Puede recibir vacunas con virus vivos atenuados durante el embarazo.

600. Una paciente de 18 días de nacida a término por parto céfalo-vaginal con peso adecuado. Acude al centro de salud por presentar taquipnea, tos que moviliza secreciones, aleteo nasal, vómito en número de 5. Al examen físico FR: 65 rpm, rinorrea transparente, pulmonar con murmullo vesicular conservado, leve estridor laríngeo. Se decide su ingreso a observación y se requiere hidratar a la paciente. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un objetivo de la reposición de los líquidos de mantenimiento en esta paciente?

- A. Diluir la concentración de orina.
- B. Evitar la deshidratación.**
- C. Evitar la hipocalcemia.
- D. Producir hormona antidiurética.

601. Una madre de familia con su hija adolescente de 14 años porque desde el último año ha presentado irregularidad en los ciclos menstruales. indica que la menarquía se presentó a los 12 años y 6 meses de edad y durante el primer año se presentaron todos los meses, no tiene antecedentes clínicos de importancia. al examen físico se aprecian caracteres sexuales secundarios presentes. la paciente no ha iniciado vida sexual activa. Los signos vitales son estables. el examen físico pediátrico no demuestra ninguna alteración y en el estudio de imagen de ecografía pélvica es normal. ¿Cuál es la decisión a formar en esta paciente?

- A. realizar un examen ginecológico minucioso
- B. realizaron a laparoscopia diagnóstica
- C. educación y orientación sobre el ciclo menstrual femenino**
- D. prescribir inductores de ovulación
- E. dependencia

602. Paciente femenino de 35 años, con Alcoholismo Desde hace dos años, acude a su consulta porque ha decidido dejar de consumir alcohol ya que una semana antes de la consulta tuvo un accidente de tránsito. no refiere ingesta de medicación al momento se presenta asintomática. En el examen físico los signos vitales están estables, no hay signos patológicos. Se aplica el test de audit obteniendo la paciente una puntuación de cinco. con base en el resultado obtenido de la escala de audit. ¿ cómo clasifica el consumo de alcohol en la paciente?

- A. consumo abusivo
- B. consumo de riesgo
- C. riesgo bajo**
- D.

603. Un niño de 10 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar inició el tratamiento antituberculoso hace 45 días, náuseas, diarrea, irritabilidad e hipoacusia. la madre preocupada por estos síntomas, ha interpuesto la medicación en lo que realiza una visita domiciliaria sin encontrar a este núcleo familiar. ¿ En qué tipo de tratamiento se clasifica a este grupo?

- A. fracasó el tratamiento
- B. multidrogoresistencia MDR
- C. paciente curado
- D. pérdida en el seguimiento**

604. Niño de 2 años, que hace 24 horas presenta estornudos, secreción nasal y tos no productiva. En examen paciente con temperatura de 37.2 °C. rinorrea, aleteo retronasal, cardiopulmonar y abdomen sin patología aparente. Si el diagnóstico es un resfriado común. ¿Cuánto tiempo, en lo posible, el niño debe evitar ir a la guardería para prevenir contagiar a sus compañeros?

- A. Desde 2 días desde el inicio de los síntomas hasta 2 semanas después,
- B. Desde 5 días después de iniciado los síntomas hasta una semana después.
- C. Desde el inicio de los síntomas hasta 2 semanas después.

D. Desde el inicio de los síntomas hasta 6 días después.

605. El Centro de Salud Chimbacalle al ser de Tipo C atiende emergencias: para el triage ha instaurado un sistema en el cual recolectan todos los datos del paciente, con el fin de que los profesionales de salud dispongan de la información de manera oportuna y que facilite la toma de decisiones, la resolución de problemas y los procesos monitoreo y evaluación. Este sistema se complementa con una de las herramientas básica para la gestión e implementación del MAIS-FCI, como es el registro de información a través de la historia clínica única, que permite el análisis y toma de decisiones fundamentadas en hallazgos objetivos. ¿De qué tipo de sistema son parte estos sistemas e instrumentos de registro de información y clasificación de pacientes?

- A. Sistema de gestión administrativa.
- B. Sistema de gestión y planificación.
- C. Sistema de atención individual a usuarios.**
- D. Sistema de vigilancia epidemiológica.

606. Paciente mujer de 48 años y residente en Guano, refiere cefalea y fiebre de 2 semanas de evolución, vomito, desde hace 2 días y alteración de la conciencia en las últimas horas con irritabilidad. En la escala de coma de Glasgow de 13/15, existe meningismo. Se realiza una tomografía simple de cráneo lo cual es normal, luego de lo cual la punción lumbar revela líquido cefalorraquídeo, xantocrómico, transparente en la citoquímica linfocitosis, hiperproteíorraquia, hipoglucorraquia leve. BAAR negativo. ¿Cuál es el manejo de diagnóstico y tratamiento?

Solicitar cultivo de Lowstein jensen e iniciar antibioticoterapia empírica con ceftriaxona que atraviesa la barrera hematoencefálica.

- A. Solicitar tomografía contrastada de cráneo e iniciar tratamiento para absceso cerebral.
- B. Solicitar PCR en tiempo real en LCR iniciar tratamiento anti tuberculosis de forma inmediata.
- C. Solicitar resonancia magnética simple y contrastada de encéfalo como fondo de ojo y repetir BAAR en LCR en 24 horas.**

607. Usted como responsable de servicio de Medicina interna identifica flebitis en pacientes hospitalizados realiza actividades para disminuir la incidencia de este problema ¿Cuál de las etapas del proceso de administración?

- A. Planeación**
- B. Organización
- C. Control
- D. Dirección

608. Paciente de 68 años, hospitalizada con diagnostico de artritis reumatoide. Al momento se encuentra despierto, orientado y el profesional en enfermería procede a brindarle ayuda para bañarse y durante el baño la paciente indica que esta respirando muy rápida y presenta taquicardia ¿ Cual es la mejor respuesta del profesional enfermero?

- A. Ayudar a la paciente a terminar el baño rápido
- B. Indicar a la paciente que respire profundamente intentar relajarse**
- C. Ayudar a la paciente a volver a la cama
- D. Dejar a la paciente sola para que descanse en una silla

609. Paciente femenina de 39 años, acude a la sala de emergencias por presentar dolor en abdomen tipo opresivo de aproximadamente 2 horas de evolución. Tiene pareja sexual desde hace 12 años, pero nunca se ha podido quedar embarazada. No usa ningún método de anticoncepción. Se interroga sobre la menarquia e indica que fue a la edad de 9 años. Sobre antecedentes patológicos familiares menciona que una hermana menor falleció hace 4 años por cáncer de mama. La última citología fue hace 3 meses y el resultado fue normal. El examen ginecológico revela un cérvix en aspecto macroscópico normal y al realizar el tacto bimanual se advierte la presencia de una masa anexial dependiente de ovario del lado derecho, de 5 centímetros de diámetro de consistencia dura y dolorosa a la movilización. Todos los factores de riesgo orientan a que la paciente pueda presentar masas anexiales malignas. ¿Cuál es el cáncer ovárico más frecuente?

- A. Coriocarcinoma
- B. De células germinales
- C. Mucinoso
- D. Seroso**

610. Una paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre, ingresa al hospital en expulsivo, parto cefálico vaginal. Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia cardíaca 140 lpm, Apgar 9. Líquido amniótico de mal olor. Rotura de membrana de 21 horas. ¿Qué factores de riesgo para infección presenta el recién nacido?

- A. Líquido amniótico transparente con grumos
- B. Parto céfalo vaginal, en expulsivo
- C. Rotura de membranas de 21 horas**
- D. Madre adolescente

611. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales de la esquizofrenia según el DSM-5?

- A. Delirios, alucinaciones y habla desorganizada.**
- B. Ilusiones, pensamientos erróneos y tristeza.
- C. Catatonia, verborrea e ilusiones.
- D. Acumulación, delirio bizarro y atracones.

612. Hombre se cae de 4 metros, y tiene luxación de hombro:

- A. Reduccion de luxacion
- B. Colocar cabestrillo
- C. Referir a otro hospital
- D. Algo con que no es luxación

613. Paciente de 32 años , con cuadro caracterizado por otalgia , otorrea , prurito, a nivel de oído y disminución de la audición derecha . Al examen físico presenta dolor al tirar el pabellón auricular derecho para el examen con el otoscopio , eritema , edema y detritos en el conducto auditivo externo. Cual es el diagnóstico presuntivo ?

- A. Otitis externa**
- B. Otitis media
- C. Colesteatoma adquirido

D. Carcinoma cutaneo epidermoide

614. Un paciente masculino de 18 años sin antecedentes patológicos acude a consulta porque desde hace 3 meses presenta “barros y espinillas” en la cara en moderada cantidad, en algunas ocasiones lesiones causan dolor. Ha utilizado jabones con antibióticos de venta libre sin mejoría. En el examen físico: signos vitales estables, presencia de lesiones compatibles con comedones abiertos y cerrados en moderada cantidad ubicados en toda la cara, 2 lesiones papulopustulosas, aisladas. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

- A. Acne grave
- B. Acne conglobata
- C. Acne moderado
- D. Acne leve

615. Un paciente masculino de 28 años , acude a consulta externa por presentar desde hace tres días, disfagia y odinofagia acompañada desde hace 24 horas de fiebre y escalofrío . A la exploración física presenta orofaringe hiperémica , amígdalas aumentadas de tamaño con cripta pustulosas bilateralmente, inmediatamente facultativo toma una muestra y envía para cultivo y antibiograma , en el examen de laboratorio demuestra crecimiento *S. pyogenes*, sensible penicilina y ciprofloxacina , el médico prescribe penicilina procainica y benzatínica IM., pese al deseo del paciente de no querer recibir medicamento con este tipo de vía de administración , estableciendo que es mejor para él y su bienestar este procedimiento . Qué relación clínica se establece en este caso?

- A. Paternalista
- B. Interpretativo
- C. Deliberativo
- D. Informativo

616. Un recién nacido de 48 horas de vida recibe atención en emergencia por cuadro de distensión abdominal, acompañado de vómitos por varias ocasiones de contenido bilioso y ausencia de meconio. Sus antecedentes personales incluyen polihidramnios, nacimiento por parto vaginal a las 39 semanas de gestación. Al examen físico FC:160 /min, FR:50/min, TA:60/40 mmHg, temperatura:36°C. El abdomen se encuentra distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Ano permeable. La radiografía de abdomen muestra asa de intestino delgado distendido, escaso aire en colon. ¿Cuál es el diagnóstico probable del paciente? Respuestas:

- A. Íleo meconial.
- B. Enterocolitis pseudomembranosa.
- C. Intususcepción.
- D. Divertículo de Meckel

617. Paciente asmática que en la mañana limpió la casa usando el aromatizante de siempre y luego fue al gimnasio a su sesión regular de spinning. En la tarde presentó lumbalgia por lo que se automedica con COX1 y COX2 los cuales no había utilizado anteriormente. En la noche es llevada a urgencias con episodio de asma con compromiso vital que requirió intubación. ¿Cuál de los factores mencionados es más probable que haya condicionado el evento asmático severo? Respuestas:

- A. Antiinflamatorios.

- B. Aromatizantes.
- C. Ejercicio.
- D. Ácaros.

618. Paciente de 2 meses de edad, atendido por emergencias con cuadro de fiebre e irritabilidad de 5 días de evolución. Acudió al pediatra, quien prescribió acetaminofén alternado con ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización. Exámenes: leucocitos 15.000 /mm³, neutrófilos 70%, linfocitos 30%, hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000 /mm³, proteína C reactiva 100 mg/L, elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos +++, nitritos positivo, bacterias: bacilos gram negativos +++. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente? Respuestas:

- A. Hospitalizar con ceftriaxona intravenosa.
- B. Enviarlo a casa con trimetoprim- sulfametoxazol oral.
- C. Observar 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitaliza.
- D. Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.

619. ¿Qué trazo representa la despolarización de los ventrículos en el ECG?

- A. Complejo QRS.
- B. Onda P.
- C. Segmento ST.
- D. Onda T.

620. Un paciente masculino de 23 años sin antecedentes patológicos personales, acude a su consulta para control porque a su padre, con quien vive, le han diagnosticado tuberculosis pulmonar y se encuentra en tratamiento desde hace 15 días. Al momento asintomático. Al examen físico FC: FR: 12 RPM, tensión arterial 110/70, temperatura axilar, saturación de oxígeno 95%, el resto está normal. Exámenes de laboratorio: hemograma normal, radiografía de tórax normal ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Clasificar como contacto esporádico, iniciar tratamiento preventivo.
- B. Diagnosticar tuberculosis por criterio epidemiológico e iniciar tratamiento.
- C. Clasificar como contacto frecuente, iniciar tratamiento acortado.
- D. Clasificar como contacto íntimo, educación y valoración en 3 meses.

621. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - ENSANUT 2018, se reporta que los 18 años es la edad promedio de la relación sexual y que una mujer de 15 a 49 años, tendría en el promedio 2.2 hijos en su vida reproductiva. En el registro estadístico de defunciones generales del 2019, se reporta 3 335 muertes infantiles. Siendo la primera causa la dificultad respiratoria del recién nacido, relacionadas con 504 muertes, de estas 123 han sido dentro de la provincia del Guayas. Por lo que se ha previsto implementar un sistema que permita el control de estas. El lineamiento Estratégico 7 del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, establece: Garantizar la maternidad segura y la salud neonatal a través de la promoción, prevención y atención integral en salud, Y para ella plantea 4 líneas de acción. Cual de las siguientes opciones pertenece a las líneas de acción del lineamiento estratégico 7:

Fomentar la participación y corresponsabilidad ciudadana para el cumplimiento y exigibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos

- A. Fortalecer la asesoría en anticoncepción y planificación familiar en el Sistema

- B. Nacional de Salud de acuerdo a los enfoques del MAIS
- C. Mejorar la vigilancia e investigación de la morbilidad y mortalidad materna y neonatal**
- D. Asegurar la articulación interinstitucional en el Sistema Nacional de Salud en temas de salud sexual y salud reproductiva

622. De los 13727 casos de varicela notificadas hasta diciembre del 2018 , 130 casos ----- por la provincia de Pichincha . Los grupos de edad más afectados son los de 5 a 9 años ,----- 2016 a 2018 . Llama a la atención la presencia de algunos picos en las curvas, ----- dada más común utilizadas para construir este tipo de reportes tendencias?

- A. Caso control
- B. Encuestas
- C. Rumores
- D. Notificación de casos**

623. Paciente masculino de 75 años, con antecedentes patológicos personales que diagnostico de diabetes mellitus tipo 2 horas 15 años en tto farmacológico oral y años con insulino terapia , acude al servicio de emergencias por presentar dolor torácico repentino opresivo de dos horas de evolución , intenso EVA 9/10 . Al examen físico lpm, FR: 28 rpm , SPO2: 90% aire ambiente, TA: 180/115 mm Hg , paciente en regulares condiciones generales, facies álgicas, con signos de dificultad respiratoria , tiraje supraescapular bilateral diaforesis. Se realiza ECG. Cual es el diagnóstico en base al patrón electrocardiográfico presentado?

- A. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST
- B. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST**
- C. Angina de pecho
- D. Cardiopatía isquémica crónica

624. Paciente de 20 años acude a hospital por presentar trauma contuso a nivel escrotal, durante juego de fútbol , refiere dolor intenso al examen físico se aprecia , ----- escrotal, equimosis y dolor a la palpación , se realiza ecografía con reporte de hematocele en moderada cantidad . Cual es la recomendación en la terapéutica del paciente

- A. ATB
- B. Intervención quirúrgica**
- C. Drenaje con jeringuilla
- D. Antiinflamatorios y hielo local

625. Una paciente femenina de 8 horas de nacida con bajo peso al nacimiento. Al momento presenta hipotonía, hipotensión arterial y una convulsión tónico clónico presenta apnea respiratoria, flacidez, hipotermia. FC 110 lpm. Usted considera posible hipoglucemia. ¿Cuál es una posible causa?

- A. Hipoinsulinismo
- B. Aumento de gluconeogénesis
- C. Disminución de las necesidades de glucosa por hipoxia.
- D. Disminución de las reservas tisulares de glucógeno.

626. Varón de 14 años que acude al centro de salud por presentar polidipsia de aproximadamente una semana de evolución, se acompaña de polifagia, poliuria, astenia, sensación de "hambre a todas horas". No tiene antecedentes personales de importancia. Tiene como antecedente familiar abuela materna con Diabetes. En el examen físico los signos vitales se encuentran dentro de rangos normales; IMC de 27.8 kg/m². Perímetro de cintura 110 cm. Presenta acantosis nigricans en cuello y región axilar. El resto del examen físico sin alteraciones de rango normal. Se le realiza glucemia capilar al momento con un valor de 210 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes análisis de laboratorio es más probable que confirme el diagnóstico?

- A. Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 110 mg/dl
- B. Glucemia capilar mayor de 200 mg/dl al azar**
- C. Hemoglobina glicosilada con un valor de 5.7 %
- D. Glucosa plasmática de 126 mg/dl luego de sobrecarga oral

627. Paciente de 36 años, multipara con 30 semanas de gestación, con antecedente de tabaquismo y legrado hace 6 años por aborto espontáneo. Acude por sangrado vaginal. ¿Cuál es el principal signo que orienta el diagnóstico de placenta previa?

- A. Hemorragia al inicio del embarazo.
- B. Hemorragia profusa.
- C. Hemorragia de coloración café.
- D. Hemorragia indolora.**

628. Paciente masculino de 44 años, está desempleado, divorciado, consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana, se siente triste, duerme mucho, ha bajado de peso, no puede concentrarse, siente que piensa lento, por dos ocasiones se ha cortado las venas y ha decidido lanzarse de un puente. ¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir en el manejo clínico del paciente?

- A. Se respeta la autonomía del paciente porque es una voluntad anticipada.
- B. Manejo y apoyo familiar para la guía conductual e inicio de ansiolíticos.
- C. Hospitalización en el servicio de psiquiatría e inicio de psicofármacos.**
- D. Manejo por consulta externa de psiquiatría semanal.

629. Un paciente masculino de 45 años, acude a sala de emergencia de un hospital básico, en el interrogatorio manifiesta que tiene planes concretos sobre hacerse daño y acabar con su vida, en una ocasión tuvo un intento autolítico con cortes en su muñeca izquierda, expresa desesperanza, rechaza apoyo social y no rectifica sus ideaciones suicidas. En la historia clínica se registra que el paciente tiene antecedentes familiares de conducta suicida, alcoholismo, divorciado, vive solo. De acuerdo con la clasificación de riesgo suicida, ¿Cuál es el diagnóstico correcto en este paciente?

- A. Riesgo suicida grave.**
- B. Riesgo suicida moderado.
- C. Riesgo suicida leve.
- D. Riesgo suicida extremo

630. Un paciente masculino de 68 años, sin antecedentes patológicos, acude por presentar desde hace 2 meses disnea progresiva y dolor en punta de costado izquierda. En Rx de tórax se evidencia derrame pleural izquierdo masivo, usted realiza toracocentesis y solicita

estudios complementarios. ¿Qué parámetros son necesarios para establecer los criterios de Light?

- A. Celularidad y diferencial del líquido pleural.
- B. ALT + fosfatasa alcalina del líquido pleural y del suero.
- C. Fosfatasa alcalina + proteínas del líquido pleural.
- D. LDH + proteínas del líquido pleural y del suero. 23.**

631. Un paciente varón de 32 años acude por presentar una masa en el cuello. La masa es indolora y se mueve verticalmente a la deglución. Una ecografía del cuello revela una masa de 2.6 cm en el lóbulo derecho, en la proximidad del istmo. La masa tiene microcalcificaciones, es hipoeecogénica y tiene bordes irregulares. Se realiza una citología tras una punción con aguja fina y reporta células atípicas, abundantes, con cuerpos de psamoma. ¿Cuál es el gen mutado que con más frecuencia induce este tumor a través de la vía de transducción de señales intracelulares P quinasa?

- A. L-MYC
- B. VHL
- C. BRAF**
- D. N-MYC

632. Paciente de 2 meses de edad, traído por su madre a emergencias por fiebre e irritabilidad de 5 días de evolución. La fiebre es de 39 grados centígrados, varios picos al día, de difícil control con antitérmicos, se acompaña de gran irritabilidad. Acudió a pediatría, quien prescribió acetaminofén alternado con Ibuprofeno, sin mejoría. Al examen físico signos vitales normales, paciente en regular estado general, irritable, fontanela anterior normotensa, no signos de focalización infecciosa. Exámenes: leucocitos 15.000/mm³, neutrófilos 70%, hemoglobina 11 gr/dl, plaquetas 200.000/mm³, proteína C reactiva 100 mg/L. elemental y microscópico de orina tomado por sonda vesical: leucocitos +++, nitritos positivos bacterias: bacilos gram negativos +++, urocultivo pendiente resultado. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente? Seleccione una:

- A. Hospitalizar sin antibióticos hasta recibir resultado de urocultivo.
- B. Hospitalizarlo con ceftriaxona intravenosa.**
- C. Observarlo 8 horas para decidir si se lo envía a casa u hospitaliza.
- D. Realizar punción vesical comprobar el diagnóstico y decidir conducta.

633. ¿Cuál es el conjugado que mide 10.5 cm de diámetro anteroposterior y corresponde a la distancia más reducida entre el promontorio y el pubis?

- A. Anatómico
- B. Diagonal
- C. Obstétrico**
- D. Verdadero

634. Se presenta el caso de un paciente de 52 años que acude a consulta por los seca y disnea de grandes esfuerzos. El paciente refiere que la tos comenzó hace poco más de cinco años, con un ligero aumento en los últimos seis meses, cuando apareció la disnea. Datos relevantes de la anamnesis incluyen antecedente de trabajo como minero informal durante 20 años y consumo de tabaco, una cajetilla por semana, desde hace 10 años. Al examen físico se evidencia T...3°C: TA: 115/80 mmHg: FC: 82 /min: FR: 18/min: Sat. O₂: 86% al aire ambiente. La auscultación pulmonar revela disminución del murmullo vesicular

en ambos lóbulos inferiores sin más hallazgos relevantes. Una radiografía tórax muestra opacidades lineales irregulares en ambas bases pulmonares y placas de engrosamiento pleural laterales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos sería más probable?

- A. Asbestosis
- B. Neumonitis por hipersensibilidad
- C. Bisinosis
- D. Antracosis

635. Una paciente femenina de 40 años acude a consulta por presentar ciclos menstruales prolongados de más de 10 días, cada 24 días y con flujo abundante con presencia de coágulos, desde hace 6 meses. En el examen físico presión arterial 110/70 mmHg. Frecuencia cardíaca 84 lpm. Abdomen suave depresible, no doloroso, no se palpan masas. Qué acrónimo utiliza para sistematizar el diagnóstico diferencial?

- A. FIGO
- B. ALSO
- C. AMPLIA
- D. PALM-COEIN

636. A la emergencia llega una mujer de 35 años cuyo historial no incluye enfermedades asociado a factores de riesgo de resistencia antimicrobiana: no fuma y se ejercita regularmente. Hace 96 horas presentó tos, escalofríos, sensación de malestar y taquicardia. Hace 48 horas presenta alza térmica, astenia, cefalea, tos productiva con expectoración que se torna mucopurulenta en las últimas 24 horas. Al examen físico, usted evidencia taquipnea, retracciones intercostales, aumento del frémito en base pulmonar derecha, con estertores crepitantes y matidez en la misma zona. La Rx de tórax muestra infiltrados neumónicos en base derecha sin derrame pleural. Usted ha diagnosticado una Neumonía extrahospitalaria y decide iniciar tratamiento antibiótico. Cual de las siguientes opciones es adecuada para el caso

- A. Iniciar tratamiento combinado con amoxicilina (1 g cada 8 h) + un macrólido o doxiciclina (100 mg cada 12 h)
- B. Iniciar administración de antibióticos con actividad contra anaerobios
- C. Macrólidos como tratamiento de primera línea si la prevalencia local de resistencia al neumococo es mayor al 75%
- D. Monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria.

637. Una gestante de 18 años acude a su primera consulta prenatal a las 15 semanas de embarazo. Refiere que su hermano tiene un cuadro de varicela y solicita información sobre prevención de esta enfermedad. Al momento está asintomática y al examen físico está afebril. ¿Cuál es la recomendación para la paciente acerca de las vacunas?

- A. Puede recibir vacunas con virus vivos atenuados.
- B. Si no ha sido vacunada contra varicela, se recomienda la vacuna después del parto
- C. Administrar la primera dosis antitetánica después de las 20 semanas.
- D. Si fuera seronegativa para rubéola se recomienda vacunar durante el embarazo.

638. Una paciente femenina de 16 años cursa un embarazo de 36.5 semanas según la ecografía del primer trimestre. Ingresa al hospital en expulsivo, parto céfalo vaginal. Se recibe un recién nacido masculino con llanto fuerte, frecuencia cardíaca 140 lpm. Apgar 9. Líquido amniótico de mal olor. Rotura de membranas de 21 horas. ¿Qué factores de riesgo para infección presenta el recién nacido?

- A. Madre adolescente.
- B. Líquido amniótico transparente con grumos.
- C. Parto céfalo vaginal, en expulsivo.
- D. Rotura de membranas de 21 horas.

639. Una paciente de 20 años acude por presentar visión borrosa desde hace varios años, visualiza dos contornos dobles y está sintom... se muestran alineados. ¿A que trastorno de la agudeza visual podría corresponder esta sintomatología?

- A. Estrabismo
- B. Miopía
- C. Hipermetropía
- D. Astigmatismo

640. Una paciente femenina de 29 años G2P1HV1, 36 semanas de gestación, antecedente decide realizar cesárea de emergencia debido a estado fetal no tranquilizador, tras: presentó frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, esfuerzo respiratorio lento, ir cianosis distal en extremidades. A los cinco minutos de vida presenta frecuencia cardíaca X, presenta cianosis distal en extremidades. En base al índice de APGAR cual es el puntaje del paciente?

- A. Índice de APGAR 5-7
- B. Índice de APGAR 8-9
- C. Índice de APGAR 8-8
- D. Índice de APGAR 7-9

641. Una paciente de 18 días de nacida a término por parto céfalo-vaginal con peso adecuado, aleteo nasal, vómito en número de 5. Al examen físico la RF de 65 rpm, rinorrea transparente ingreso a observación y se requiere hidratar a la paciente. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto?

- A. Diluir la concentración de orina.
- B. Producir hormona antidiurética.
- C. Evitar la hipocalcemia.
- D. Evitar la deshidratación.

642. Un hombre indigente de 52 años es llevado a la sala de emergencias por el ECU 911 por haberlo encontrado deambulando por el centro de la ciudad por presentar trastornos del estado mental, desorientación y aliento alcohólico. No se dispone de historial médico. Temperatura de 37° C (98.6° F), FC 106 lpm. FR 14/min y la presión arterial es de 92/67 mmHg. Se aprecia temblor de las muñecas al intentar la extensión. Se le canaliza vía y se administran líquidos intravenosos con Dextrosa al 5% con solución salina al medio y se le extrae muestras de sangre para realizar exámenes. Su estado empeora durante la noche. Al día siguiente, en la re examinación, presenta alteraciones visuales con nistagmo horizontal que no existía al inicio y tiene marcha tambaleante. Los resultados del laboratorio reportan: Tiempo de protrombina (INR) 1.3, Creatinina sérica 1.0 mg/dL, Alanina

aminotransferasa (ALT) 76 U/L, Aspartato aminotransferasa (AST) 10 OSU/L, Nivel de amoníaco en sangre 50 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Insuficiencia hepática aguda.
- B. Encefalopatía de Wernicke.**
- C. Encefalopatía hepática.
- D. Demencia relacionada con el alcohol.

643. Lactante de 8 meses con residencia en zona urbana y antecedentes de 4 días con rinitis y tos seca esporádica. Comienza con fiebre de 38°C que cede con medios físicos y taquipnea. Al examen físico: se encuentran escasos crepitantes y sibilantes en ambos campos pulmonares. La radiografía de tórax muestra tórax hiperinsuflado y presencia de infiltrado intersticial bilateral. El recuento de leucocitos es de 13 000 cel/mm³ con predominio de linfocitos, Sat. 02 95%. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta a seguir?

- A. Neumonía vírica - tratamiento sintomático y seguimiento en el hogar.**
- B. Neumonía vírica - ingreso hospitalario y vigilancia de complicaciones.
- C. Neumonía bacteriana - ingreso hospitalario y tratamiento antimicrobiano.
- D. Neumonía bacteriana - tratamiento con antimicrobianos y seguimiento en el hogar.

644. Un lactante recibió hoy la vacuna SRP o triple vírica. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra el espectro inmunológico?

- A. SARS, Rotavirus y poliovirus
- B. SARS, Retrovirus y paperas
- C. Sarampión, Rubéola y Paperas
- D. Sarampión, Rubéola y parotiditis**

645. Una paciente de 25 años de escasos recursos económicos acude a consulta por aparición de lesiones muy pruriginosas de predominio nocturno, localizadas en región abdomen. No refiere alza térmica. Al examen físico: en piel de abdomen y región genital se observan pequeñas pústulas urticariformes, lesiones de rascado y excoriaciones. Conoce qué hija y madre con las que convive presentan la misma sintomatología. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

- A. Eccema atópico
- B. Psoriasis
- C. Escabiosis**
- D. Liquen plano

646. Paciente de 28 años, O Rh positivo. En el primer control prenatal del embarazo actual se le solicitó exámenes de laboratorio y acude a nuevo control con los resultados. Al momento cuenta con 12 semanas de gestación. La biometría indica un valor de hemoglobina de 13 gramos por decilitro. Ante este resultado se decide prescribir diariamente suplemento de hierro más ácido fólico, ¿Cuál es la dosificación correcta de este suplemento en la gestante?

- A. 1 gramo de hierro base.
- B. Hierro parenteral.
- C. 40 millonarios de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico una vez al día.**
- D. 300 miligramos de hierro más ácido fólico 40 miligramos dos veces al día.

647. ¿Cuál es un factor de riesgo para presentar colecistitis aguda alitiásica?

- A. Áscaris en el colédoco
- B. Alcoholismo
- C. Nutrición parenteral prolongada
- D. Cálculos de pigmento biliar

648. Una paciente femenina de 12 años acude a un Centro de Salud con fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómito. Usted sospecha ... ureterales positivos y dolor a puño percusión. Solicita un examen elemental y microscópico de orina. Cual es el estudio.....?

- A. Cistografía isotópica
- B. Ecografía renal
- C. Gammagrafía con ácido climercaptosuccínico (DMSA)
- D. Cistouretrografía miccional con bario

649. Usted se encuentra de guardia en la sala de partos. Un recién nacido se le presenta con palidez, respiración irregular y bradicardia; después de los pasos iniciales de la reanimación (calentar, reposicionar, secar, estimular y aspirar secreciones), la frecuencia cardíaca sigue siendo inferior a 100 / min. De lo siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente en el manejo?

- A. Masaje cardíaco externo
- B. Epinefrina intravenosa
- C. Intubación endotraqueal
- D. Ventilación a presión positiva con 100% de O₂

650. Una paciente femenina de 35 años acude a emergencia con Cefalea Intensa desde hace 4 días localizada en región frontal que se irradia hasta amarillenta, es tratada como crisis de migraña con analgesia a base de ergotamina y cafeína, sin obtener mejoría. Como antecedente la paciente.. días . Al examen físico: temperatura 38° C FC 90 lpm, saturación 95% al aire ambiente, dolor a la presión facial a nivel frontal y maxilar, orofaringe... aparente patología, a la rinoscopia se aprecia abundante secreción mucopurulenta que impide visualizar meato ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

- A. Inflamación temporomandibular
- B. Sinusitis Aguda
- C. Neuropatía del trigémino
- D. Rinitis Alérgica

651. Un paciente masculino de 45 años, acude a la sala de emergencia de un hospital básico, en el interrogatorio manifiesta que tiene planes concretos sobre hacerse daño y acabar con su vida, en una ocasión tuvo un intento autolítico con cortes en su muñeca izquierda, expresa desesperanza, rechaza apoyo social y no rectifica sus ideaciones suicidas. En la historia clínica se registra que el paciente tiene antecedentes familiares de conducta suicida, alcoholismo, divorciado, vive solo. De acuerdo con la clasificación de riesgo suicida ¿Cuál es el diagnóstico correcto en este paciente?

- A. Riesgo suicida grave
- B. Riesgo suicida moderado
- C. Riesgo suicida leve
- D. Riesgo suicida extremo

652. Paciente femenina de 3 años, acude a la unidad de salud con tos que moviliza secreciones, alza térmica, traje intercostal y taquipnea, ambos campos pulmonares y la frecuencia respiratoria está elevada. ¿En qué cifras espera usted encontrar las respiraciones por minuto :

- A. Frecuencia respiratoria: 20 o más veces por minuto.
- B. Frecuencia respiratoria: 30 o más veces por minuto.
- C. Frecuencia respiratoria: 40 o más veces por minuto.**
- D. Frecuencia respiratoria: 16 o más veces por minuto.

653. Una paciente femenina de 21 años, sin antecedente de importancia que acude por lesiones dérmicas en la cara. Usted encuentra comedones abundantes y algunas pápulas eritematosas, algo dolorosas, diseminadas en frente, nariz, mejillas. En estas condiciones, junto con recomendaciones higiénicas, podrían indicarse algunos fármacos. ¿Cuál NO está indicado?

- A. Peróxido de benzoilo
- B. Ácido Salicílico
- C. Isotretinoína Oral**
- D. Ácido Retinoico

654. Una paciente femenina de 30 años acude a sala de urgencias por dolor abdominal en cuadrante inferior derecho. En el interrogatorio la paciente refiere que hace 24 horas presentó un dolor abdominal en región de epigastrio, de carácter continuo, tipo cólico y de intensidad de 5/10 que migra a región periumbilical y se vuelve más agudo. El cuadro se acompaña de anorexia y cuatro vómitos de contenido alimenticio. Al examen físico abdomen suave depresible, con sensibilidad a la palpación en cuadrante inferior derecho, dolor a la movilización de cuello uterino. A los exámenes de laboratorio leucocitos 14000, neutrófilos 95%, linfocitos 22%, PCR 34 mg/d, examen de orina con presencia de bacterias (+) ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente?

- A. Embarazo ectópico
- B. Enfermedad inflamatoria pélvica
- C. Apendicitis Aguda**
- D. Diverticulitis

655. Mujer de ... años, refiere pérdida inexplicable de peso, polidipsia y poliuria, sin otros síntomas acompañantes. Según las guías de práctica clínica del MSP del Ecuador ¿Cuál es un criterio diagnóstico para DM II?

- A. Glucemia casual en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl**
- B. Glucemia en ayuda medida en plasma igual o mayor a 110 mg/dl
- C. Glucemia en plasma después de carga oral de glucosa igual o mayor a 126 mg/dl
- D. Hemoglobina Glicosilada Alc (HbA1c) mayor a 5.6%

656. Una mujer de 46 años acude a Emergencia por presentar un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen. La paciente Biliares por cuanto ha sido evaluada por ultrasonido en dos ocasiones sin que se modifique el dolor. Los signos vitales muestran T:37.8, FC 92 lpm TA:130/80 mmHg FR 18 lpm. ... El abdomen muestra cálculos en la vesícula, líquida alrededor de la misma y un grosor de la pared de 9 milímetros. ¿Cuál de los siguientes signos es el presentaría en el examen físico del abdomen?

Psoas
Rovsing
Blumberg
Murphy

657. Paciente femenina de un mes de edad cronológica, nacida a las 35 semanas de edad gestacional, con bajo peso para la edad gestacional y al nacimiento, acude por presentar bajo peso para su edad, palidez, hipoactividad y no quiere tomar el seno. Al examen físico se evidencia palidez generalizada en piel y mucosas, taquicardia, taquipnea. Los exámenes de laboratorio reflejan hemoglobina de 8 gr/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A. Anemia de la prematuridad.**
- B. Hemorragia transplacentaria.
- C. Enfermedad hemolítica del recién nacido.
- D. Pinzamiento tardío del cordón

658. Mujer de 27 años, soltera, gesta 0, con múltiples parejas sexuales, algunas de ellas ocasionales. Acude a su consulta porque desea cambiar el preservativo anticonceptivo ya que ha escuchado de su eficacia baja. ¿Cuál de los siguientes métodos está contraindicado por la posibilidad de infección pélvica?

- A. Hormonales combinados inyectables.
- B. Anticonceptivos orales combinados.
- C. Implante subdérmico con progestágeno.
- D. Dispositivo intrauterino con cobre.**

659. Cual es un factor de riesgo para presentar colecistitis aguda alitiásica?

- A. Ascaris en el colédoco
- B. Alcoholismo
- C. Nutrición parenteral prolongado**
- D. Cálculos de pigmento biliar

660. Una paciente femenina de 51 años, secretaria de profesión, acude por presentar desde hace 4 meses dolor y parestesias a nivel de dedos pulgar, índice derechos, con irradiación a mano y en ocasiones al antebrazo ipsilateral, Además, refiere que de manera frecuente se le caen los objetos de las manos, esta sintomatología aumenta mientras labora en la computadora. Ha sido tratada con antiinflamatorios sin obtener mejoría. Al examen físico se observa signo de Tinel positivo, signo de Phalen positivo. Cual es la sospecha diagnóstica y que estudio requiere para confirmar la misma?

- A. Síndrome de tunel carpiano, electromiografía**
- B. Síndrome de tunel ulnar
- C. Enfermedad de Quervain, radiografía
- D. Tenosinovitis estenosante dedo en gatillo, radiografía

661. Paciente de 20 años femenina, acude al centro de salud, por presentar corte a nivel de región frontal derecha de 3 centímetros de longitud, debido a golpe contuso contra una superficie de metal. Como antecedente se observa cicatriz queloidea e hipertrófica en hombro derecho (vacuna BCG)-Requiere sutura. ¿Qué medidas usaría para prevenir este tipo de cicatrización por la sutura previa?

- A. Eliminación de la tensión, lociones de hidratación.**

- B. Braquiterapia con iridio 192.
- C. Uso de tensión perpendicular a las líneas de Langer.
- D. Corticoide intralesional preventivo.

662. Acude a la emergencia un varón de 34 años, bebedor ocasional, con antecedente de gastritis por H.Pylori, tratada en dos ocasiones. La última endoscopia fue hace 10 meses. Refiere que tiene accesos de tos desde hace 3 días que la describe entre moderada e intensa, llegando en dos ocasiones a producirle náusea. Hace 48 horas, tuvo una ingesta significativa de alcohol, la cual le ha ocasionado pirosis y náusea. Hace 24 horas, tras un acceso de tos intensa, presentó un vómito sanguinolento, acompañado de dolor retroesternal y epigástrico moderado. Hasta el momento de su ingreso ha presentado cinco vómitos más, todos "con sangre roja" y dos melenas. Al examen físico, se presenta obnubilado, su TA es de 98/62, su pulso está en 138 latidos/minuto, con 24 respiraciones/minuto. Presenta signos de irritación de la garganta. La exploración torácica no revela signos patológicos, no así el abdomen, que presenta dolor durante la palpación superficial y profunda de la región meso y epigástrica. Considerando la información del caso, usted diagnostica una hemorragia digestiva alta por un desgarro de Mallory-Weiss. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A. Solicitar una colonoscopia para determinar el origen de las melenas.
- B. Por su alteración hemodinámica, es necesario una cirugía urgente.
- C. Realizar inmediatamente un aspirado gástrico y lavados con suero frío.
- D. Se recomienda una endoscopia digestiva para colocación de clips.

663. Un paciente masculino de 23 años acude a hospital básico por presentar caída hace 30 minutos mientras montaba caballo, con impacto lateral izquierdo, refiere dolor, impotencia funcional y deformidad de hombro izquierdo. En el examen físico se encuentra asimetría y signo de la charretera (aplanamiento de la redondez del hombro y prominencia del acromion). El brazo se encuentra levemente abducido y rotado internamente. Se palpa la cabeza humeral y la región subacromial se encuentra vacía. La radiografía muestra luxación anterior glenohumeral. ¿Cuál es la recomendación terapéutica para este paciente?

- A. Referencia a hospital de mayor nivel.
- B. Inmovilización con cabestrillo.
- C. Inmovilización con yeso abierto.
- D. Reducción bajo analgesia en emergencia.

664. Una paciente de 12 años sin antecedentes patológicos importantes consulta a su pediatra por fiebre y dolor articular. En el interrogatorio su madre refiere como antecedente hace dos semanas tuvo un cuadro de amigdalitis estreptocócica tratado con Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 3 dosis, sin ciclo completo. El día de hoy acude por cuadro de 72 horas de evolución de cefalea frontoparietal que progresa con dolor articular y malestar general, hace 24 horas tiene fiebre. En el examen físico la temperatura es de 38.5° con dolor articular en rodillas y tobillos, se evidencia presencia de eritema marginado en extremidades superiores e inferiores, a la auscultación cardíaca presencia de soplo cardíaco. En los análisis de laboratorio se evidencia PCR elevada y velocidad de eritrosedimentación elevada, estudio de ecocardiograma con presencia de estenosis de válvula mitral.

- A. Mononucleosis infecciosa
- B. Fiebre reumática

- C. Artritis reumatoide juvenil
- D. Infección por Sars cov2

665. Paciente masculino de 50 años, al momento acude por cuadro de tos que moviliza flema en moderada cantidad de aproximadamente 3 meses de duración, como antecedente de importancia presente Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina, el paciente refiere que vive en una casa pequeña de dos habitaciones (cuarto y baño) con 5 familiares, adicional refiere que uno de sus familiares, se encuentra en tratamiento por Tuberculosis. Al examen físico evidencia frecuencia cardíaca de 100 lpm, saturación en 89%, tensión arterial en 130/90 mmHg, auscultación cardíaca sin alteraciones, auscultación pulmonar con murmullo vesicular disminuido, de predominio derecho. Con base en la revisión de la literatura usted tiene una fuerte sospecha que su cuadro es tuberculosis, debido a una exposición al bacilo de la Tuberculosis. En base a los criterios de causalidad ¿Cuál criterio hace referencia a la asociación de factores, es decir, hay una probable relación entre un agente causal y una probable enfermedad (Exposición al bacilo de la tuberculosis invade a la persona y causa la tuberculosis)

- A. Verosimilitud
- B. Reversibilidad
- C. Relación dosis - respuesta
- D. Relación temporal

666. Señale los signos y síntomas que pertenezcan a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en paciente pediátrico

- 1. Disfagia
- 2. Artralgia
- 3. Regurgitación recurrente con o sin vómito
- 4. Pérdida o escasa ganancia de peso

- A. 1,2,4
- B. 1,3,4
- C. 2,3,4
- D. 1,2,3 .

667. Mujer de 20 años acude a su consulta por cefalea de 4 meses de evolución. El dolor se exacerba previa a su menstruación. Dice que ... cefaleas parecidas desde la adolescencia hasta la menopausia. Le preocupa el dolor porque a un primo suyo, quien tuvo cefaleas recientemente un tumor cerebral, por lo que ella le solicita una TC o una RMN para descartar este diagnóstico. Al indagar, comenta, visual del dolor, de carácter pulsátil, localización temporal derecha a veces izquierda que se generaliza a las pocas horas, perdiendo intensidad. Se acompaña de fotofobia, sonofobia y náuseas que llevan en ocasiones al vómito con lo que cede parcialmente, se presenta a intervalos de 7 y 15 días. No comenta progresión del dolor u otros síntomas relacionados como fiebre, parestesias, pérdida de la marcha y sensorio. No comenta trauma craneano o ingesta crónica de analgésicos. Al momento del examen físico. La paciente ha solicitado estudios de imagen. ¿Cuál debe ser su decisión en función del cuadro señalado?

- A. Solicitar la TC con base en las características del dolor: bilateral, generalizado acompañado de náusea y vómito.
- B. Solicitar la TC con base en la edad y sexo de la paciente, además es un cuadro de 4 meses con exacerbaciones previo a la r

- C. Solicitar la IC con base en el antecedente de cuadros similares en su madre y primo, además refiere a un especialista.
- D. Explicar a la paciente que se trata de una migraña común y que no requiere estudios de imágenes.

668. Un paciente de 65 años acude a control con resultados de exámenes solicitados en consulta previa ya que había Aumento de la ingesta de líquidos y aumento de las veces que va al baño a orinar. En la historia clínica se detalla Un adenocarcinoma de páncreas. Cual de las siguientes situaciones define adecuadamente la relación entre días..

- A. La diabetes no guarda relación con el cáncer pancreático
- B. En la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas la diabetes se instaura cuando aparece la ictericia
- C. La diabetes está presente en un tercio de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y en muchos de ello es de instauración reciente
- D. Los pacientes con diabetes de larga evolución tienen un riesgo superior al 50% de desarrollar cáncer de páncreas

669. Paciente de 32 años, casada. Después de seis años de matrimonio y sin método anticonceptivo no ha podido conseguir embarazo y refiere desde los 20 años intenso dolor durante la menstruación y dispareunias. Desde hace un año el dolor es permanente en la región pélvica y se intensifica durante los días de sangrado del ciclo menstrual. Los familiares tienen que acudir hoy al sitio de trabajo de la paciente ya que se encuentra en su tercer día de sangrado, pero el dolor ha sido tan intenso que lo ha llevado a lipotimia. Es llevada a la sala de urgencias. Al examen se aprecia una facie lúcida y muy álgida. Los signos vitales son estables y el sistema cardiopulmonar es normal. Al interrogatorio indica que una secreción achocolatado sempte precede al sangrado. El examen especula revela sangrado menstrual en poca cantidad y al examen bimanual del útero y los anexos se encuentran dentro de parámetros normales. ¿Qué presunción diagnóstica tiene en este caso de dolor pélvico crónico?

- A. Adenomiosis
- B. Dismenorrea primaria
- C. Enfermedad pélvica inflamatoria
- D. Endometriosis

670. Mujer de 24 años acude al Centro de Salud del centro histórico multigesta con contracciones de aproximadamente un minuto de duración y antecedentes de preeclampsia. Al interrogatorio revela que tuvo tratamiento profiláctico con Ácido Acetil salicílico, Al examen físico se encuentra dilatada 10 cm. Por lo que se la prepara para ingreso a la Unidad de trabajo de parto y recuperación (UIPR). Durante el parto la madre presentó fluctuaciones significativas de la presión arterial. por lo que se empieza a tramitar la transferencia: Con el fin de salvar la vida de la madre, es aceptada en el Hospital gineco-obstétrico. A qué nivel de atención pertenece esta unidad hospitalaria

- A. Cuarto nivel de atención
- B. Segundo nivel de atención
- C. Atención prehospitalaria
- D. Tercer nivel de atención

671. Es usted responsable de la gerencia de una maternidad en la sierra centro, en la que busca gestionar recursos ¿Cuál estrategia permite la optimización de la vacuna BCG en recién nacido?

- A. Vacunar a todos los niños dentro de las primeras 24 horas de nacidos o al primer contacto del niño/a con los servicios de salud, hasta los 11 meses 29 días de edad.
- B. Para gestionar recursos no se implementa la vacuna BCG ya que se reserva para población con formas graves como Tb meníngea y miliar.
- C. Utilizar la vacuna únicamente en hijos de madres seropositivas para VIH, que hayan tenido exposición perinatal.
- D. En lugar de vacunación, se recomienda iniciar tratamiento antituberculoso con medicamentos en presencia de sintomatología.

672. Una mujer de 46 años acude a la emergencia por presentar un cuadro de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen: La paciente conoce que tiene cálculos biliares por cuanto ha sido evaluada por ultrasonido en dos ocasiones anteriores en el último año por dolores cólicos en el hipocondrio derecho. Esta vez el dolor es continuo y se ha acompañado de vómito por dos ocasiones sin que se modifique el dolor. Los signos vitales muestran T: 37,8° C. FC, 92 lpm; TA:130/80 mm Hg: FR: 18 mp. Un ultrasonido del abdomen muestra cálculos en la vesícula, líquido alrededor de la misma y un grosor de la pared de 9 milímetros. ¿Cuál de los siguientes signos es el más típico que esta paciente presentaba en el examen físico del abdomen?

- A. Murphy.
- B. Psoas
- C. Blumberg.
- D. Rovsing 7

673. Un paciente de sexo masculino de 20 años sin antecedentes patológicos de importancia, acude al servicio de emergencia. Refiere que hace un mes terminó la relación con su novia, dice tener él toda la culpa y que sin ella no puede vivir. Dos horas antes del ingreso fue sorprendido por su madre tratando de cortarse las venas de las muñecas. No ingiere alcohol, drogas ni medicación. Al examen físico no presenta lesiones o daños físicos, se puede concluir que es normal. Según el triage de Manchester ¿qué prioridad de atención tiene este paciente?

- A. Prioridad 4
- B. Prioridad 3
- C. Prioridad 1
- D. Prioridad 2

674. Una paciente de 30 años con antecedentes ginecobstétricos: menarquia a los 12 años, gestas 3, partos 3, abortos 0, hijos vivos 3, número de parejas sexuales 8, refiere que nunca se ha realizado una PAP Test. Usted le indica los beneficios de una detección de lesiones intraepiteliales de cérvix y la paciente le pregunta sobre las recomendaciones previas o la toma de la muestra para PAP Test. ¿Cuál de las siguientes instrucciones mejoran la calidad de la muestra?

- A. Usar duchas vaginales en las 48 horas previas
- B. Realizar una toma de muestra durante el curso de infecciones vaginales importantes
- C. Evitar la toma durante el periodo menstrual

D. Fomentar las relaciones sexuales durante las 24 horas previas a la toma de muestra

675. Mujer de 30 años acude a consulta de medicina interna por edema en piernas y cara. En el interrogatorio la paciente comenta que presentó una infección de la garganta y que fue tratada con azitromicina 500 mg una vez al día por 3 días, hace aproximadamente 72 horas. Miembros inferiores y en cara que se acompaña de disminución de la cantidad de orina. Al examen físico se observan valores, edema generalizado en cara y miembros inferiores ++/+++. Exámenes de laboratorio con creatinina de 1.2 mg/dl, urea 38 mg/dl, examen de orina muestran células inflamatorias en sedimento urinario: ¿Cuál es el diagnóstico más probable para esta paciente?

- A. Nefritis por crioglobulinemia
- B. Glomerulonefritis postinfecciosa.**
- C. Nefropatía por IgA.
- D. Nefropatía por anticuerpos anti membrana basal glomerular.

676. Una mujer de 25 años con un embarazo de 39.2 semanas acude al centro con actividad uterina de 4 contracciones en 10 minutos. Pasa a la unidad de trabajo de parto. Al examen físico: normal TV borrada 90%, dilatada 9cm. Frecuencia cardíaca fetal: 150 lpm. Nace con APGAR 8/9. De acuerdo con la guía de práctica clínica del MSP. Cual de las siguientes acciones se contempla en la fase inmediata de recepción de este recién nacido?

- A. Medición inmediata del peso, talla y perímetro cefálico
- B. Baño inmediato del recién nacido
- C. Lactancia materna a las 2 horas de vida
- D. Apego precoz y contacto piel con piel**

677. Un paciente masculino de 4 días de nacido a término con peso adecuado al nacimiento acude al centro de salud para realizar.... Al examen físico se encuentra normal con el peso adecuado para la edad y activo. ¿Cuál de las siguientes afecciones se excluyen del procedimiento?

- A. Fenilcetonuria.
- B. Neurofibromatosis.**
- C. Hipotiroidismo congénito
- D. Galactosemia

678. Paciente varón de 44 años acude a la emergencia por cuadro de dolor abdominal intenso que se acompaña por cuadro de dolor abdominal inició hace 72 horas, posterior a la ingesta de comida grasa, el mismo que...izquierda, por el cuadro de dolor el paciente se administra paracetamol de 1g y enzimas digestivo temperatura de 38° C, con presencia de dolor a la palpación profunda en epigastrio, mesogastrio y fla... leucocitos 16 000, neutrófilos 85%, Linfocitos 25%, amilasa 500 UI/L. lipasa 700 UI/L. por lo que sospecha de diagnóstico, ¿Cuál es el mejor método diagnóstico por imagen para este paciente?

- A. Ecografía abdominal
- B. Colangiopancreatografía por resonancia magnética.
- C. Tomografía de abdomen contrastada.**
- D. Radiografía simple de abdomen.

679. Un paciente masculino de 60 años con antecedentes de cirugía abdominal previa hace siete meses..intenso y vómito. En el interrogatorio refiere dolor abdominal difuso desde hace 24 horas que se aco... Se observa sensibilidad difusa a la palpación profunda en mesogastrio sin masas identificables... disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este paciente

- A. Hernia encarcerada
- B. Obstrucción intestinal funcional (íleo)
- C. Obstrucción intestinal mecánico**
- D. Isquemia mesentérica

670. Una paciente joven sin antecedentes de importancia. Vive en zona tropical selvática y acude por presentar una lesión en la piel de insecto. Desde hace un par de meses, la pápula tomó color violeta, tiende a crecer y a ulcerarse. Al examen físico tiene una lesión ... eritematoso, de unos 6 cm de diámetro, cubierta de una capa escamosa y en el centro tiene una costra redondeada de 4 cm de ... encuentra macrófagos y escasos microorganismos en forma de amastigotes Leishmaniasis. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado para esta lesión

- A. Estreptomicina
- B. Ivermectina
- C. Ceftriaxona
- D. Antimonio pentavalente**

671. Varón de 45 años, hipertenso tratado con Valsartán 160 mg/día. Refiere que hace 2 horas mientras se encontraba en almuerzo familiar presenta aspiración involuntaria de contenido gástrico, inmediatamente de lo cual presenta agitación y sensación de falta de aire, por lo que acude a emergencias. Al examen físico se encuentra una tensión arterial de 145/90, FC 105 lpm y FR 35 rpm. Exámenes complementarios: gasometría pH 7.50 y PaCO₂ 25 mmHg, radiografía de tórax se evidencia infiltrados intersticiales bilaterales de predominio basal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente?

- A. Tromboembolia pulmonar.
- B. Acidosis respiratoria.
- C. Dístres respiratorio agudo.**
- D. Edema pulmonar cardiogénico

672. Un paciente masculino de 66 años acude a consulta y refiere coma antecedente patológicos personales: diabetes diagnosticada desde ... metformina 500 mg diarias, hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años en tratamiento con Losartán 50 mg diarias. Refiere que hace 2 días Cefalea holocraneana de moderada intensidad que cede con la ingesta de paracetamol 1 gramo. Al examen físico: frecuencia respiratoria ... frecuencia cardíaca 82 latidos por minuto, ruidos normales, tensión arterial 160/100 (farmacia según protocolo), resta de examen sin alteración ... en ayunas 94 mg/dl, colesterol total 180 mg/dl, triglicéridos 150 mg/dl, HDL 50 mg/dl, LDL 100 mg/dl. Examen de orina normal. ¿Qué grado de hipertensión presenta el paciente?

- A. Hipertensión grado dos**
- B. Hipertensión grado tres
- C. Normal alta
- D. Hipertensión grado uno

673. En la referente a las demencias de tipo vascular, las manifestaciones clínicas para sospechar esta etiología es:

- A. Presencia precoz de deterioro de la función ejecutiva
- B. Reducido nivel de comprensión del lenguaje
- C. Afección cortical y del sistema límbico
- D. Afectación del sistema nervioso autónomo

674. Formularios para llenar paciente que entra por emergencia para labor de parto de urgencia en cual se llena

- A. 053
- B. 008
- C. 051
- D. 056

674. Una paciente femenina de 32 años acude a centro de salud solicitando ayuda, debido a que hace dos semanas tuvo relación sexual sin protección y se acaba de enterar que la pareja está diagnosticada como portadora de VIH. La paciente está angustiada, G1, PI. AO, se ha hecho una prueba de embarazo que dio negativa, no refiere molestias. En el examen físico, normotensa, afebril, cardiopulmonar y abdomen sin patología aparente. El médico solicitó una prueba inmunológica para diagnóstico de VIH que dio negativa. ¿Cuántas pruebas diagnósticas adicionales debe realizarse y en qué tiempo para descartar ser portadora de VIH?

- A. 4 pruebas de VIH, a las 6-12 semanas y a los 6, 9 y 12 meses post exposición para descartar seroconversión.
- B. 2 pruebas diagnósticas de VIH, a los 3 y 6 meses post exposición para descartar seroconversión.
- C. 1 prueba de VIH a los 6 meses post exposición para descartar seroconversión.
- D. 3 pruebas diagnósticas de VIH, a las 4-6 semanas y a los 3 y 6 meses post exposición para descartar seroconversión.

675. Paciente masculino de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial hace 20 años manejado con losartan 50 mg y obesidad acude por presentar dolor torácico tipo opresivo, intenso EVA 8/10 con una duración de 4 horas, se acompaña de diaforesis, náuseas, hoy presencia de taquicardia ¿Cual es el primer examen diagnóstico que debe solicitar?

- A. Ecocardiografía doppler
- B. Electrocardiograma
- C. Ecocardiograma
- D. Prueba de esfuerzo electrocardiográfico

676. Un paciente masculino de 17 años del que no se conocen antecedentes es traído por personal de ambulancia a emergencia con signos de dificultad respiratoria y sensación de ahogo. El paramédico refiere que el paciente es víctima de violencia civil, fue encontrado golpeado con varios estigmas de sangrado. Al examen físico, el paciente combativo, taquipneico con frecuencia respiratoria de 22 por minuto, frecuencia cardíaca 130 latidos por minuto y presión arterial de 80/50 mmHg, desaturando 70%: se evidencia desviación de la tráquea al lado derecho, en auscultación pulmonar ruidos pulmonares abolidos en pulmón izquierdo, patrón respiratorio alterado con retracciones subcostales. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?

- A. Hemotórax simple.
- B. Neumotórax a tensión.**
- C. Contusión pulmonar.
- D. Taponamiento cardiaco.

677. Mujer primigenia de 23 años se encuentra en puerperio mediato de un parto por cesárea complicado con hemorragia -, mamas secretantes, abdomen suave depresible, utero contraído, loquios hemáticos escasos. Después de recibir la antibiótico terapia, desea anticoncepción hormonal. ¿Qué método anticonceptivo es el recomendable en este caso?

- A. Esterilización quirúrgica
- B. Anticonceptivos orales combinados
- C. Anticonceptivos inyectables combinados
- D. Anticonceptivos de progesterona solo**

678. Mujer de 28 años, primigenia, tiene 23 semanas de embarazo. Acude a control prenatal, sin signos de alarma obstétrica, consulta por presentar nodulaciones en mamas hace una semana, no son dolorosos. Al examen físico SCORE MAMA 0, buena ganancia de peso, en glándulas mamarias se observan varias elevaciones pequeñas dispersas en cada areola sin signos de infección. Que nombre reciben estos hallazgos mamarios?

- A. Fibroadenomas
- B. Glandulas de Montgomery**
- C. Gigantomastia
- D. Glandulas supernumerarias

679. Mujer de 40 años durante la visita domiciliaria refiere relaciones familiares conflictivas, hay una sola persona que trabaja ocasionalmente y los ingresos económicos no les permiten sustentar todos los gastos. ¿Qué tipo de determinante se menciona en el enunciado?

- A. Biológicos.
- B. Ambientales
- C. Conductuales.
- D. Sociales**

680. Paciente masculino de 24 años, interno rotativo de medicina tras una guardia nocturna hospitalaria con alta demanda de labores asistenciales y poca hidratación, a la mañana siguiente presenta mareo e inmediatamente pierde la conciencia por diez segundos y se recupera completamente. Lo examinan inmediatamente luego del evento con FC de 80 lpm. presión arterial 100/70 mmHg, sin ortostatismo, auscultación cardiopulmonar normal, el examen neurológico elemental es normal. Le realizan un hemoglucotest que reporta glucemia capilar de 100 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico inicial de este paciente?

- A. Hipoglicemia
- B. Sincope**
- C. Infarto cerebral
- D. Crisis convulsivas tónico clónicas

681. En el Hospital Gineco obstétrico Nueva Aurora se requiere realizar una investigación acerca de la leche materna de una paciente femenina de 24 años que perdió a su hijo por una sepsis neonatal y que desea donar leche materna para un bebé que fue abandonado en la sala donde se encontraba su hijo. Por lo que se envía al CEISH del Hospital de Solca de Quito, para obtener la aprobación. El CEISH evalúa el balance de los riesgos y beneficios potenciales implicados en cada investigación como parte de sus obligaciones éticas. Qué tipo de riesgo califica el CESH a la investigación propuesta

- A. Investigación de muestras biológicas anonimizadas.
- B. Investigación sin riesgo.
- C. Investigación de riesgo mínimo.
- D. Investigación de riesgo mayor al mínimo.**

682. Paciente femenina de 40 años cursa 36 semanas de gestación. Antecedentes ginecobstétricos Gestas 2 Cesáreas X Abortos X, desde hace cuatro horas, rojo rutilante poca cantidad, indoloro. Al examen físico la presión arterial es 110/70 mmHg, se evidencia flujo turbulento con áreas anormales de hipervascularidad con vasos sanguíneos dilatados en la interfa?? Probable de la hemorragia del tercer trimestre de esta paciente?

- A. Amenaza de parto prematuro
- B. Desprendimiento prematuro de la placenta
- C. Inserción velamentosa del cordón umbilical
- D. Placenta previa previa total acreta**

683. ¿Qué órganos genitales femeninos se valoran primero en el examen de Papanicolau?

- A. Ovario
- B. Vulva**
- C. Trompa ute
- D. Utero

684. ¿Qué métodos de educación para la salud es unidireccional?

- A. Entrevista
- B. Exposicion
- C. Conferencia
- D. Prensa**

685. En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

- A. Citostáticos, cloranfenicol, litio.**
- B. Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- C. Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- D. Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

686. Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado . ¿ que teorizante utiliza para la planificacion de los cuidados de este paciente

- A. Dorothea Orem**
- B. Hidegard Peplau

- C. Florence Nigtingale
- D. Virginia Henderson

687. Paciente de 78 años, acude al centro de salud, con antecedentes de artritis reumática diagnosticada hace 5 años, refiere intenso dolor en manos. Al examen físico paciente presenta edema a nivel de falanges, eritema, aumento de la temperatura corporal y limitación en la articulación de manos. Por prescripción médica la enfermera administra Tramadol 100 mg y metoclopramida 10 mg, y se recomienda a la paciente continuar con las prescripciones médicas indicadas. ¿De acuerdo a la evidencia cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente?

- A. Uso de técnicas de neuromodulación o métodos ablativos como la estimulación nerviosa transcutánea.
- B. Uso de Antiinflamatorios no esteroides (AINES) corticoides.**
- C. El uso de opioides débiles, inyectar ácido hialurónico en la articulaciones o plasma rico en plaquetas.
- D. Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa

688. En el puerperio encontramos diferentes subclasificaciones. ¿A qué etapa corresponde el tiempo que comprende desde el segundo día del nacimiento hasta los 10 días de postparto?

- A. Puerperio mediato.**
- B. Puerperio inmediato
- C. Puerperio normal.
- D. Puerperio tardío

689. En algunas ocasiones se debe suspender la lactancia materna exclusiva e incluso se debe promover la alimentación artificial, como en el caso de que la madre tome algunos fármacos, por las consecuencias que pueden derivarse para el niño. ¿Qué fármacos están contraindicados en la lactancia materna?

- A. Citostáticos, cloranfenicol, litio.**
- B. Paracetamol, Naproxeno, Piroxicam.
- C. Enalapril, Nifedipina, Hidralazina.
- D. Tetraciclina, Eritromicina, Azitromicina.

690. Paciente adulto que por su estado de salud no puede suplir sus necesidades de autocuidado. ¿que teorizante utiliza para la planificación de los cuidados de este paciente?

- A. Dorothea Orem**
- B. Hidegard Peplau
- C. Florence Nigtingale
- D. Virginia Henderson

691. Paciente primigesta de 16 años, tuvo un parto céfalo vaginal sin complicaciones, dando un recién nacido de 2700 gr de peso, talla 50 cm, perímetro cefálico 33 cm, perímetro braquial 9 cm y perímetro torácico 31 cm. La madre tiene mamas secretantes agrietadas, con pezones evertidos y siente mucho dolor al dar el seno. ¿Cuál es la técnica de agarre recomendada por el MSP para un correcto amamantamiento?

- A. La boca del recién nacido está bien abierta, el labio inferior está evertido, el mentón está tocando el pecho, areola y pezón dentro de la boca.
- B. La boca del recién nacido está bien abierta, el labio superior está evertido, el mentón está tocando o el pecho, areola dentro de la boca.
- C. La boca del recién nacido está abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, pezón dentro de la boca.
- D. La boca del recién nacido está semi abierta, el labio inferior está invertido, el mentón está tocando el pecho, areola dentro de la boca.

692. La tercera etapa del trabajo del parto (alumbramiento). Usted como profesional de enfermería es conocedor de las normas del MSP. ¿Cuál de las siguientes actividades se debe realizar para cumplir con los pasos del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto?

- A. Administración de 10UI de oxitocina IM stat, tracción controlada del cordón, con contra tracción (presión suave) del fondo uterino y masaje uterino después de la liberación de la placenta.
- B. Tracción controlada del cordón umbilical y masaje uterino.
- C. Administración de 10UI de oxitocina IM stat, tracción controlada del fondo uterino.
- D. Administración de 20 UI de oxitocina IM stat y tracción controlada del cordón

693. Relacione las complicaciones de las km intervenciones coronarias percutáneas con las acciones de enfermería

COMPLICACIONES	ACCIONES DE ENFERMERÍA
1.isquemia del miocardio	A. Suspender el anticoagulante y notificar
2.- hemorragia y formación de hematoma	B. Aportar hidratación adecuada
3.- insuficiencia renal aguda	C.aplicar compresión manual
4.- hematoma retroperitoneal	D. Administrar oxígeno y nitroglicerina

- A. 1a-2b-3d-4c
- B. 1a-3b-2d-4c
- C. 2a-4b-1d-3c
- D. 2a-3b-1d-4c

694. Un paciente masculino de 28 años, acude a consulta externa por presentar desde hace tres días, distagia y odinofagia acompañada desde hace 24 horas de fiebre y escalofrío. A la exploración física presenta orofaringe hiperémica, amígdalas aumentadas de tamaño con criptas pustulosas bilateralmente; inmediatamente facultativo toma una muestra y envía para cultivo y antibiograma, en el examen de laboratorio demuestra crecimiento Streptococcus pyogenes, sensible penicilina y ciprofloxacina, el médico prescribe penicilina procaínica y benzatínica intramuscular, pese al deseo del paciente de no querer recibir medicamento con ese tipo de vía de administración, estableciendo que es mejor para él y su bienestar este procedimiento. ¿Qué relación clínica se establece en este caso?

A. Paternalistas

B. interpretativo

C. deliberativo

D. informativo

695. ¿Cuáles son las características de la comunicación terapéutica en el entorno quirúrgico?

A. Está dirigida a un objetivo, es única para cada paciente, exige compromiso activo, requiere de habilidades de observación y escucha.

B. Ayuda a controlar el temor, controla el dolor, explica los pasos de la cirugía, alienta al paciente a comunicarse con el equipo de salud.

C. Mantiene la seguridad en el acto quirúrgico, verifica el grado de bienestar, alienta a que el paciente comunique sus emociones, explica el procedimiento.

D. Está dirigida a mantener el interés en la comunicación con los miembros del equipo quirúrgico, ayuda a evitar accidentes quirúrgicos.

696. Un paciente presentó síntomas de accidente vascular cerebral isquémico hace una hora. ¿Cuáles son los principales aspectos relativos a la condición clínica del paciente que usted valora en esta fase aguda?

A. Cambios del nivel de conciencia; orientación en tiempo, lugar y persona; apertura ocular y estado de las pupilas; calidad y frecuencia de pulso y respiración.

B. La condición mental del paciente (memoria, capacidad para mantener la atención, percepción, orientación, afecto, habla/lenguaje); las funciones intestinal y vesical.

C. La capacidad para la deglución; el estado nutricional y de hidratación; la integridad cutánea y la tolerancia a la actividad.

D. La sensibilidad y la percepción (sensibilidad al dolor y a la temperatura); el control motor (movimiento de las extremidades superiores e inferiores).

697. Atendiendo los aspectos propios del proceso de envejecimiento, complete el siguiente enunciado:

La Neumonía en los adultos mayores es frecuente porque _____ la eficacia del reflejo _____ y el _____.

A. disminuye - de deglución - tusígeno.

B. aumenta - de deglución - tusígeno.

C. disminuye - nauseoso - tusígeno.

D. aumenta - nauseoso - tusígeno.

698. En relación a los métodos de diagnóstico del VIH-SIDA, complete el siguiente enunciado: La prueba de laboratorio que determina la presencia de anticuerpos contra VIH en la sangre es _____ y los resultados positivos se validan con la prueba _____.

A. ELISA - Western blot.

B. Western blot - Antígeno p24.

C. ELISA – Carga viral.

D. Carga viral – Antígeno p24.

699. Mujer de 38 años con diagnóstico de infección de vías urinarias, refiere ardor a la micción, urgencia, nicturia y dolor agudo en la región dorsal. En este caso: ¿Cuál es la intervención de enfermería para el alivio del dolor?

A. Aplicación de calor en el perineo.

B. Educar a la paciente a espaciar las micciones.

C. Indicar a la paciente que aumente la ingestión de café o té.

D. Educar a la paciente a limpiar el perineo y el meato uretral de atrás hacia delante.

700. ¿Qué acción se debe realizar para prevenir infecciones en el paciente con sonda urinaria a permanencia?

A. Usar técnica aséptica durante la inserción de la sonda.

B. Irrigar la sonda con jeringa de manera sistemática.

C. Vaciar la bolsa de recolección al menos cada 24 horas.

D. Realizar cambio sistemático de la sonda vesical.

701. Al realizar la medición de la temperatura oral a un paciente, usted debe cerciorarse que este no haya ingerido alimentos, líquidos calientes o fríos, o haya fumado en un espacio de tiempo de:

A. 30 minutos.

B. 20 minutos.

C. 10 minutos.

D. 15 minutos

702. La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria que permite identificar la alteración del equilibrio ácido básico. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes datos? $pH = 7.30$; $PaCO_2 = 48$ mmHg; $PaO_2 = 83$ mmHg; $H_2CO_3 = 20$ meq/l

Acidosis respiratoria.

Alcalosis respiratoria.

Acidosis metabólica.

Alcalosis metabólica

703. Usted es coordinador del servicio de enfermería y le han asignado la responsabilidad de habilitar el área de quemados, el director del hospital le indica que han adquirido equipos y materiales para el funcionamiento, luego de revisión de los mismos usted indica que necesita otros insumos, pero no hay presupuesto, usted pone en marcha el servicio utilizando los recursos disponibles ¿cómo se denomina este concepto?

A. eficacia asignada

B. efectividad

C. eficiencia

D. eficacia

704. De las siguientes opciones, ¿cuál es correcta con relación a la administración y lectura de la tuberculina?

A. Administrar la tuberculina por vía intradérmica y realizar la lectura a las 48-72 horas.

B. Administrar la tuberculina por vía subcutánea y realizar la lectura a las 24-48 horas

C. Administrar la tuberculina por vía intramuscular y realizar la lectura a las 48-72 horas.

D. Administrar la tuberculina por vía subcutánea y realizar la lectura a las 10-24 horas

705. Gestante que acude a la emergencia de una unidad de salud por una preeclampsia grave. requiere una cesárea de emergencia para salvar su vida y la de su feto. En caso de que un profesional de salud infrinja su deber y ocasione la muerte de esta paciente, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿A qué artículo del Código Orgánico Integral Penal se encuentra directamente vinculado este caso?

- A. Art. 145. Homicidio culposo.
- B. Art. 144.- Homicidio.
- C. Art. 146. Homicidio culposo por mala práctica profesional.
- D. Art. 135.- Omisión de medidas de protección

706. Madre acude con neonatal de 3 semanas de vida al control médico con previa notificación por parte del personal del centro de salud; se le comunicó sobre los resultados de la primera muestra del tamizaje metabólico neonatal el cual se encuentra sobre los niveles de corte para galactosemia. A qué caso corresponde?

- A. Elevado
- B. Normal
- C. Sospechoso
- D. Positivo

707. Paciente femenina de 19 años que cursa un embarazo de 20 semanas acude a consulta por presentar secreción vaginal en abundante cantidad, picazón en región genital, dolor y ardor al orinar. Al examen físico se identifica FCF normal. ¿Qué actividad corresponde a este caso?

- A. Citología Vaginal.
- B. Atención y tratamiento para la infección.
- C. Educación sobre los cuidados para prevenir complicaciones.
- D. Educación sobre la patología, sus causas y riesgos en el embarazo

708. Paciente de 69 años con un índice de masa corporal (IMC) de 38 y antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 5 años con tratamiento continuo, acude a su primer control en su centro de salud con su personal de atención médica. Usted nota que la información proporcionada por el personal de salud de su paciente es deficiente en cuanto a cómo minimizar los riesgos para la salud. Como profesional de la salud, ¿qué medidas tomaría para brindar una atención adecuada y minimizar los riesgos de deterioro en la salud de su paciente?

- A. Higiene respiratoria.
- B. Higiene de manos.
- C. Uso de guantes.
- D. Equipo de protección personal (EPP).

709. Una mujer de 37 años con 38 semanas de gestación, multípara, ingresa al hospital en compañía de su esposo, refiere que vive en una zona rural, manifiesta dolor en la zona pélvica que irradia hasta la región lumbosacro, salida de mucosidad vaginal. En la valoración obstétrica presenta salida del tapón mucoso, dilatación de 3 cm, contracciones una cada 10 minutos, borramiento 50 %; los signos vitales se encuentran dentro de los parámetros normales. ¿Cuál es el criterio de admisión para este caso?

- A. Brindar información sobre la no ingesta de líquidos y comidas para la preparación del enema y rasurado perineal antes del ingreso.

- B. Indicar que retorne a su domicilio orientando que regrese cuando tenga mayor actividad uterina, informar a la paciente sobre los signos de alarma para su ingreso.
- C. Preparar para la realización de monitorización fetal electrónica continua (MFEC) y auscultación fetal intermitente (AFI)-
- D. Ofrecer apoyo individualizado, información al acompañante, protocolo para el ingreso al servicio de Ginecología, labor de parto.

710. Niño de 11 meses es traído a emergencia por su madre quien refiere que desde hace 48 horas presenta diarrea líquida abundante, con moco, sin sangre, de 5 a 6 veces por día. Se acompañan de vómitos y Al examen se encuentra al lactante deshidratado. Según el tiempo de evolución. ¿Qué tipo de diarrea presenta este niño?

- A. Diarrea aguda
- B. Diarrea persistente
- C. Diarrea crónica
- D. Diarrea intermitente

711. ¿Cuáles son los componentes del consentimiento informado? Marque la que NO pertenece.

- A. Voluntariedad
- B. Tecnicismos médicos
- C. Capacidad de decisión
- D. Información comprensible

712. Un hombre de 48 años con antecedentes de Prostatitis Aguda acude a la sala de urgencias con disuria y urgencia miccional. Al interrogatorio presenta desde hace 3 días malestar general que se acompaña de disuria, urgencia miccional, sin fiebre y refiere que la sintomatología inició.... Examen físico el abdomen está suave, depresible, doloroso a la palpación profunda en Hipogastrio, región lumbar puñopercusión negativa, biometría hemática: leucocitos de 10000 mm³, examen de orina se evidencia presencia de leucocitos y bacterias ++. Eco prostático y probable para este paciente?

- A. Pielonefritis
- B. Nefritis Intersticial Aguda
- C. Cistitis
- D. Urolitiasis

713. Paciente femenina de 66 años acude a centro de salud por presentar hace una hora caída de propia altura con apoyo... hinchazón. Al examen físico ABCDE sin alteración. Al examen de muñeca derecha se observa Edema, Equimosis, deformidad. Se observa desplazamiento dorsal de la epífisis radial (deformidad en dorso de tenedor). ¿Cuál es la recomendación terapéutica?

- A. Infiltración anestésica local y analgesia
- B. Referencia a traumatología para reducción cerrada
- C. Referencia a traumatología para reducción abierta
- D. Inmovilización con yeso cerrado.

714. Paciente masculino de 8 meses con antecedentes de 12 episodios de diarrea por gastroenteritis, anorexia, náuseas, vómitos,... Paciente letárgico, somnoliento, confuso, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo. El examen de laboratorio indica: Hem?... blancos 6 500 / mm³, sodio 132 mEq/l, concentración urinaria de sodio: 10 mEq/l ¿Cuál es el diagnóstico más probable en el paciente?

- A. Hipernatremia hipovolémica
- B. Hiponatremia hipovolémica**
- C. Hiponatremia hipervolémica
- D. Hipernatremia hipovolémica

715. Mujer de 48 años, casada, nuligesta, sin antecedentes clínicos de importancia, Consulta por dolor en mama derecha desde hace 24 horas y además indica que ha notado deformidad en la mama izquierda. A la exploración física se aprecia deformidad a nivel de cuadrante superior externo de la mama izquierda y se palpa una masa de consistencia dura, dolorosa, de bordes irregulares, no móvil, de aproximadamente 14 cm. ¿Qué examen complementario resulta más apropiado en este caso?

- A. Ecografía
- B. Mamografía**
- C. Resonancia magnética
- D. Rx estándar de tórax

716. Un paciente varón de 72 años con antecedentes de alcoholismo crónico y cirrosis. Acude a emergencias por decaimiento, fiebre y dolor abdominal de 2 días de evolución. Al examen físico, lo relevante es la temperatura de 38.8 grados centígrados y frecuencia cardíaca 100 lpm (latidos por minuto) y presencia de ascitis, con dolor difuso a la palpación abdominal y peritonismo. La tomografía descarta compromiso visceral abdominal. La punción peritoneal reporta líquido con 300 polimorfonucleares por microlitro. Entre los siguientes gérmenes. ¿Cuál NO está implicado habitualmente en la etiología de este cuadro?

- A. Anaerobios**
- B. Estreptococo
- C. Estafilococo
- D. Enterobacterias

717. Un paciente de 21 años sin antecedentes clínicos de importancia, presenta un cuadro compatible con neumonía comunitaria y decide hospitalizar. Tres días más tarde, con adecuada evolución clínica, usted solicita una radiografía de tórax para control previo al alta, pero todavía persiste el infiltrado radiológico. En estas condiciones y expresado en semanas, usualmente. ¿Cuál es el mínimo tiempo promedio en que se realiza el control radiológico?

- A. 6 semanas**
- B. 1 semana
- C. 2 semanas
- D. 3 semanas

718. Paciente femenina de 4 años, acude por presentar resequedad de piel, diarreas frecuentes, alteración de la visión especialmente nocturna. Sin antecedentes personales y vacunas completas. Al examen físico se observa peso y talla bajos para la edad, piel, placas descamativas secas e hiperqueratosis, más frecuentes en brazos, piernas, hombros y nalgas. Ojos, manchas de Bitot. ¿Cuál considera el diagnóstico más probable?

- A. Déficit de vitamina C
- B. Déficit de vitamina D
- C. Déficit de vitamina A
- D. Déficit de vitamina B

719. ¿Cuál es la herramienta específica del MAIS-FCI que sirve para identificar oportunamente a los individuos, a las familias sanas con posibles y potenciales riesgos y a quienes mediante una planificación adecuada se realizan intervenciones para su salud?

- A. Diagnostico dinámico
- B. Diagnostico situacional
- C. Ficha familiar
- D. Visita domiciliaria

720. Seleccione el tipo de drenaje que se utiliza para vía biliar. Respuestas:

- A. Tubo en T.
- B. Penrose.
- C. Jackson Pratt.
- D. Hemovac.

721 Seleccione las recomendaciones para la transfusión de componentes en hemorragia masiva:

1. Transfundir concentrado de glóbulos rojos cuando se estime una pérdida de la volemia que supere el 30%
2. Utilizar equipos de presión externa con accesos venosos de pequeño diámetro.
3. Prevenir hipotermia.
4. Completar la transfusión sanguínea en un tiempo máximo de ocho horas desde su colocación.
5. Administrar cristaloides como primera línea de tratamiento para corregir el déficit de volumen.
6. Tomar y registrar los signos vitales del paciente luego de treinta minutos del inicio de la transfusión.

Respuestas:

1, 3, 5

1, 4, 6

2, 4, 5

2, 3, 6

722. Un paciente manifiesta que desde hace una semana, el yeso colocado en su miembro inferior está muy apretado y comienza a quejarse de mucho dolor. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería más idóneo para ésta situación?

- A. Dolor agudo relacionado con agentes lesivos manifestado por expresión verbal de dolor.

- B. Dolor crónico relacionado con agentes lesivos manifestado por expresión verbal de dolor.
- C. Riesgo de lesión relacionado con incapacidad para moverse.
- D. Riesgo de caída relacionado con inmovilización por yeso.

723. Como enfermera/o del servicio de emergencias recibe un paciente con fractura abierta de tibia. ¿Cuál es la acción inmediata que se realiza?

- A. Cubrir la herida con apósito estéril.
- B. Intentar reducir la fractura.
- C. Retirar la ropa sólo del lado afectado.
- D. Mover la extremidad fracturada.

724. Un paciente de 58 años hospitalizado, con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva, presenta un paro cardíaco. ¿Qué acción inmediata se realiza en este caso?

- A. Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta a emergencias.
- B. Reanimación Cardiopulmonar precoz con énfasis en las compresiones torácicas.
- C. Desfibrilación rápida con desfibrilador externo automático.
- D. Brindar cuidados postparo cardíaco multidisciplinarios.

725. En una visita domiciliar a un paciente de 74 años, con antecedentes de Infarto Agudo del Miocardio, repentinamente presenta pérdida de la conciencia. Usted constata un paro cardíaco y activa de inmediato el sistema de emergencias. ¿Cuál es la siguiente acción que usted realiza?

- A. Desfibrilación rápida.
- B. Soporte vital avanzado.
- C. Reanimación Cardiopulmonar precoz.
- D. Brindar cuidados postparo cardíaco.

726. Uno de los criterios para considerar la RCP como de alta calidad es la profundidad de las compresiones torácicas. ¿Cuál es la profundidad con la que se deben realizar las compresiones en un adulto?

- A. Al menos 3 cm.
- B. Al menos 4 cm.
- C. Al menos 7 cm.
- D. Al menos 5 cm.

727. Con relación a la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de alta calidad, complete el siguiente enunciado: Al realizar las compresiones torácicas en adultos, comprimir a una frecuencia de entre _____ cpm, con una profundidad de _____ como mínimo y permita que el tórax se expanda _____ después de cada compresión.

- A. 60 a 80 - 5 cm - un tercio.
- B. 100 a 120 - 5 cm - completamente.
- C. 70 a 90 - 4 cm - completamente.
- D. 80 a 100 - 4 cm - un tercio.

728. Ordene los eslabones de la cadena de supervivencia en adultos en el paro cardíaco extrahospitalario (PCEH).

1. Cuidados postparto cardíaco multidisciplinarios
2. RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas.
3. Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta a emergencias.
4. Soporte vital avanzado eficaz.
5. Desfibrilación rápida con un desfibrilador manual o un desfibrilador externo automático (DEA).

- A. 2, 3, 4, 5, 1.
- B. 4, 5, 1, 2, 3.
- C. 3, 4, 5, 1, 2.
- D. 3, 2, 5, 4, 1.

729. Con relación a las intervenciones de enfermería a un paciente que dispone de un catéter para monitoreo de la presión venosa central (PVC). Señale el enunciado correcto.

- A. Realizar limpieza y curación del sitio de inserción del catéter en cada turno.
- B. Confirmar la ubicación del catéter mediante tomografía computarizada.
- C. Realizar mediciones de PVC con la cabecera de la cama elevada a 90°
- D. Valorar sitio de inserción del catéter para detectar signos de infección.

730. Seleccione las áreas que son consideradas semirrestringidas en un centro quirúrgico:

1. Sala de procedimientos menores.
2. Áreas de almacenamiento.
3. Área de materiales estériles.
4. Corredores ubicados entre quirófanos.
5. Vestidores del centro quirúrgico.
6. Áreas de procesamiento de instrumental.

Respuestas:

2, 4, 6

1, 5, 6

2, 3, 5

1, 3, 4

731. En la educación de la paciente mastectomizada, con disección ganglionar linfática axilar (DGLA), señale la orientación correcta para el cuidado de la mano y el brazo después de la disección:

- A. Durante la manicura cortar las cutículas.
- B. No levantar objetos de más de 5 kg de peso.
- C. Realizar extracciones de sangre en el miembro homolateral a la cirugía.
- D. Si en las 24 horas posteriores a la cirugía observa enrojecimiento en el área, tomar un antiinflamatorio.

732. Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa que no abre los ojos bajo ningún estímulo, al preguntar su nombre responde con palabras inapropiadas y al evaluar la respuesta motora observa una flexión anormal. Aplicando la Escala del Coma de Glasgow : ¿Qué puntuación tiene este paciente?

- A. 8
- B. 7

- C. 9
- D. 6

733. Al valorar un paciente con trauma craneoencefálico, usted observa apertura ocular al dolor, al preguntar la fecha le responde de manera confusa y al evaluar la respuesta motora localiza el dolor. De acuerdo a la Escala del Coma de Glasgow, señale la puntuación correspondiente en este caso:

- A. 11
- B. 10
- C. 12
- D. 9

734. Un hombre de 41 años, con talla de 1.75 m y un peso de 72.0 kg. De acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC). ¿Qué estado nutricional tiene?

- A. Deficiente.
- B. Sobrepeso.
- C. Normal.
- D. Obesidad.

735. Una paciente de 38 años, con talla de 1.53 mts y un peso de 62 kg. De acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC). ¿Qué estado nutricional tiene la paciente?

- A. Normal.
- B. Obesidad.
- C. Obesidad extrema.
- D. Sobrepeso.

736. Un paciente con tratamiento con Morfina presenta depresión respiratoria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se utiliza para revertirla?

- A. Naloxona.
- B. Fentanilo.
- C. Bromuro de Rocuronio.
- D. Propofol.

737. En el Ecuador el dengue es un problema prioritario de salud pública. Seleccione las manifestaciones que corresponden al dengue sin signos de alarma:

1. Sangrado de mucosas.
2. Dolor retro orbitario.
3. Vómito persistente.
4. Exantema (erupción cutánea).
5. Leucopenia. 6. Letargia.

Respuestas:

- A. 4, 5, 6
- B. 1, 3, 6
- C. 2, 4, 5
- D. 1, 2, 3

738. Relacione el tipo de dengue con las manifestaciones que correspondan:

TIPO DE DENGUE

1. Dengue.
2. Dengue grave.

MANIFESTACIONES

- a. Leucopenia.
- b. Náuseas, vómitos.
- c. Sangrado de mucosas.
- d. Letargia, irritabilidad.

- A. 1ab, 2cd.
- B. 1bc, 2ad.
- C. 1cd, 2ab.
- D. 1ad, 2bc.

739. Un paciente de 75 años de edad sometido a cirugía de cadera bajo anestesia raquídea, luego de 2 horas en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), refiere sensación de plenitud en su vejiga y urgencia para orinar, pero no logra la evacuación.

¿Cuál es la primera opción de intervención en este caso?

- A. Realizar sondaje vesical.
- B. Poner de pie al paciente.
- C. Aplicar frío en el perineo
- D. Aplicar calor en el perineo..

740. Paciente de 54 años de edad sometida a una Cistopexia bajo anestesia raquídea hace 24 horas, ha permanecido en cama por temor a caerse. Al realizar la valoración de enfermería usted observa distensión abdominal y la paciente refiere dolor abdominal. En este caso ¿Cuál de las siguientes intervenciones sería la primera opción para aliviar estas molestias y prevenir íleo posoperatorio?

- A. Aplicar enema evacuante.
- B. Iniciar la deambulación.
- C. Administrar laxante.
- D. Colocar sonda rectal.

741. Como enfermera circulante, usted atiende en quirófano a un paciente al que se realiza una Colectomía. Una vez que se realizó la apertura de la pared abdominal, el cirujano le indica que cambie al paciente de posición para tener un mejor acceso a la vesícula biliar.

¿En qué posición usted colocaría al paciente?

- A. Litotomía.
- B. Trendelenburg.
- C. Decúbito dorsal.
- D. Trendelenburg invertida.

742. Un paciente de 56 años de edad con antecedentes de tabaquismo, con un índice de masa corporal (IMC) de 43, hipertensión arterial controlada, ingresa al hospital para realizarse una biopsia renal, como valoración de una enfermedad renal. ¿Cuál de los antecedentes del paciente constituye una contraindicación de la biopsia renal?

- A. Edad de 56 años.
- B. Índice de masa corporal (IMC) de 43.
- C. Tabaquismo.
- D. Hipertensión arterial controlada.

743. Complete el siguiente enunciado: La hepatitis A se transmite a través de la vía _____, el período de incubación del virus varía de _____ días y dentro de las manifestaciones se encuentra la _____.

- A. fecal oral - 15 a 45 - ictericia.
- B. parenteral - 15 a 45 - leucopenia.
- C. fecal oral - 7 a 45 días - leucopenia.
- D. parenteral - 15 a 30 días - ictericia.

744. Seleccione el problema de salud mental del adulto mayor que corresponde al Síndrome clínico caracterizado por irritabilidad, ansiedad, anhedonia, alteraciones en el sueño y el apetito.

- A. Demencia.
- B. Delirio.
- C. Alzheimer.
- D. Depresión.

745. Ordene la secuencia fisiopatológica en el choque hipovolémico:

1. Disminución de la perfusión tisular.
2. Disminución del gasto cardíaco.
3. Disminución del volumen sanguíneo.
4. Reducción del retorno venoso.
5. Disminución del volumen latido.

Respuestas:

- A. 3, 4, 5, 2, 1.
- B. 2, 3, 4, 5, 1.
- C. 4, 3, 2, 1, 5.
- D. 1, 2, 3, 4, 5.

747. Paciente que se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos, con ventilación mecánica asistida, recibe nutrición enteral. El enfermero asignado no ha medido el volumen residual en todo el turno (8 horas) y mantiene la cabecera de la cama a 20°. ¿Qué complicación puede presentarse en este caso?

- A. Neumonía asociada a la ventilación mecánica.
- B. Traumatismo de la vía aérea por presión.
- C. Asincronía paciente - ventilador.
- D. Neumonía por aspiración.

748. Ordene los componentes de un trazado electrocardiográfico normal:

1. Onda P.
2. Complejo QRS.
3. Intervalo PR,
4. Segmento ST,
5. Intervalo QT.
6. Onda T.

Respuesta:

- A. 1, 3, 2, 4, 6, 5
- B. 2, 3, 1, 4, 5, 6.

- C. 1, 4, 5, 3, 2, 6.
- D. 4, 5, 6, 2, 1, 3.

749. Seleccione la medida de control ambiental para la prevención del contagio y transmisión de la tuberculosis en los establecimientos de salud:

- A. Al ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.
- B. Elaboración de un plan de control de infecciones que incluya la identificación de los servicios de riesgo.
- C. Promover el tratamiento ambulatorio de la TB como una forma eficaz para disminuir el riesgo de transmisión.
- D. Incrementar el intercambio de aire interno potencialmente contaminado con aire puro del exterior, mejorando la ventilación natural.

750. Paciente de 43 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7,52, PaCO₂ mm Hg = 40, HCO₃ = 30mEq/L. De acuerdo a estos resultados ¿Cuál es el desequilibrio ácido básico que presenta este paciente?

- A. Alcalosis metabólica descompensada.
- B. Acidosis Respiratoria compensada.
- C. Alcalosis Respiratoria compensada.
- D. Acidosis metabólica compensada.

751. Paciente de 53 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7.33, PaCO₂ = 55 mm Hg, HCO₃ = 24 mEq/L. De acuerdo con estos resultados ¿Cuál es la alteración ácido básica que presenta este paciente?

- A. Alcalosis respiratoria.
- B. Acidosis metabólica.
- C. Acidosis respiratoria.
- D. Alcalosis metabólica.

752. Paciente de 43 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7,52, PaCO₂ mm Hg = 40, HCO₃ = 30mEq/L. De acuerdo a estos resultados ¿Cuál es el desequilibrio ácido básico que presenta este paciente?

- A. Acidosis Respiratoria compensada.
- B. Alcalosis Respiratoria compensada.
- C. Acidosis metabólica compensada.
- D. Alcalosis metabólica descompensada.

753. Paciente de 53 años, se le realiza una gasometría arterial, cuyos resultados son: pH = 7.33, PaCO₂ = 55 mm Hg, HCO₃ = 24 mEq/L. De acuerdo con estos resultados ¿Cuál es la alteración ácido básica que presenta este paciente?

- A. Acidosis respiratoria.
- B. Alcalosis respiratoria.
- C. Acidosis metabólica.
- D. Alcalosis metabólica.

754. Un enfermero al auscultar los campos pulmonares de un paciente de 30 años ingresado en el área de medicina interna, detecta sonidos musicales, continuos, agudos, se escuchan mejor durante la espiración. ¿Qué ruido pulmonar anormal está auscultando?

- A. Sibilancias.
- B. Crepitaciones (Estertores).
- C. Roncus (Gorgoteo).
- D. Roce de fricción.

755. Seleccione las manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática:

- 1. Arañas vasculares.
 - 2. Dolor abdominal grave.
 - 3. Eritema palmar.
 - 4. Náusea y vómito.
 - 5. Ascitis.
 - 6. Disminución de la peristalsis.
- A. 2, 3, 4
 - B. 2, 4, 6
 - C. 1, 5, 6
 - D. 1, 3, 5

756. Seleccione las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo:

- 1. Fatiga extrema.
- 2. Nerviosismo e irritabilidad.
- 3. Pérdida de cabello.
- 4. Intolerancia al calor.
- 5. Estreñimiento.
- 6. Taquicardia.

Respuestas:

- A. 1, 3, 5
- B. 2, 3, 4
- C. 2, 4, 6
- D. 1, 5, 6

757. Paciente de 75 años internado en un centro geriátrico, presenta deterioro global de las funciones cognitivas, sin alteración del nivel de conciencia que interfiere en el desarrollo de sus actividades cotidianas. ¿Qué síndrome geriátrico presenta el paciente con esta sintomatología?

- A. Delirio.
- B. Demencia.
- C. Caídas.
- D. Dismovilidad.

758. Identifique la complicación aguda de la Diabetes Mellitus:

- A. Cetoacidosis Diabética.
- B. Retinopatía diabética.
- C. Neuropatía diabética.
- D. Nefropatía diabética.

759. Paciente de 68 años ingresado en el servicio de emergencia, se encuentra con monitorización cardíaca. A la valoración se observa frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, ritmo ventricular regular, el Intervalo PR está ausente, QRS es ancho y extraño.

Señale de qué ritmo se trata:

- A. Fibrilación ventricular.
- B. Fibrilación auricular.
- C. Taquicardia ventricular.**
- D. Aleteo auricular.

760. Paciente de 25 años que llega a emergencia tras sufrir accidente de tránsito, a la valoración se observa que al estímulo aprieta los dientes y estira los brazos, aducen e hiperpronan, las piernas se extienden con rigidez y flexión plantar de ambos pies. ¿Qué respuesta anormal motora presenta este paciente?

- A. Descerebración.**
- B. Decorticación.
- C. Opistótonos.
- D. Flacidez.

761. Un alto grado de participación es la clave de lograr retrasar las consecuencias del declive por el envejecimiento. ¿A qué teoría del envejecimiento corresponde?

- A. Del reloj biológico.
- B. De la actividad.**
- C. De los radicales libres.
- D. Genética

762. ¿Cuál de los siguientes fármacos altera la transmisión de iones para prevenir la actividad convulsiva?

- A. Furosemida.
- B. Manitol.
- C. Propofol.
- D. Fenitoina.**

763. Para la prevención de venas varicosas en un paciente sin otras complicaciones. ¿Cuál es la recomendación en relación a la actividad física?

- A. Caminar un promedio de 1.6 a 3.2 km al día.**
- B. Utilizar calcetines apretados en el extremo superior.
- C. Cruzar las piernas en los muslos.
- D. Mantenerse de pie por períodos prolongados.

764. Seleccione las manifestaciones clínicas de la Cetoacidosis diabética.

1. Hiperglucemia.
2. Hipotensión.
3. Deshidratación con pérdida de electrolitos.
4. Alteración del sensorio.
5. Acidosis.
6. Hemiparesia.

Respuestas:

A. 1, 3, 5

B. 2, 4, 6

C. 3, 4, 6

D. 2, 3, 5

765. Al valorar un paciente con antecedentes de tumor hepático, con coloración amarilloverdosa de la piel, usted se encuentra ante una disfunción hepática conocida como:

A. Hiperbilirrubinemia hereditaria.

B. Ictericia hepatocelular.

C. Ictericia hemolítica.

D. Ictericia obstructiva.

766. Al realizar la valoración a una paciente de 37 años de edad, la misma refiere que hace un tiempo viene presentando nerviosismo, palpitaciones, que su piel se le enrojece y que siente que las manos le tiemblan, todo esto acompañado de pérdida de peso. Ante estos signos y síntomas, usted interpreta estas manifestaciones como un cuadro de:

A. Hipertiroidismo.

B. Síndrome de Cushing.

C. Aldosteronismo primario.

D. Hipotiroidismo.

767. Seleccione las manifestaciones clínicas de la Tuberculosis pulmonar en el adulto.

1. Disnea de inicio súbito, febrícula.

2. Tos con expectoración por más de 15 días.

3. Hipoxemia grave, cianosis.

4. Fiebre, sudoración nocturna.

5. Tórax en tonel, disnea con el ejercicio.

6. Pérdida de apetito, pérdida de peso.

Respuestas:

A. 1, 3, 5

B. 2, 3, 5

C. 1, 4, 6

D. 2, 4, 6

768. ¿Cuál es la manifestación clínica tardía de la neumonía bacteriana?

A. Cianosis.

B. Fiebre.

C. Tos.

D. Disnea.

769. La gasometría arterial es una técnica de monitorización respiratoria que permite identificar la alteración del equilibrio ácido básico. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes datos?

pH= 7.30

PaCO₂. = 48 mmHg.

PaO₂. = 83 mmHg.

H₂CO₃. = 20 meq/l.

Respuestas:

- A. Alcalosis respiratoria.
- B. Acidosis metabólica.
- C. Acidosis Respiratoria.
- D. Alcalosis metabólica.

770. En una gasometría arterial de un paciente de 37 años. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes resultados: pH 7.50, PaCO₂ 40 mmHg, HCO₃ 28 mEq/L?

- A. Alcalosis metabólica.
- B. Acidosis metabólica.
- C. Alcalosis respiratoria.
- D. Acidosis respiratoria.

771. En una gasometría arterial de un paciente de 37 años. ¿Qué trastorno se pone de manifiesto teniendo en cuenta los siguientes resultados: pH 7.50, PaCO₂ 40 mmHg, HCO₃ 28 mEq/L?

- A. Acidosis metabólica.
- B. Alcalosis respiratoria.
- C. Alcalosis metabólica.
- D. Acidosis respiratoria.

772. Seleccione los factores de riesgo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 1. Fumar de manera pasiva.

- 2. Patrón de respiración superficial.
- 3. Contaminación del aire.
- 4. Aspiración pulmonar.
- 5. Exposición ocupacional al polvo.
- 6. Reflejo tusígeno deprimido.

Respuestas:

- A. 1, 3, 5.
- B. 2, 4, 6.
- C. 1, 5, 6.
- D. 2, 3, 4.

773. Seleccione los cuidados de enfermería específicos en pacientes que reciben medicación diurética:

- A. Vigilar presencia de disnea y edema periférico.
- B. Vigilar la presencia de latido cardíaco irregular y edema.
- C. Vigilar signos de desequilibrio electrolítico e hipotensión postural.
- D. Vigilar la presencia de lipotimias, náuseas y vómitos.

774. Paciente de 35 años, se encuentra hospitalizado, a la valoración pulmonar se auscultan ruidos de tono bajo, áspero y rasposos, como al frotar dos trozos de cuero. Se escucha durante la inspiración y espiración. En ocasiones puede sentirse a través del tórax. Señale qué tipo de ruido pulmonar adventicio se describe:

- A. Roce por fricción pleural.
- B. Estridor.
- C. Crepitaciones.

D. Sibilancias.

775. A la valoración pulmonar de un paciente se auscultan: sonidos fuertes, de tono bajo, retumbantes, se escuchan durante la inspiración o espiración y a veces se aclaran con la tos. Señale a qué tipo de ruido pulmonar adventicio se refiere el enunciado:

Sibilancias.

Crepitantes.

Roce por fricción pleural.

Roncus.

776. Con relación a la prevención y control de la tuberculosis. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención se debe aplicar para evitar su contagio y transmisión?

- A. Una persona afectada con TB, bacteriológicamente positiva, debe usar mascarilla quirúrgica.
- B. Una persona afectada con TB, debe hospitalizarse para un mejor control de la enfermedad.
- C. Informar sobre sus contactos después de los 7 días posteriores al tratamiento para establecer el control.
- D. Realizar control de contactos dentro de los primeros seis meses de iniciado el tratamiento.

777. ¿Cuál es el régimen especial de tratamiento contra la Tuberculosis Pulmonar en la embarazada según el MSP?

- A. Las embarazadas con TB multidrogoresistente, no deben iniciar el tratamiento en el primer trimestre del embarazo.
- B. Una vez que la madre comienza la lactancia materna debe interrumpir el tratamiento antituberculoso.
- C. Los anticonceptivos orales constituyen la mejor opción en las mujeres con tuberculosis para evitar en el embarazo.
- D. La madre y el niño deben estar en habitaciones separadas para evitar la transmisión de la enfermedad.

778. El electrocardiograma es un método diagnóstico que registra la actividad eléctrica del corazón. En relación a este procedimiento, identifique cuál es la opción correcta:

- A. Rasurar el exceso de bello en el paciente que presente abundante bello en el tórax.
- B. Colocar al paciente en decúbito supino en el centro de la cama y los brazos a ambos lados del cuerpo.
- C. Colocar las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6 en las extremidades.
- D. Colocar electrodos por debajo de la escápula izquierda y a nivel del quinto espacio intercostal para diagnosticar infartos de cara anterior.

779. Con relación a la educación que el profesional de enfermería proporciona al paciente diabético. Señale el enunciado correcto:

- A. Observar los pies todos los días en busca de cortes, ampollas, manchas rojas y edema.
- B. Indicarle al paciente insulino dependiente que no debe ingerir alimentos antes de realizar ejercicios.

- C. Tras la administración de insulina de acción rápida el paciente debe de esperar de 30 a 45 minutos para ingerir alimentos.

780. Un mayor consumo de fibras incrementa las cifras de glucosa y hace necesario incrementar la dosis de insulina. Complete el siguiente enunciado, relacionado con las complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus:

La _____ puede deberse a un exceso de insulina, actividad física extenuante o poca ingesta de alimentos. En caso de una cantidad nula de insulina disponible en el organismo, se produce _____, caracterizada por hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis. El cuadro clínico que incluye hipotensión, deshidratación intensa y signos neurológicos corresponde a _____.

- A. hipoglicemia - cetoacidosis diabética - síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.
- B. cetoacidosis diabética - nefropatía - complicaciones microvasculares.
- C. hipoglicemia - síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico - nefropatía.
- D. hiperglicemia - cetoacidosis diabética - nefropatía.

781. Con relación al Hipotiroidismo. Seleccione el enunciado correcto:

- A. Afecta a los hombres cinco veces más a menudo que a las mujeres.
- B. El paciente presenta nerviosismo y palpitaciones.
- C. Son manifestaciones clínicas: la fatiga frecuente, uñas frágiles, piel seca y pelo quebradizo
- D. El propiltiouracilo es uno de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad.

782. Al brindar cuidados de enfermería a pacientes con Hipotiroidismo. ¿Cuál de las siguientes intervenciones usted realiza?

- A. Proporcionar una capa adicional de ropa adecuada y evitar la exposición al frío.
- B. Promover el uso de fuentes de calor externas para mantener la temperatura corporal.
- C. Incrementar el uso de laxantes en los pacientes para prevenir la constipación.
- D. Incentivar y orientar sobre el uso de hipnóticos y sedantes para aliviar el insomnio y el nerviosismo.

783. Seleccione los síndromes geriátricos:

1. Pérdida de la densidad ósea.
2. Incontinencia urinaria.
3. Reducción de la motilidad gastrointestinal.
4. Alteración de la movilidad.
5. Disminución de la grasa subcutánea.
6. Aumento de la susceptibilidad a infecciones.

Respuestas:

- A. 2, 3, 5
- B. 1, 4, 6
- C. 2, 4, 6
- D. 1, 3, 5

784. Con relación a los cuidados de enfermería en la obtención de una muestra de sangre capilar para la medición de la glicemia, señale el enunciado correcto.

- A. Antes de tomada la muestra aplicar presión en el sitio de punción con una torunda con alcohol
- B. Pedir al paciente que se lave las manos con agua tibia y jabón previo a la punción.
- C. Presionar fuertemente el dedo puncionado para obtener la muestra de sangre.
- D. En los adultos se debe obtener la muestra capilar de los extremos de los dedos.

785. Con relación a los cuidados de enfermería en la obtención de una muestra de sangre capilar para la medición de la glicemia, señale el enunciado correcto.

- A. Pedir al paciente que se lave las manos con agua tibia y jabón previo a la punción.
- B. Presionar fuertemente el dedo puncionado para obtener la muestra de sangre.
- C. En los adultos se debe obtener la muestra capilar de los extremos de los dedos.
- D. Antes de tomada la muestra aplicar presión en el sitio de punción con una torunda con alcohol.

786. Identifique las características clínicas del dengue:

- A. Los primeros síntomas se presentan dentro de las 48 horas tras la incubación del virus.
- B. Fiebre elevada acompañada de cefalea intensa y dolor detrás de los globos oculares.
- C. Hipercoagulación que ocasiona alteraciones trombo embólicas.
- D. Disminución de la frecuencia respiratoria.

787. Paciente femenina, de 37 años, refiere disminución progresiva de peso, aumento del apetito, diarrea, sudoración, amenorrea, intolerancia al calor, temblor fino en las manos. Al examen físico se observa paciente irritable, con piel caliente y húmeda, exoftalmos, FC= 120 x min. ¿A qué patología corresponde el caso descrito ?

- A. Hipertiroidismo.
- B. Hipotiroidismo.
- C. Diabetes mellitus.
- D. Síndrome de Cushing.

788. Con relación a la insulino terapia, señale el enunciado correcto:

- A. Se debe rotar en forma sistemática los sitios de inyección de la insulina.
- B. Administrar insulina con jeringuilla de 1ml.
- C. Para limpiar la piel, previo a la inyección de insulina, se utiliza una torunda con alcohol.
- D. Administrar insulina de acción rápida 60 minutos antes de una comida.

789. Paciente de 50 años, se encuentra en recuperación postanestésica luego de una laparotomía exploratoria, con hidratación parenteral, insiste en levantarse para ir al baño. De acuerdo a la escala de riesgo de caída de Morse. Señale ¿Cuál es el riesgo de caída en este paciente?

- A. Bajo.
- B. Alto.
- C. Medio.
- D. No tiene riesgo.

790. Paciente de 37 años, a la valoración de enfermería se detecta disnea, inquietud, confusión, letargo, arritmias, los resultados de la gasometría reportan: pH 7.25, Pa CO₂ 56 mmHg. Señale el trastorno de la gasometría arterial:

Alcalosis respiratoria.

Acidosis metabólica.

Alcalosis metabólica

Acidosis respiratoria.

791. Paciente de 40 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, le prescribe un diurético tiacídico para disminuir el edema de miembros inferiores ¿Qué cuidado de enfermería se debe realizar con este paciente?

A. Administrar dieta rica en potasio.

B. Administrar el diurético en la noche.

C. Incrementar el consumo de sodio en la dieta para restituir las pérdidas electrolíticas.

D. Vigilar la aparición de hipoglicemia.

792. Con relación a las intervenciones de enfermería para un paciente con Accidente Vascular Cerebral hemorrágico (ACV hemorrágico). Señale el enunciado correcto:

A. Mantener la habitación del paciente bien iluminada.

B. Incentivar al paciente a levantarse de la cama por sí mismo.

C. Valoración continua para detectar signos de incremento de la presión intracraneal (PIC).

D. Colocar al paciente en posición prona, durante 15 a 30 minutos varias veces al día.

793. ¿Cuál es el estado nutricional de una paciente de 35 años, con una talla de 147 cm y un peso de 80 kg según el índice de masa corporal?

A. Obesidad media.

B. Normal.

C. Sobrepeso.

D. Obesidad morbida.

794. Paciente con una transfusión de concentrado de glóbulos rojos grupo O negativo.

¿Qué solución intravenosa se puede administrar con el concentrado de glóbulos rojos descrito en caso de requerirlo?

A. Solución salina al 0.9 %.

B. Lactato Ringer.

C. Dextrosa al 5 %.

D. Plasma grupo O positivo.

795. Seleccione el enunciado correcto en relación a la fisiopatología de la úlcera péptica.

A. El daño de la mucosa gastroduodenal por úlcera péptica aumenta la resistencia a las bacterias

B. Las úlceras pépticas ocurren en la mucosa gastroduodenal debido a un aumento de la concentración o acción del ácido gástrico y la pepsina.

C. En la úlcera péptica, los pacientes presentan hipoclorhidria. .

D. El uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) disminuye la inflamación de la mucosa gastroduodenal.

796. Seleccione las manifestaciones clínicas de la úlcera péptica:

1. Dolor en epigastrio.
2. Disminución de la peristalsis.
3. Pirosis.
4. Hipoxia.
5. Hemorragia.
6. Hipotensión.

Respuestas:

- A. 2, 3, 4
- B. 1, 3, 5**
- C. 2, 4, 6
- D. 1, 3, 6

797. ¿Cuál es el cuidado de enfermería en un paciente adulto con tubo endotraqueal y que requiere aspiración de secreciones por sistema abierto?

- A. Aspirar de 10 a 15 segundos en cada ocasión.**
- B. Evitar la hiperventilación previa a la aspiración.
- C. Aspirar las secreciones bucofaríngeas antes que las endotraqueales.
- D. Aspirar de 15 a 30 segundos en cada ocasión.

798. Con relación a la Hepatitis A. Señale el enunciado correcto:

- A. Las manifestaciones clínicas son: fiebre, diarrea, cefalea, dolor abdominal tipo cólico, escalofrío, náusea y en ocasiones vómito.
- B. El período de incubación suele ser de 6 semanas a 6 meses, con un promedio entre 60 y 90 días.
- C. El modo de transmisión es a través de la transfusión sanguínea.
- D. El modo de transmisión es a través de la vía fecal oral.**

799. Seleccione las medidas de prevención de la Hepatitis B.

1. Vacunación a los grupos de riesgo según la normativa del M.S.P. Ecuador.
2. Abastecimiento de agua potable segura y evacuación apropiada de aguas residuales.
3. Monitoreo regular de las coberturas de vacunación en cada distrito de salud.
4. Aplicación de medidas de higiene básicas y lavado meticuloso de las manos.
5. Prácticas de bioseguridad y manejo de materiales cortopunzantes y biológicos.
6. Cuidado en la preparación de alimentos y eliminación sanitaria de las heces.

Respuestas:

- A. 2, 3, 6
- B. 4, 5, 6
- C. 5, 1, 6
- D. 1, 3, 5**

800. Uno de los principales trastornos de líquidos y electrolíticos es la hiponatremia. ¿Qué valor del sodio indica esta alteración?

- A. Sodio sérico < 135 mEq/L.**
- B. Sodio sérico = 135 mEq/L.
- C. Sodio sérico > 145 mEq/L.
- D. Sodio sérico = 145 mEq/L.

801. Con relación a los siguientes resultados de laboratorio:

Na. 140 mEq/LK. 2.7 mEq /L; Ca. 8.9 mg/dL; Mg: 2.1 mg/dL ¿Qué trastorno electrolítico se evidencia?

- A. Hipernatremia.
- B. Hipocalcemia.
- C. **Hipopotasemia.**
- D. Hipermagnesemia.

802. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea utilizados para el tratamiento de Tuberculosis Pulmonar sensible?

- A. **Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.**
- B. Kanamicina, capreomicina, cicloserina y etionamida.
- C. Rifampicina, pirazinamida, capreomicina y etambutol.
- D. Isoniacida, pirazinamida, kanamicina y capreomicina.

803. Paciente de 33 años con diagnóstico de íleo paralítico, con sonda nasogástrica que ha drenado gran cantidad de líquido, muestra signos de hipopotasemia e hiponatremia, tiene prescripción de reposición de las pérdidas gastrointestinales por vía intravenosa. ¿Qué solución utiliza para la reposición?

- A. Dextrosa al 5% en agua.
- B. Dextrosa al 10% en agua.
- C. Solución salina normal.
- D. **Lactato Ringer.**

804. Con relación al infarto agudo del miocardio, señale el enunciado correcto:

- A. **En el electrocardiograma se aprecian ondas Q anormales.**
- B. Las manifestaciones clínicas incluyen disnea paroxística nocturna y ortopnea.
- C. Un examen específico para su diagnóstico es el ecocardiograma.
- D. En la fase temprana suele haber estertores en ambas bases pulmonares.

805. En el tratamiento del dolor oncológico en adultos, de acuerdo con la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud modificada ¿En qué caso se utiliza tramadol?

- A. Escala visual análoga 1- 4
- B. **Escala visual análoga 5-6**
- C. Escala visual análoga 7- 9
- D. Escala visual análoga 10

806. Con relación al electroencefalograma. Señale el enunciado correcto:

- A. Se utiliza para identificar la presencia de circulación colateral cerebral.
- B. Registra la velocidad del flujo sanguíneo de los vasos intracraneales.
- C. **Es útil para el diagnóstico y evaluación de trastornos convulsivos.**
- D. Ayuda a distinguir la debilidad por neuropatía o la resultante de otras causas.

807. Con relación a la resonancia magnética. Señale el enunciado correcto:

- A. **Retirar todos los objetos metálicos del paciente.**
- B. Es útil para obtener imágenes de los implantes cocleares.
- C. Se prohíbe la sedación de los pacientes para realizar este examen.

- D. Se utiliza para corroborar la adecuada implantación de válvulas cardíacas artificiales.
- E.

808. Paciente femenina de 48 años con diagnóstico de cáncer de mama, se le está administrando morfina por vía intravenosa. Señale el cuidado de enfermería en este caso.

- A. Valorar signos de depresión respiratoria.
- B. Observar la presencia de diarrea.
- C. Valorar la aparición de incontinencia urinaria.
- D. Observar signos de hipertensión arterial.

809. Paciente masculino de 58 años con antecedentes de infarto agudo del miocardio hace 35 días, el cual va a ser intervenido de apendicitis aguda. Según la American Society of Anesthesiologists (ASA). ¿Cuál es la clasificación que le corresponde a este paciente?

- A. ASA 1
- B. ASA 4
- C. ASA 2
- D. ASA 3

810. Paciente de 45 años, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Post Anestésicos (UCPA) tras haber sido intervenida bajo anestesia general; despierta solo ante estímulos verbales, logra movilizar los brazos, ventila de forma espontánea pero necesita oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno de 92 %, expansibilidad torácica limitada, la tensión arterial con disminución del 30 % respecto a la cifra pre anestésica. ¿Qué puntuación tiene esta paciente según la escala de Aldrete?

- A. 5 puntos.
- B. 9 puntos.
- C. 8 puntos.
- D. 7 puntos.

811. ¿Cómo se transmite el virus de la Hepatitis C?

- A. A través de la leche materna.
- B. Ingestión de alimentos contaminados.
- C. Por vía hemática.
- D. Contaminación por aguas residuales.

812. En la valoración de enfermería, paciente de 57 años refiere dolor retro esternal intenso de inicio súbito, que se irradia al brazo izquierdo y que persiste pese al reposo, la administración de O2 por bigotera y nitroglicerina sublingual prescritos. Con relación a los antecedentes. ¿Cuál es la situación clínica del paciente?

- A. Insuficiencia cardíaca.
- B. Edema pulmonar.
- C. Infarto agudo del miocardio.
- D. Hipertensión arterial pulmonar.

813. En relación a la enfermedad por el virus de Zika, complete el siguiente enunciado: Los síntomas son: fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares, articulares, malestar general y cefaleas, tienen una duración de _____ La infección durante

el embarazo puede causar _____. Se transmite a través de _____.

- A. 2 a 7 días – microcefalia – picadura de mosquitos infectados del género Aedes.
- B. 3 a 14 días – microcefalia – alimentos contaminados.
- C. 8 a 15 días – macrocefalia – contacto sexual.
- D. 15 a 20 días – macrocefalia – transfusiones sanguíneas.

814. Paciente adulto con resultados de un test de enzimoimmunoanálisis (EIA) en el que se detectan anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). ¿Cuál es la interpretación de los resultados de la prueba?

- A. Tiene SIDA.
- B. Es inmune al VIH.
- C. El VIH está inactivo
- D. Infectado por el VIH.

815. ¿Cuál es la intervención de enfermería en un paciente en estado terminal con necesidad de cuidados paliativos?

- A. Intervenir dependiendo del periodo de supervivencia.
- B. Evitar informar al paciente sobre su enfermedad.
- C. Evitar la sedación que está contraindicada en este caso.
- D. Proporcionar alivio del dolor y síntomas de sufrimiento.

816. Señale el primer eslabón en la cadena de supervivencia en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario.

- A. Reconocimiento del paro cardíaco y activación del sistema de emergencia.
- B. RCP de alta calidad.
- C. Desfibrilación rápida.
- D. Soporte vital avanzado.

817. La adecuada implementación de las maniobras de RCP por el personal de enfermería es esencial para lograr la supervivencia del paciente en paro cardíaco. ¿Cuáles son las características de las compresiones torácicas de alta calidad en un adulto?

- A. Frecuencia de 80 -100 cpm, 2.5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.
- B. Frecuencia de 100 - 120 cpm, 2 cm de profundidad como mínimo, evitar la expansibilidad torácica entre las compresiones e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.
- C. Frecuencia de 100 - 120 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.
- D. Frecuencia de 60 -100 cpm, 5 cm de profundidad como mínimo, permitir que el tórax se expanda e interrumpir las compresiones lo mínimo posible.

818. Un paciente de 50 años sufre una parada cardíaca. ¿Cuál es la relación compresiónventilación que usted aplica a este paciente durante la RCP con dos reanimadores?

- A. 30 compresiones y 2 ventilaciones.
- B. 10 compresiones y 4 ventilaciones.
- C. 15 compresiones y 2 ventilaciones.

D. 40 compresiones y 3 ventilaciones.

819. Señale la opción correcta de las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso.

A. Exantema en forma de mariposa y pericarditis.

B. Hipotensión arterial y creatinina sérica disminuida.

C. Sensación exagerada al frío y fatiga extrema.

D. Lesión eritematosa sobre la superficie de la articulación y debilidad muscular.

820. Paciente con prescripción de oxigenoterapia a 3 litros por minuto. ¿Cuál dispositivo para la administración de oxígeno utiliza?

A. Tubo en T.

B. Cánula Nasal o Bigotera.

C. Mascarilla simple.

D. Mascarilla de reciclamiento parcial.

821. Señale la posición adecuada para una paciente que será intervenida de histerectomía vaginal:

A. Trendelenburg invertida.

B. Decúbito dorsal.

C. Navaja sevillana.

D. Litotomía.

822. Seleccione los momentos de aplicación de la Lista de Verificación de Cirugía Segura:

1. Antes de la inducción de la anestesia

2. Al recibir al paciente en el preoperatorio

3. Antes de la incisión cutánea

4. Después de la inducción de la anestesia

5. Antes que el paciente salga del quirófano.

6. Durante la incisión cutánea

Respuestas:

A. 1, 3, 5.

B. 2, 3, 4.

C. 2, 4, 6.

D. 1, 5, 6.

823. Debemos sospechar una Hemorragia digestiva alta ante todo paciente que presente:

A. Hiperémesis y diarreas.

B. Hematemesis y diarrea.

C. Hemoptisis y melena.

D. Hematemesis y melena.

824. Identifique el propósito de los cuidados paliativos.

A. Cuidar a las personas que tiene enfermedades crónicas, avanzadas e incurables.

B. Establecer un régimen dietético según el curso de la enfermedad.

C. Cuidar a los enfermos por un profesional de la salud especializado.

D. Brindar atención al paciente en centros de salud especializados.

825. Identifique la enzima que se eleva en las primeras horas tras un infarto agudo del miocardio:

- A. Troponina.
- B. Dipeptidasa.
- C. Péptido natriurético de tipo B.
- D. Amilasa sérica.

826. Paciente masculino de 48 años que ingresa al servicio de emergencia tras sufrir una lesión encefálica traumática frontal luego de haber recibido un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, provocándole una contusión cerebral en el sitio de impacto. ¿Qué mecanismo de lesión cefálica recibió el paciente?

- A. Lesión de aceleración.
- B. Lesión rotacional.
- C. Lesión de contragolpe.
- D. Lesión de desaceleración.

827. Paciente de 28 años internada en el servicio emergencia después de golpearse la cabeza con el parabrisas tras chocar su auto con un poste de la luz ¿Qué tipo de lesión encefálica recibió la paciente?

- A. Lesión Rotacional.
- B. Lesión de contragolpe.
- C. Lesión de aceleración.
- D. Lesión de desaceleración.

828. Indique a qué patología hace referencia la definición: Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de sobrecarga hídrica o de perfusión tisular inadecuada, como resultado de la incapacidad del corazón para bombear una adecuada cantidad de sangre para cubrir las demandas del organismo.

- A. Angina de pecho.
- B. Arritmia cardíaca.
- C. Infarto agudo de miocardio.
- D. Insuficiencia cardíaca.

829. Identifique la manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda aislada.

- A. Disnea.
- B. Edema.
- C. Hepatomegalia.
- D. Ascitis.

830. Identifique los cambios fisiopatológicos de la embolia pulmonar.

- A. Disminución del espacio muerto alveolar.
- B. Aumento del lecho vascular pulmonar.
- C. Se presenta insuficiencia del ventrículo izquierdo.
- D. Aumento de la resistencia vascular pulmonar.

831. ¿Cuál de las siguientes condiciones constituye una causa prerrenal de la insuficiencia renal aguda?

- A. Cálculos.
- B. Pielonefritis.
- C. Glomerulonefritis.
- D. Hemorragia.

832. Paciente de 23 años, que acude al servicio de emergencia, por presentar dolor abdominal que comenzó en mesogastrio y luego se ubica en fosa ilíaca derecha intensificándose, acompañado de vómito y fiebre moderada. A la palpación en el punto de Mc Burney el dolor se incrementa a la descompresión. ¿Cuál de las patologías es sugestiva de este tipo de dolor?

- A. Apendicitis aguda.
- B. Colecistitis aguda.
- C. Pancreatitis aguda.
- D. Úlcera péptica.

833. Identifique el cambio físico y funcional relacionado con el envejecimiento.

- A. Vaciamiento gástrico acelerado.
- B. Aumento del gasto cardíaco.
- C. Aumento de la densidad ósea.
- D. Disminución del tono muscular.

834. Indique el trastorno hemorrágico que se caracteriza por la expulsión de sangre por la boca, precedido de tos y procedente del aparato respiratorio subglótico, pulmones y bronquios principalmente.

- A. Epistaxis.
- B. Melena.
- C. Hemoptisis.
- D. Hematemesis.

835. Identifique en qué estadio clínico de la enfermedad del VIH aparecen condiciones clínicas como neumonía bacteriana recurrente, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi y nefropatía asociada al VIH.

- A. Estadio I.
- B. Estadio II.
- C. Estadio III.
- D. Estadio IV.

836. Con relación a la aspiración de secreciones por traqueostomía sistema abierto. Señale el enunciado correcto:

- A. Aspirar por 20 segundos en cada ocasión.
- B. Si el paciente está inconsciente colocarlo en semifowler.
- C. Hiperventilar al paciente previa a la aspiración.
- D. Indicarle al paciente que no tosa entre las aspiraciones.

837. Paciente de 58 años, se encuentra recibiendo concentrado de eritrocitos, transcurrida 30 minutos de su inicio la paciente presenta: fiebre y escalofríos, cefalea y malestar general. Seleccione el orden secuencial de las acciones a seguir: Notifique al médico. Trate los síntomas. Detenga la transfusión. Tome signos vitales.

- A. 1-2-4-3
- B. 2-1-3-4
- C. 4-3-1-2
- D. 3-4-1-2

838. Identifique el cuidado de enfermería que se debe brindar a un paciente ante una transfusión de concentrado de glóbulos rojos:

- A. Utilizar un catéter intravenoso de grueso calibre.
- B. Infundir lentamente en un periodo mayor de 6 horas.
- C. Permeabilizar la vía intravenosa con Dextrosa al 5%
- D. Debe de administrarse lo más fría posible.

839. De las siguientes afirmaciones, seleccione el cuidado de enfermería que se debe brindar a un paciente con Alzheimer.

- A. Promover la independencia en el cuidado personal.
- B. Aplicar restricciones físicas en caso de agitación.
- C. Recomendar siestas diurnas prolongadas.
- D. Incrementar estímulos ambientales.

840. ¿Identifique el mecanismo fisiopatológico de la disnea en la neumonía?

- A. Cuerpo extraño en la luz de los bronquios.
- B. Pérdida de la presión negativa en la cavidad pleural.
- C. Reacción de hipersensibilidad bronquial.
- D. Reacción inflamatoria a nivel alveolar.

841.Cuál de las siguientes opciones corresponde con las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética:

- A. Hipoglucemia - deshidratación - acidosis metabólica
- B. Normoglucemia - sobrehidratación - alcalosis metabólica.
- C. Hipoglucemia - deshidratación - alcalosis metabólica.
- D. Hiperglucemia - deshidratación - acidosis metabólica.

842. ¿Cuál es el medio diagnóstico para confirmar cambios en la celularidad compatible con cáncer de próstata?

- A. Biopsia.
- B. Ecografía.
- C. Biometría hemática.
- D. Espermatoograma.

843. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con las características clínicas de la hepatitis C?

- A. Presencia de heces oscuras y orinas claras.
- B. Presencia de fiebre, inapetencia y dolor abdominal.
- C. No existen secuelas hepáticas en la infección crónica.

D. Presenta un periodo de incubación de 14 a 21 días.

844. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponden a las características clínicas de la Glomerulonefritis?

- A. Hematuria – Edema- Hipertensión arterial.
- B. Hiperalbuminemia – Hipolipidemia – Hipotensión arterial.
- C. Deshidratación – Poliuria – Hipertensión arterial.
- D. Hipotensión arterial- Hematuria- Hiperalbuminemia.

845. Paciente de 53 años ingresa al servicio de emergencia por presentar: disnea con uso de músculos accesorios, malestar general y saturación de O₂ de 80% al ambiente.

Seleccione el diagnóstico enfermero acorde a las características definitorias descritas.

- A. Intolerancia a la actividad.
- B. Patrón respiratorio ineficaz.
- C. Deterioro de la ventilación espontánea.
- D. Disminución del gasto cardíaco.

846. Persona previamente tratada por Tuberculosis (TB), fue declarada curada o tratamiento completo al final del último ciclo de tratamiento y es nuevamente diagnosticada con un episodio recurrente de TB; éste enunciado corresponde a:

- A. Afectado con recaída.
- B. Afectado con tratamiento después de pérdida en el seguimiento.
- C. Afectado con tratamiento después de fracaso.
- D. Caso nuevo.

847. La enfermera de turno realiza la valoración utilizando Dominios NANDA-I a un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), detectó una alteración en el dominio Seguridad-Protección. De los siguientes, seleccione el diagnóstico que según la NANDA-I pertenece a ese dominio:

- A. Deterioro del intercambio de gases relacionado con desequilibrio en la ventilación perfusión manifestado por la disminución en el nivel de CO₂.
- B. Dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos manifestado por cambios en los parámetros fisiológicos.
- C. Riesgo de disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la frecuencia y ritmo cardíaco
- D. Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con retención de secreciones manifestado por sonidos respiratorios anormales.

848. Al realizar la valoración de Enfermería a un paciente de 45 años, el mismo refiere que desde hace más de 15 minutos presenta dolor agudo intenso en el pecho, localizado a nivel subesternal que irradia al cuello, brazos y espalda que no cede con reposo. Este dolor se acompaña de sudoración, fatiga y náuseas. Estas manifestaciones corresponden a un cuadro de:

- A. Angina de pecho.
- B. Síndrome coronario agudo.
- C. Pericarditis.
- D. Trastornos de ansiedad.

849. Paciente femenina de 60 años, diagnosticada con cáncer de mama, que posterior a recibir radioterapia presenta alteraciones en la piel. ¿Qué intervención de enfermería usted realizaría en esta paciente?

- A. Aplicar talco, lociones y ungüentos.
- B. Valorar las vesículas que se formen.
- C. Lavar frecuentemente la zona.
- D. Aplicar apósitos térmicos o hielo.

850. Un paciente que recibe metotrexato para el tratamiento de cáncer digestivo presenta un recuento de plaquetas de 745.000/mm³. De las siguientes acciones de enfermería ¿Cuál se debe evitar?

- A. Administrar enemas, supositorios o laxantes.
- B. Transfusión de plaquetas según prescripción.
- C. Indicar al paciente que el cepillado de dientes sea con un cepillo de cerdas suaves.
- D. Indicar al paciente que se suene la nariz sin hacer demasiada fuerza.

851. Con relación a la trombosis venosa profunda, señale el enunciado correcto:

- A. El reposo en cama aumenta el flujo sanguíneo en las piernas.
- B. La movilización frecuente, incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda.
- C. La estasis venosa ocurre cuando el flujo sanguíneo aumenta.
- D. La coagulación sanguínea alterada es un factor de riesgo.

852. Paciente femenina de 38 años, a la valoración presenta exoftalmos; nerviosismo; sudoración; pulso 110 por minuto; refiere disminución progresiva de peso y mala tolerancia al calor. ¿Esta valoración a qué patología corresponde?

- A. Hipotiroidismo.
- B. Crisis tiroidea.
- C. Hipertiroidismo.
- D. Hipoparatiroidismo.

853. Usuario de 53 años, durante la anamnesis manifiesta sentir dolor persistente, sensación de quemadura a nivel de la boca del estómago; refiere vómito y que las heces son oscuras. ¿A qué patología corresponden estas manifestaciones clínicas?

- A. Úlcera gástrica.
- B. Gastritis aguda.
- C. Pancreatitis aguda.

854. Cirrosis hepática. Paciente de 65 años que presenta en los últimos meses intolerancia al frío, está más estreñida de lo habitual y se encuentra muy cansada. Su voz es ronca. En la exploración física llama la atención la presencia de edema palpebral. Considerando estos datos. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

- A. Hipertiroidismo.
- B. Hipoparatiroidismo.
- C. Enfermedad de Addison.
- D. Hipotiroidismo.

855. Paciente masculino internado en el servicio de medicina interna, a la valoración el paciente refiere dolor abdominal alto que se constata en la palpación de la región epigástrica y se irradia a la espalda, se intensifica con la ingestión de alimentos y no se alivia con antiácidos. En los hallazgos de laboratorio existe una hiperglucemia, las cifras de amilasa sérica y lipasa se encuentran elevadas. Identifique la patología a que corresponde el cuadro clínico.

- A. Várices esofágicas.
- B. Gastritis aguda.
- C. Apendicitis aguda.
- D. Pancreatitis aguda.**

856. El refuerzo de los buenos hábitos dietéticos, encaminado a evitar las temperaturas elevadas de los alimentos, el consumo de café, alcohol, elevar la ingesta de leche, así como la adherencia del tratamiento médico consistente en antiácidos y antagonista de los receptores H₂, son orientaciones que el profesional en enfermería debe proporcionar al paciente con:

- A. Úlcera péptica.**
- B. Síndrome de intestino irritable.
- C. Estreñimiento.
- D. Enfermedad de mala absorción.

857. Indique la solución cristaloide que restaura el volumen intravascular y neutraliza la acidosis.

- A. Solución salina al 3 %
- B. Solución salina al 0.9 %
- C. Lactato de Ringer.**
- D. Albúmina.

858. Paciente masculino de 45 años, que presenta una úlcera duodenal. ¿Qué características clínicas presenta esta patología? Respuestas:

El dolor ocurre cuando el estómago está vacío.

Existe una secreción normal o baja de ácido clorhídrico.

Se presentan flatulencias.

Es improbable que la úlcera se perfora.

En el postoperatorio inmediato de una intervención quirúrgica renal. ¿Cuál es la complicación principal que se puede producir?

- A. Hemorragia.**
- B. Infarto.
- C. Infecciones.
- D. Acodadura de la sonda vesical.

859. Paciente con una puntuación de 12 según instrumento de valoración de Johns Hopkins, ¿qué medida restrictiva debe aplicar para la prevención de caídas según el riesgo del paciente?

- A. Permanecer con el paciente mientras usa el baño.**
- B. Ayudar al paciente cuando va al baño.
- C. Orientar al paciente sobre la ubicación del baño.
- D. Asegurar una adecuada iluminación sobre todo en la noche.

860. Paciente masculino con angina de pecho que tras realizar una caminata exhausta, presenta dolor precordial que se irradia al brazo izquierdo, luego de suspendida la actividad, estar el paciente en reposo y administrarle nitroglicerina sublingual el dolor desaparece.

¿Qué tipo de angina presenta el paciente?

- A. Angina inestable.
- B. Angina variante.
- C. Angina estable.
- D. Angina refractaria.

861. De las siguientes opciones ¿Cuál es el cambio que se da en relación con los órganos de los sentidos en el proceso de envejecimiento?

- A. Disminución del sentido del gusto de los sabores dulce y salado.
- B. Insensibilidad a la luz.
- C. Disminución del sentido del gusto de los sabores ácido y amargo.
- D. Aumento de células en los conductos nasales.

862. Las manifestaciones clínicas: Dolor torácico de inicio súbito que persiste a pesar del reposo y la nitroglicerina; pulso irregular; piel fría, húmeda, diaforética y pálida. ¿A qué patología corresponden?

- A. Infarto agudo de miocardio.
- B. Insuficiencia cardíaca.
- C. Trombosis venosa profunda.
- D. Edema pulmonar.

863. Seleccione los criterios para predecir la gravedad de la pancreatitis dentro de las siguientes 48h luego de la admisión hospitalaria.

1. Descenso del hematocrito mayor del 10 %
2. Hemoglobina de 13 mg/dL
3. PO₂ menos de 60 mm Hg
4. Calcio sérico mayor de 10 mg/dL
5. PO₂ mayor de 75mm Hg
6. Nitrógeno ureico en sangre mayor de 5mg/dL

- A. 1, 2, 5
- B. 3, 4, 5
- C. 1, 3, 6
- D. 2, 4, 6

864. ¿Cuál es el antídoto del paracetamol?

- A. N-acetylcisteína.
- B. Naloxona.
- C. Neostigmine.
- D. Flumazenil.

865. Seleccione una medida de control ambiental que debe aplicar para la prevención de tuberculosis en las unidades de salud:

- A. Evitar la circulación de personas con TB bacteriológicamente positiva fuera de sus habitaciones.

B. Instalación de sistema de ventilación con presión negativa en laboratorios y salas donde se efectúan procedimientos que induzcan tos.

C. Colocar mascarilla quirúrgica a los afectados con TB cuando se tengan que trasladar al interior o exterior del establecimiento de salud.

D. Usar respiradores N95 durante la realización de bronoscopias u otros procedimientos que inducen tos o generan aerosoles.

866. ¿Cuál es una medida de control administrativo que aplica para la prevención de tuberculosis en el primer nivel de atención?

A. Minimizar el uso de procedimientos que induzcan la tos en afectados con TB bacteriológicamente positiva.

B. Uso de respiradores N95 durante la toma de muestras de esputo o en el traslado de afectados con TB bacteriología positiva.

C. Entrevista con los contactos para el oportuno registro y control dentro de las 72 horas de iniciado un tratamiento antituberculoso.

D. En el momento de ingreso al establecimiento de salud, realizar el triaje de los usuarios con tos.

867. Adulto mayor con diagnóstico de diabetes acude a emergencia por presentar desorientación, disnea, vómitos, dolor abdominal, y glicemia de 350 mg/dL. De los siguientes enunciados escoja la fase de la enfermedad en la que se encuentra el paciente.

A. Sintomática.

B. Inestable.

C. Declive

D. Crisis.

868. A la valoración de enfermería usted identifica un paciente adulto mayor que presenta pérdida de firmeza en la piel, disminución de la capacidad visual y deterioro celular, lo que afecta su salud y bienestar. ¿Cuál es la teoría de envejecimiento que hace referencia el enunciado?

A. Teoría no estocástica

B. Teoría estocástica.

C. Teoría de la desvinculación.

D. Teoría de la actividad.

869. En los resultados obtenidos de los exámenes de laboratorio aplicados a un paciente adulto mayor con deterioro cognitivo se evidencia alteraciones electrolíticas. Señale la patología que debe abordar para gestionar los cuidados enfermeros:

A. Demencia.

B. Depresión.

C. Delirio.

D. Demencia vascular.

870. Los cuidados postmortem como la colocación del cuerpo en posición anatómica y la prótesis dental dentro de la boca, se deben realizar antes de que aparezca el signo de muerte denominado:

A. Lividez cadavérica.

B. Rigidez cadavérica.

- C. Enfriamiento cadavérico.
- D. Deshidratación cadavérica.

871. Usted atiende a una familia de tres hermanos que sufrieron la pérdida de su madre. En la entrevista se evidencia que se encuentran realizando planes familiares y muestran una actitud de interés en los mismos. ¿En qué etapa o fase del duelo se encuentran?

- A. Aceptación.
- B. Depresión.
- C. Negación.
- D. Negociación.

872. Al aplicar compresiones torácicas en un adulto que sufrió una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuál es la profundidad de las compresiones, para considerar como de alta calidad la RCP?

- A. 7 cm.
- B. 4 cm.
- C. 3 cm.
- D. 5 cm.

873. ¿Cuál de los siguientes factores patológicos está relacionado con un pronóstico favorable en el cáncer mamario?

- A. Tumor no invasivo mayor de 1 cm.
- B. Tumor bien diferenciado.
- C. Invasión vascular o linfática.
- D. Ganglios linfáticos axilares positivos.

874. ¿Cuál de los siguientes exámenes diagnósticos es confirmatorio de cáncer de próstata?

- A. Biopsia prostática.
- B. Examen recto digital.
- C. Antígeno prostático específico.
- D. Ecografía transrectal.

875. Identifique los criterios del Dengue Grave:

- A. Fiebre, exantemas y leucopenia.
- B. Artralgia, vómitos y prueba de torniquete positiva.
- C. Choque, disnea y alteración del nivel de conciencia.
- D. Dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas y hepatomegalia.

876. Los fármacos antineoplásicos pueden ser irritantes. ¿Cual de las siguientes opciones describe mejor el efecto irritante?

- A. Inducen reacciones inflamatorias, pero casi nunca daño hístico permanente.
- B. Nunca debe administrarse en venas periféricas de la mano o la muñeca.
- C. Causan necrosis tisular y daño a tendones, nervios y vasos sanguíneos subyacentes.
- D. Provoca una reacción circunscrita y dolorosa.

877. ¿Cuál es la causa que provoca daño renal durante la administración de quimioterápicos?

- A. Disminución de la excreción urinaria de ácido úrico por lisis tumoral.
- B. Aumento del potasio tras liberación del contenido extracelular a la circulación por lisis tumoral.
- C. Incremento de la excreción urinaria de ácido úrico por lisis tumoral.
- D. Disminución del potasio tras liberación del contenido intracelular a la circulación por lisis tumoral.

878. Con relación a los cuidados para el manejo adecuado de las náuseas y vómitos en personas en la fase final de la vida. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones permite disminuir estas molestias?

- A. Brindar infusiones durante las comidas.
- B. Preferir dieta líquida, fraccionada.
- C. Iniciar el día con alimentos secos como tostadas o galletas de sal.
- D. Suministrar bebidas de canela, menta, laurel y jengibre

879. Como profesional de enfermería, usted brinda cuidados paliativos domiciliarios a un paciente que presenta cuadro de deshidratación a causa de abundantes vómitos. ¿Qué vía de administración se utiliza como primera opción para la reposición de líquidos, ante la imposibilidad de obtener un acceso intravenoso?

- A. Vía oral.
- B. Vía intramuscular.
- C. Vía rectal.
- D. Vía subcutánea.

880. Como profesional de enfermería usted atiende a un paciente con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II, con tratamiento de Insulina. ¿Cuál es el orden correcto de las actividades preprandiales?

- A. Ingerir alimentos - análisis de glicemia capilar - inyección de insulina.
- B. Ingerir alimentos - inyección de insulina - análisis de glicemia capilar.
- C. Análisis de glicemia capilar - ingerir alimentos - inyección de insulina.
- D. Análisis de glicemia capilar - inyección de insulina - ingerir alimentos.

881. ¿Cuál de las siguientes estrategias contribuye a disminuir la Presión Intracraneal (PIC) en un paciente con hemorragia subaracnoidea?

- A. Conservar la elevación de la cabeza de 30 a 45°, a menos que esté contraindicada.
- B. Despertar al paciente frecuentemente para vigilar el estado de conciencia.
- C. Realizar cambios frecuentes de posición para favorecer el drenaje venoso.
- D. Fomentar el pujo o uso de enemas para la evacuación de las heces fecales.

882. Paciente hospitalizado con diagnóstico de Diabetes, en su tratamiento habitual recibe insulina, al momento de administrar el medicamento identifica en la zona de aplicación eritema, hinchazón y aparición de habones. ¿Cuál es la complicación de la terapia insulínica que presenta?

- A. Reacciones alérgicas sistémicas.
- B. Reacciones alérgicas locales.
- C. Lipodistrofia por insulina.

D. Resistencia a la insulina inyectada.

883. Adulto mayor ingresa al servicio médico por presentar hipertensión, debilidad muscular, vómitos deshidratación, al examen físico se observa reflejos osteotendinosos disminuidos, los resultados de laboratorio muestran los siguientes datos: Na: 135mEq/L; K: 3,5 mEq/L; Ca: 12.5mg/dL, seguidamente de un electrocardiograma que reporta bloqueos cardíacos. ¿Cuál es la alteración electrolítica que presenta el paciente?

- A. Hipocalcemia.
- B. **Hipercalcemia.**
- C. Hipercalemia.
- D. Hipocalemia

884. A la valoración de enfermería un paciente presenta los siguientes valores en los signos vitales: PA:150/100 mmHg, FC:120 latidos por minuto, de acuerdo al protocolo se realiza un electrocardiograma en el que se observa cambios que reflejan isquemia. ¿Cuál es el patrón funcional de Gordon que se encuentra alterado?

- A. **Actividad - Ejercicio.**
- B. Nutricional - Metabólico.
- C. Cognitivo - Perceptivo.
- D. Eliminación.

885. Paciente hipertensa ingresa a emergencia para recibir tratamiento intravenoso, a la valoración de enfermería identifica la presencia de coágulos de sangre dentro de la vía como resultado del enroscamiento del equipo de venoclisis, ¿Cuál es el cuidado oportuno que se aplica para este caso?

- A. **Suspender la solución y colocar en otro sitio el catéter.**
- B. Irrigar u ordeñar para mejorar la permeabilidad del catéter.
- C. Aumentar la velocidad de infusión y limpiar el área del catéter.
- D. Aspirar el coágulo del equipo y purgar el equipo de venoclisis.

886. Al atender a un paciente con Síndrome de Compresión Medular secundario a metástasis ósea en la columna vertebral, se administra un opioide para el alivio del dolor, adicionalmente se emplea otro medicamento como analgésico adyuvante. ¿Qué tipo de medicamento puede utilizarse como analgésico adyuvante en este caso?


- A. Miorelajantes.
- B. Anticonvulsivantes.
- C. **Corticoides.**
- D. Antidepresivos.

887. ¿Qué patrón respiratorio se muestra en la imagen?



- A. **Respiración de Cheyne-Stokes.**
- B. Respiración de Biot.
- C. Respiración de Kussmaul.
- D. Respiración Eupneica.

888. Identifique el patrón respiratorio que se muestra en la imagen:



- A. Respiración de Biot.
- B. Respiración de Cheyne-Stokes.
- C. Respiración Eupneica.
- D. Respiración de Kussmaul.**

889. ¿Qué patrón respiratorio se describe a continuación? Ciclo regular en el que se incrementa la frecuencia y la profundidad de la respiración, después decrece hasta ocurrir apnea.

- A. Respiración de Kussmaul.
- B. Respiración de Biot.
- C. Respiración de Cheyne-Stokes.**
- D. Respiración eupneica

890. ¿Qué dispositivo de administración de oxígeno corresponde a un sistema de flujo alto?

- A. Sonda bucofaríngea.
- B. Mascarilla de reciclamiento parcial.
- C. Mascarilla simple.
- D. Mascarilla Venturi.**

891. ¿A qué fase del modelo evolutivo de las enfermedades crónicas corresponde la siguiente descripción? "Se caracteriza por exacerbación de los síntomas, desarrollo de complicaciones o reactivación de una enfermedad en remisión. Período de incapacidad para mantener los síntomas bajo control o reactivación de la enfermedad; dificultad para realizar las actividades cotidianas."

- A. Inestable.**
- B. Declinación.
- C. Asintomática.
- D. Sintomática.

892. Adulto mayor ingresa al servicio médico por presentar hormigueo en los dedos de las manos, pies y en región peri bucal, al examen físico se observa reflejos osteotendinosos aumentados, los resultados de laboratorio muestran los siguientes datos: Na: 135mEqL; K: 3,5 mEqL; Ca: 7.0mg/dL, seguidamente de un electrocardiograma que reporta intervalo QT y segmento ST prolongados. ¿Cuál es la alteración electrolítica que presenta el paciente?

- A. Hipercalcemia.
- B. Hipocalcemia.**
- C. Hipercalemia.
- D. Hipocalemia.

893. Adulto mayor hospitalizado con diagnóstico de Neumonía, al realizar la monitorización usted identifica que el paciente presenta alteraciones como hipotensión e hipotermia, los resultados de los exámenes de laboratorio revelan una hemoglobina de 8 mg/dL. ¿Tomando en cuenta lo descrito, cuál de los siguientes métodos proporciona datos inexactos?.

- A. Gasometría arterial.
- B. Oximetría de pulso.**
- C. Gasometría venosa.
- D. Capnografía.

894. ¿Cuál es el principal cuidado de enfermería que se debe realizar al administrar Gluconato de Calcio por vía intravenosa?

- A. Valorar con frecuencia infiltración por el riesgo de extravasación, celulitis o necrosis.**
- B. Administrar directo el medicamento para evitar las complicaciones como arritmias.
- C. Educar al paciente sobre la ingesta de alimentos con vitamina D para mejorar la absorción.
- D. Valorar los niveles de electrolitos para evaluar la presencia de hipocalcemia.
- E.

895. A la valoración médica una paciente con antecedentes de cáncer de mama presenta complicaciones en su cuadro clínico, se identifica metástasis a nivel pulmonar y requiere ajustes en el esquema terapéutico. ¿En que fase del modelo evolutivo de las enfermedades crónicas se encuentra la paciente?

- A. Sintomática.
- B. Declive.
- C. Inestable.**
- D. Crisis.

896. Se comunica al médico que un paciente presenta a la valoración de enfermería edemas en miembros inferiores +++, quien prescribe administrar furosemida para su tratamiento. ¿Cuál es el principal cuidado de enfermería en la administración del fármaco?

- A. Controlar la presión arterial y manejo de electrolitos.**
- B. Vigilar signos de hepatotoxicidad y úlceras gástricas.
- C. Vigilar la presencia de diarrea, urticaria y candidiasis.
- D. Controlar hipersensibilidad y erupción cutánea.

897. Durante su turno en el servicio Oncológico un paciente con diagnóstico de cáncer terminal presenta dolor EVA 10/10 de intensidad, el médico prescribe administrar morfina. De las siguientes intervenciones cuál es el cuidado de enfermería prioritario para la administración de este medicamento.

- A. Valorar la hepatotoxicidad y los tiempos de coagulación
- B. Monitorizar la presión arterial y la frecuencia respiratoria.**
- C. Monitorizar el gasto cardíaco y el balance hídrico.
- D. Valorar la motilidad intestinal y disminución del peristaltismo.

898. ¿Cuál es el porcentaje de agua corporal que le corresponde al adulto mayor?

- A. 50 %
- B. 60 %
- C. 45 %**
- D. 78 %

899. Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para realizar cuidados de la vida diaria, además al examen físico se observa la necesidad de apoyarse para deambular. ¿Cuál es el instrumento que utilizaría para hacer la valoración según los datos descritos?.

- A. Lawton y Brody.
- B. Yesavage.
- C. Pfeiffer.
- D. Índice de Katz.

900. Adulto mayor acude a la consulta externa acompañado de su hija, a la entrevista manifiesta que presenta dificultades para recordar datos como su nombre, fechas, dirección de su domicilio, entre otros. ¿Cuál es la escala que debe utilizar para hacer la valoración de este caso?.

- A. Pfeiffer.
- B. Índice de Katz.
- C. Lawton y Brody.
- D. Yesavage.

901. Paciente adulto mayor acude al hospital por presentar desorientación, vómitos, agitación e irritabilidad, de acuerdo a la prescripción médica le indican administrar una solución hipertónica para manejo de hiponatremia. ¿Cuál es la solución que usted debe administrar?

Lactato Ringer.

Solución Salina al 0.45%

Solución Salina al 3%

Dextrosa en Solución Salina 5%

902. En los pacientes adultos mayores que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) tienen riesgo de presentar alteraciones. ¿Cuál es el medio diagnóstico de rutina que se debe realizar?

- A. Troponinas.
- B. Colesterol.
- C. Gasometría arterial.
- D. Electrolitos en suero.

903. Paciente adulto mayor con antecedentes de diabetes presenta a la valoración de enfermería déficit de movimiento de hemitórax del lado derecho. Señale con qué patología se puede asociar para gestionar los cuidados enfermeros:

- A. Demencia vascular.
- B. Demencia senil.
- C. Parkinson.
- D. Delirio.

904. Al realizar la evaluación del adulto mayor, se identifica un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, presenta gran esfuerzo para encontrar respuestas a preguntas referentes a su familia y de manera reiterada solicita retroalimentación sobre su trabajo. Señale con qué patología esta asociada para gestionar los cuidados enfermeros:

- A. Delirio
- B. **Demencia.**
- C. Parkinson.
- D. Demencia vascular

905. Paciente de 70 años permanece en reposo absoluto por diagnóstico de prótesis total de cadera, al realizar medidas de higiene y confort se observa en región sacra una úlcera de presión grado III. ¿Cuál es la principal característica que presenta este estadio?

- A. **Pérdida completa del espesor de piel grasa visible.**
- B. Pérdida parcial del espesor de piel aparición de ampolla.
- C. Piel íntegra con eritema no blanqueante.
- D. Pérdida completa del espesor de los tejidos.

906. Durante su turno un paciente con diagnóstico de cáncer de Colon, permanece álgido con dolor 10/10 en escala de EVA, el médico para su tratamiento prescribe Fentanilo, sin embargo, al momento de la administración usted observa que presenta intoxicación asociada al fármaco. ¿Cuál es el antídoto que debe preparar para revertir la acción del medicamento?

- A. Flumazenil.
- B. N-Acetilcisteína.
- C. **Naloxana.**
- D. Vitamina K.

907. Paciente ingresa a emergencia aletargado, a la valoración de enfermería presenta vómitos y dolor abdominal en cuadrante superior derecho, los medios diagnósticos indican alteración en la función hepática y hepatomegalia, los resultados del análisis muestran una intoxicación por paracetamol. ¿Cuál es el antídoto que debe preparar para revertir la acción del medicamento?

- A. Naloxana.
- B. Flumazenil.
- C. Vitamina K.
- D. **N-Acetilcisteína.**

908. Seleccione los atributos que debe tener una atención a domicilio por parte de los profesionales de enfermería gestores de casos:

1. Personalización del servicio de atención.
2. Mayor accesibilidad de pacientes y cuidadores a los profesionales, minimizando barreras.
3. Garantizar el uso adecuado del material de ayudas técnicas para el Cuidado.
4. Cuidadora familiar incluida como usuario dentro de la cartera de servicios de la Atención Primaria.
5. Efectividad en la capacidad de respuesta del servicio de atención domiciliaria.
6. Facilitar la mejora de la atención domiciliaria al equipo de atención primaria

Respuestas:

- A. 1, 2, 4, 5
- B. 2, 3, 5, 6.
- C. 1, 3, 4, 5
- D. 2, 4, 5, 6.

909. Seleccione los diagnósticos enfermeros más frecuentes con los que como gestor de casos el profesional enfermero realiza las intervenciones:

- 1.Deterioro de la movilidad física
- 2.Deterioro de la integridad de la piel
- 3.intercambio gaseoso alterado
- 4.Incontinencia de esfínteres
- 5.Cansancio en el rol cuidador.
- 6.Déficit del volumen de líquidos

Respuestas:

- A. 2, 3, 5, 6.
- B. 1, 3, 4, 5.
- C. 2, 4, 5, 6.
- D. 1, 2, 4, 5

910. La inmunidad que se consigue cuando se administra una vacuna corresponde a:

- A. Inmunidad artificial activa.
- B. Inmunidad natural pasiva.
- C. Inmunidad natural activa.
- D. Inmunidad artificial pasiva.

911. Señale el campo de acción que tienen los Equipos de Atención Integral de Salud (E.A.I.S).

- A. Nivel de complejidad del paciente.
- B. Nivel de atención de Salud.
- C. Nivel familiar y comunitario.
- D. Nivel de organización de los escenarios de atención.

912. El modelo de Atención Integral de Salud, propuesto por el MSP del Ecuador, se basa en los siguientes principios:

- A. Vulnerabilidad, selectividad, agilidad y seguimiento.
- B. Honestidad, agilidad, oportunidad y bajo costo.
- C. Responsabilidad, vulnerabilidad, bajo costo, organización
- D. Universalidad, equidad, integralidad y participativo

913. Paciente de 55 años de sexo masculino, acude al área de emergencia por presentar: anorexia, sudoración nocturna y baja de peso además de tos productiva, con 1 mes de evolución, con antecedentes de diagnóstico de tuberculosis, drogoresistente hace 5 años. Recibe tratamiento de tuberculosis primera fase. Sus signos vitales son: T: 40 °C; FC: 95/min; TA: 110/90mmHg; FR 22/min; Sat.O2: 94%. En el examen de laboratorio complementario se diagnostica tuberculosis, en la tomografía de tórax se observan condensaciones con excavaciones, post-primaria. Además, en la prueba de fármaco

presenta resistencia a fluoroquinolona y a los tres medicamentos inyectables de segunda línea. ¿Cuál es el tipo de resistencia de los medicamentos, basado en este caso?

- A. Extensamente resistente (XDR).
- B. Monorresistencia.
- C. Multidrogorresistencia (MDR).
- D. Polirresistencia.

914. Mujer lleva a la unidad de salud por control de niño sano a su hijo de 11 meses, luego de la revisión médica, el profesional encuentra que el niño está bajo de peso para la edad y solo ha recibido las vacunas de los 2 meses, por lo tanto, remite a la madre al vacunatorio. El profesional de enfermería revisa el carnet y corrobora lo reportado por el médico. ¿Qué intervención de enfermería corresponde?

- A. Aplicar 2da. Dosis de: neumococo y pentavalente.
- B. Aplicar 2da. Dosis de: Rotavirus, fIPV, neumococo y pentavalente.
- C. Aplicar 2da. Dosis de: bOPV, neumococo y pentavalente.
- D. Aplicar 2da. Dosis de: fIPV, neumococo y pentavalente.

915. De acuerdo a Henderson, ¿Cuál es la función principal de la Enfermería?

- A. Ayudar al individuo sano o enfermo a satisfacer las necesidades básicas.
- B. Promover una vida saludable.
- C. Fomentar la conducta del autocuidado.
- D. Identificar los patrones funcionales alterados.

916. Marcos y Laura estuvieron casados 8 años, luego del accidente de tránsito que sufrió Marcos su esposa enviudó y dejó en la orfandad a una niña de 2 años y a un niño de 5 años. Su esposa Laura contrajo matrimonio por segunda ocasión con Pedro quien se ha convertido en el sustento de la familia. ¿A qué tipo de familia corresponde el caso?

- A. Extensa
- B. Monoparental
- C. Nuclear
- D. Reconstituida

917. Una señora acude al centro de salud con su hijo de 7m 11días de edad, por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.4 °C; frecuencia cardiaca: 120/min; presión arterial; 90/62mmHg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación, verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: Pentavalente 3 dosis, Polio Oral 3dosis, Neumococo 3 dosis y Rotavirus 1 dosis administrada a los 2m 10 días. ¿Qué decisión debe tomar el profesional de enfermería con respecto a la administración de la vacuna rotavirus?

- A. Debe administrar la segunda dosis de rotavirus debido a su edad.
- B. No administrar rotavirus a esta edad porque podría causar invaginación intestinal
- C. Reiniciar el esquema de vacunación con la primera dosis y la segunda a las 2 semanas.
- D. Está contraindicado la administración de Rotavirus porque tiene 7 meses 11 días.

918. ¿Qué acción ejerce el Primer Nivel de atención del Sistema Nacional de Salud?

- A. Resuelve los problemas de salud de alta complejidad.
- B. Garantiza una referencia y contrarreferencia adecuada.

- C. Atención ambulatoria y hospitalización.
- D. Experimentación Clínica en Centros de Diagnóstico.

919. Una señora acude al centro de salud con su hijo de 10 m 15 días de edad, por control de niño sano, sus signos vitales son: temperatura 37.3 °C; frecuencia cardiaca: 120 /min; presión arterial; 90/62 mmHg; frecuencia respiratoria 40/min, al observar el carnet de vacunación, verifica que tiene administrada las siguientes vacunas: pentavalente 3 dosis, Polio 0 dosis, Neumococo 3 dosis y Rotavirus 2 dosis. ¿Qué acción de enfermería aplicaría en este caso?

- A. Administrar la dosis completa de 0,5ml de fIPV IM.
- B. Administrar la 1° dosis de bOPV.
- C. Administrar la 1° dosis de fIPV.
- D. Administrar la 1° dosis de bOPV y la 2° a las 2 semanas.

920. Al momento de realizar la visita domiciliaria, se identifica a Guillermo quien fue diagnosticado de Diabetes mellitus tipo II hace un año; señala que su esposa prepara la misma dieta para toda la familia, su hijo mayor aporta con las compras de medicamentos y su hijo menor le dedica una hora diaria para hacer ejercicios y todo esto ha permitido que Guillermo se sienta muy satisfecho y pueda mejorar su estado de salud. ¿Según la prueba de Apgar Familiar que parámetro estamos midiendo?

- A. Adaptación
- B. Gradiente de recursos
- C. Afecto
- D. Participación

921. En las visitas domiciliarias de seguimiento, el personal de enfermería del centro de salud se encontró con Carlos de 66 años, que habita en una vivienda de infraestructura mixta y no cuenta con los servicios básicos indispensables, el acceso a su vivienda es complicado. Carlos tiene sobrepeso, con amputación de pierna izquierda hace 1 mes, padece de Diabetes mellitus tipo 2 hace 15 años, diagnosticado por médico tratante. Además, tiene hipertensión arterial hace 10 años, nefropatía crónica hace 8 años, por lo que recibe diálisis semanales hace 4 años. Carlos vive con su esposa de la misma edad, por lo tanto ambos no laboran, tienen 3 hijos quienes de manera limitada se hacen cargo de sus necesidades económicas. Observando los antecedentes de Carlos el personal de enfermería requiere planificar sus actividades intramurales y extramurales para dar seguimiento individual y familiar. Según el criterio de dispensarización ¿A qué grupo de clasificación pertenece?

- A. GRUPO IV
- B. GRUPO I
- C. GRUPO II
- D. GRUPO III

922. En el sistema integrado de vigilancia epidemiológica, se crea la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tiene como subsistema el SIVE ALERTA. ¿A qué corresponde el SIVE ALERTA?

- A. A enfermedades que son parte de programas de intervención del Ministerio de Salud Pública.
- B. Registro de egresos hospitalarios.
- C. **A emergencias sanitarias.**
- D. Registro de mortalidad.

923. Una enfermera en servicio de salud rural al inicio de su labor extramural observa que no existe intervención de actores sociales, siendo este uno de los aspectos fundamentales del Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS), como la dinamización de la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y contraloría social. En este proceso se incluye la conformación del comité local de salud en coordinación con el establecimiento de salud, para identificación de acciones para el fortalecimiento de la gestión comunitaria ¿En qué fase se debe realizar el proceso antes mencionado?

- A. **Segunda fase**
- B. Primera fase
- C. Tercera fase
- D. Cuarta fase

924. Mujer lleva al puesto de salud a su hijo de 15 meses de edad para revisión médica y para la administración de vacunas, al llegar a la unidad operativa se le indica que el médico no está atendiendo porque salió a visitas domiciliarias, el profesional de enfermería localiza el historial médico del niño, solicita el carnet de vacunación, luego de la revisión se encuentra que el niño se ha vacunado solo hasta los cuatro meses de edad.

Inmediatamente solicita a la madre le permita medir y pesar al niño obteniendo como resultado que presenta peso y talla bajo para la edad; entrevista a la madre sobre el lugar de residencias y razones por las cuales no llevó al niño a la vacuna, ella señala que viven en un lugar muy alejado y su situación económica no les permite acercarse a la Unidad Operativa. El profesional de enfermería sensibiliza a la madre sobre la importancia de las inmunizaciones en la protección de la salud y explica sobre las vacunas que administrará y planifica la visita domiciliaria a fin de evitar que el niño se quede sin recibir las vacunas restantes. ¿Qué vacunas se le debe administrar al niño de acuerdo al cuadro de Inmunizaciones?

- A. **DPT+HB y OPV+SRP+Varicela.**
- B. Pentavalente + OPV+ Rotavirus.
- C. DPT+ OPV + Neomococo.
- D. DPT+HB y OPV+ SRP.

925. La enfermera del centro de salud al realizar trabajo comunitario ha podido analizar algunos riesgos de salud en los habitantes de la comunidad. Encontró: desnutrición, antecedentes de enfermedades prevalentes de la infancia, enfermedad crónica en la madre o en el lactante, enfermedades diarreicas y respiratorias frecuentes en el lactante, dificultades o rechazo a la lactancia o alimentación ¿A qué tipo riesgo de salud se refiere el enunciado?

- A. Riesgos socioeconómicos.
- B. **Riesgos Biológicos.**

- C. Riesgos de Prestaciones.
- D. Riesgos en el ciclo de vida.

926. Enfermera del centro de salud, necesita medir las condiciones de vida familiar y comunitario. ¿Cuáles son las variables que debe usar para medir estas condiciones?

- A. Índice de desarrollo humano, distribución de ingresos y medir la pobreza.
- B. Indicadores sanitarios, medioambientales, sociodemográficos.
- C. Saber leer y escribir, conocimientos básicos de salud.
- D. Miembros de la familia, parentesco, riesgo individual, familiar y comunitario.

927. Los indicadores de salud de una población basados en las interacciones, entre las características individuales, los factores sociales y económicos, y los entornos físicos en estrecha relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con su producción. ¿A qué definición se está refiriendo el enunciado?

- A. Estilos de vida saludables.
- B. Determinantes de la salud.
- C. Gestores comunitarios.
- D. Promoción de la salud.

928. La ficha familiar, es un instrumento esencial del MAIS-FCI que nos permite vigilar el estado de salud de la población sus necesidades y desarrollar las mejores políticas de salud para garantizar la prestación de servicios sanitarios, además, sirve para determinar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se determinan en la ficha familiar?

- A. Riesgos de accidentes en el hogar, riesgos de desarrollar preeclampsia.
- B. Riesgos de accidentes en la escuela, riesgo de accidentes en la comunidad
- C. Riesgo de violencia, riesgo de alcoholismo, riesgo drogas tabaquismo.
- D. Riesgo biológico, riesgo socio- económico, riesgo ambiental.

929. Durante la visita domiciliaria, usted identifica un paciente con hipertensión arterial. Establece la necesidad de trabajar en un plan de cuidados individualizados sobre estilo de vida saludable y actividades que promuevan el equilibrio entre el descanso y la actividad, dirigido al paciente y su familia ¿Cuál es el rol que desempeña el personal de enfermería frente a este caso?

- A. Colaboradora.
- B. Defensora del paciente.
- C. Cuidadora.
- D. Consejera.

930. Durante la visita domiciliaria a una comunidad, usted identifica la presencia de pediculosis en niños de una escuela. Una de sus funciones es la educación sanitaria , monitorizar y dar el seguimiento a los brotes de piojos. ¿Cuál es el rol que desempeña el personal de enfermería frente a este caso?

- A. Epidemióloga.
- B. Defensora del paciente.
- C. Consejera.
- D. Agente de cambio.

931. Durante la visita domiciliaria a una familia nuclear, la madre refiere que su esposo le castiga a su hijo todo el tiempo y al día siguiente le lleva un regalo. Según los mecanismos adaptativos del ser humano. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que presenta el padre?

- A. Desplazamiento.
- B. Formación de una reacción.
- C. Identificación.
- D. **Anulación retroactiva.**

932. En la visita domiciliaria se identifica un paciente con Diabetes tipo 2. Al interrogatorio manifiesta que está preocupado actualmente por el problema de salud que enfrenta y considera cambiar su conducta alimentaria, además, solicita información sobre la dieta. ¿Cuál es la fase del cambio de la conducta de salud que presenta el paciente?

- A. Fase de precontemplación.
- B. **Fase de contemplación.**
- C. Fase de preparación.
- D. Fase de acción.

933. Usted planifica una visita domiciliaria a una comunidad donde se identifica problemas de desnutrición en niños menores de 5 años en una zona urbano-marginal. Como personal de enfermería debe realizar un plan de cuidados. ¿Cuál es el diagnóstico de enfermería principal que usted utiliza en este caso?

- A. **Salud deficiente de la comunidad.**
- B. Gestión ineficaz de la salud familiar.
- C. Mantenimiento ineficaz de la salud.
- D. Disposición para mejorar la gestión de la salud.

934. En el centro de salud donde usted labora debe desarrollar un instrumento técnico y metodológico que le permita conocer en forma gráfica a los actores sociales de una parroquia. Para identificar factores de riesgo e implementar acciones en sus intervenciones. ¿Cuál es el instrumento que va a desarrollar?

- A. Sala situacional.
- B. Diagnóstico dinámico.
- C. Diagnóstico situacional.
- D. **Mapa parlante.**

935. Usted realiza una visita domiciliaria a una comunidad con problemas de desnutrición. Establece como objetivo principal brindar educación sobre alimentación saludable a madres con hijos menores de 5 años, el mismo que será medido a largo plazo. ¿Cuál es la etapa de la visita a la que se hace referencia?

- A. **Planificación de los cuidados.**
- B. Valoración.
- C. Ejecución de cuidados.
- D. Evaluación de la visita.

936. Cuidados médicos y /o de enfermería a personas que, por enfermedad, discapacidad, emergencia o estado terminal de alguna enfermedad requieran de atención y no puedan movilizarse a la unidad. Además, el equipo integral de salud estará obligado a realizar seguimiento y evaluación de estas personas. Identificación oportuna de riesgos y/o daños

en individuos, familias, comunidad y el entorno e implementación de planes de atención. ¿A qué tema se refiere el enunciado?

- A. Ficha familiar.
- B. Atención domiciliaria**
- C. Atención intramural.
- D. Familiograma.

937. La actuación de la enfermera en la atención familiar y comunitaria en el marco de la APS, implica asumir una relación personal, asistencial que hace referencia a la conexión entre las distintas actuaciones asistenciales, relativas a un problema de salud, actuaciones que pueden ser realizadas por distintos profesionales y en diferentes ámbitos del sistema sanitario. ¿Cuál es el tema al que hace mención el enunciado?

- A. Longitudinalidad de los cuidados.
- B. Promoción de los cuidados.
- C. Prevención de los cuidados.
- D. Continuidad de los cuidados**

938. La asistencia personal individual en salud debe estar necesariamente integrada con el enfoque familiar, comunitario y la perspectiva global que se fundamente en la participación y corresponsabilización de todos los actores implicados en el abordaje de los determinantes de salud. ¿a través de que acciones y programas?

- A. Promoción, prevención, asistencia y cuidados que constituyen la atención familiar y comunitaria.**
- B. Promoción, prevención, inasistencia y cuidados que constituyen la atención familiar y comunitaria.
- C. Promoción, prevención, asistencia y falta de cuidados que constituyen la atención familiar y comunitaria.
- D. Prevención, asistencia y cuidados que constituyen la atención familiar y comunitaria.

939. Elija la respuesta correcta. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del llenado de la ficha familiar?

- A. Identificar el lugar donde vive la familia y la distancia del centro de salud.
- B. Identificar las razones por las cuales las familias no se acercan al centro de salud.
- C. Medir el nivel de educación en salud que disponen las familias.
- D. Medir las condiciones de vida y los determinantes sociales de salud.**

940. Visita domiciliaria es el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario, familia y/o comunidad; responde a una necesidad identificada por el equipo de salud, quienes elaboran el plan de intervención a seguir en el domicilio. En la unidad de salud donde usted ha sido asignada/o, el reporte de consultas le indica alta incidencia de riesgo de desnutrición infantil. ¿Con qué criterio usted realizaría su planificación de visitas domiciliarias?

- A. Demográfico
- B. Administrativo.
- C. Epidemiológico**
- D. Socioeconómico

941. Seleccione la definición correcta de familiograma: .

- A. Es un recurso adicional de la ficha familiar que consigna datos de la familia y su relación con la comunidad.
- B. Es una fotografía de la familia que permite visualizar su composición y funciones.
- C. Es un sistema complejo de conocimiento de la dinámica familiar y sus relaciones sociales en la comunidad.
- D. Es un Instrumento para valorar la estructura, dinámica, riesgos, roles y ciclo evolutivo de la familia en un momento determinado.

942. En un sector de una comunidad, por razones de trabajo minero existe una alta migración de un grupo étnico, usted debe atender a esa comunidad. Al realizar el plan operativo. ¿Cuál sería el objetivo prioritario del Plan, tomando en cuenta el enfoque intercultural?

- A. Reconocer e incorporar los conocimientos y las prácticas de salud ancestrales en el plan.
- B. Reconocer las necesidades de salud del grupo étnico de acuerdo a sus costumbres.
- C. Particularizar los servicios de atención de salud a los grupos de riesgo para mejorar el acceso a los servicios.
- D. Mejorar las relaciones entre proveedores de salud y usuarios con distintas demandas de atención de salud.

943. Como personal de salud, instruye a un paciente diabético para que identifique y evite las complicaciones; Señale el nivel de prevención para la salud que esta aplicando:

- A. Primaria.
- B. Terciaria.
- C. Secundaria.
- D. Cuaternaria.

944. Las siguientes son variables externas que influyen sobre la salud. EXCEPTO:

- A. Entorno.
- B. Nivel de vida.
- C. Biológicos.
- D. Familia.

945.. La teorizante de enfermería moderna que establece que las condiciones externas afectan la vida y contribuyen a las enfermedades es:

- A. Virginia Henderson.
- B. Nola Pender.
- C. Dorothea Orem
- D. Florence Nightingale.

946. ¿Cuál es el objetivo de la aplicación del test de APGAR familiar?

- A. Evaluar el Nivel de funcionamiento de la familia.
- B. Determinar una crisis familiar normativa.
- C. Determinar una crisis familiar no normativa.
- D. Evaluar la funcionalidad de la familia a través de una representación gráfica.

947. Seleccione la teorizante fundadora en los cuidados de la diversidad y la universalidad de la Enfermería transcultural.

- A. Martha Rogers.
- B. Virginia Henderson.
- C. Madeleine Leininger.
- D. Hildegard Peplau.

948. En una familia donde sus integrantes están sin trabajo, atraviesan una situación de pobreza, las relaciones intrafamiliares son violentas y no predominan la práctica de los valores. ¿A qué determinante de la salud, según Marck Lalonde, hace referencia el caso?

- A. Ambientales.
- B. Biológicos.
- C. Conductuales.
- D. Sociales.

949. Señale uno de los principios del modelo de atención integral que considera la asignación de recursos y autocuidado:

- A. Participativo.
- B. Eficiencia.
- C. Integralidad.
- D. Universalidad.

950. Los enfoques del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS-FCI) son; EXCEPTO:

- A. Intervención intersectorial, movilización de recursos.
- B. Atención Primaria de Salud Renovada, epidemiología comunitaria.
- C. Interculturalidad, salud mental.
- D. Investigación, cuidados paliativos.

951. Las actividades que el equipo de salud realiza en la visita domiciliar son, EXCEPTO:

- A. Actividades de diagnóstico de riesgo para la salud de la persona, familia y comunidad con un enfoque psicosocial.
- B. Actividades de entrenamiento práctico para los TAPS en el caso de las unidades de primer nivel de atención.
- C. Actividades de evaluación dinámica, organizada y continua del estado de salud de las personas en una población determinada.
- D. Planifica actividades terapéuticas y cuidados de enfermería o médicas que ayuden a solucionar los problemas de la familia y la comunidad.

952. Cuando realiza una visita domiciliar y considera a las familias que hayan permanecido de 3 a 5 años en un mismo sector y que tengan fácil acceso a los servicios de salud. ¿Con qué criterio de selección de visita esta trabajando?

- A. Demográfico.
- B. Socioeconómico.
- C. Administrativo.
- D. Epidemiológico.

953. Las cualidades que debe tener el personal que realiza la visita domiciliaria son. EXCEPTO:

- A. Extroversión.
- B. Comunicación.
- C. Capacidad gerencial.
- D. **Neuroticismo.**

954. Señale en qué nivel de la cadena de frío se cuenta con refrigeradoras para mantener las vacunas por cortos períodos de tiempo, termos o conservadoras para su uso diario.

- A. Nivel nacional o central.
- B. **Nivel local u operativo.**
- C. Nivel regional o provincial.
- D. Laboratorio productor.

955. De acuerdo con la taxonomía NANDA, de los siguientes diagnósticos enfermeros, identifique el que corresponde con la promoción de la salud:

- A. Procesos familiares disfuncionales.
- B. Afrontamiento defensivo.
- C. Relación ineficaz.
- D. **Gestión ineficaz de la salud.**

956. Seleccione los ejes programáticos que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 toda una vida:

- 1.Derechos para Todos Durante Toda la Vida.
- 2.Economía al Servicio de la Sociedad.
- 3.Garantiza los derechos de la naturaleza.
- 4.Más sociedad, mejor Estado.
- 5.Afirma la interculturalidad y plurinacionalidad.

- A. **1, 2, 4**
- B. 2, 3, 4
- C. 3, 4, 5
- D. 1, 4, 5

957. Los siguientes son principios del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS-FCI), seleccione la opción incorrecta:

- A. **Parcialidad.**
- B. Equidad.
- C. Universalidad.
- D. Integralidad.

958. De acuerdo con la taxonomía NANDA, de los siguientes diagnósticos enfermeros, identifique el que corresponde con la promoción de la salud:

- A. **Gestión ineficaz de la salud.**
- B. Procesos familiares disfuncionales.
- C. Afrontamiento defensivo.
- D. Relación ineficaz.

959. Seleccione los ejes programáticos que contempla el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 toda una vida:

1. Derechos para Todos Durante Toda la Vida.
2. Economía al Servicio de la Sociedad.
3. Garantiza los derechos de la naturaleza.
4. Más sociedad, mejor Estado.
5. Afirma la interculturalidad y plurinacionalidad.

- A. 2, 3, 4
- B. 3, 4, 5
- C. 1, 4, 5
- D. 1, 2, 4

960. Los siguientes son principios del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS-FCI), seleccione la opción incorrecta:

- A. Parcialidad.
- B. Equidad.
- C. Universalidad.
- D. Integralidad.

961. Relacione el área y los equipos de salud de acuerdo con los estándares definidos en el Modelo de Atención Integral de Salud.

ÁREA EQUIPO DE SALUD

1. A nivel urbano
2. A nivel rural
- a. Un médico/a; una enfermera/o
- b. Un TAPS, por cada 1500 a 2500 habitantes
- c. Un médico/a; una enfermera/o
- d. Un TAPS, por cada 4000 habitantes. e. Un TAPS, por cada 2500 4000 habitantes.

- A. 1ad, 2bc.
- B. 1ab, 2cd.
- C. 1bd, 2ac.
- D. 1cd, 2ae.

962. En el Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021 para alcanzar el objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, se han establecido las siguientes metas; Seleccione la meta incorrecta:

- A. Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas.
- B. Disminuir el embarazo no planificado a 2021.
- C. Aumentar del 46.4 % al 64 %, la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, a 2021.

963. Dotar de ayudas técnicas a las personas con discapacidad a 2021. Complete el enunciado: En el Plan Nacional de Desarrollo, Toda una Vida una de las intervenciones emblemáticas en el eje 1 se encuentra la Alimentación Nutrición (Misión ternura), la cual enfoca en la atención del niño o niña desde los _____ de gestación en el vientre de la madre, hasta su desarrollo dentro de los _____ de vida, para lo cual es necesario instaurar y mantener una cultura de _____ adecuada a lo largo del ciclo vital.

- A. Primeros 2 meses- primeros 2 años- salud.
- B. Primeros meses - primeros 5 años- nutrición.**
- C. Primeros 3 meses- primeros 3 años- nutrición.
- D. Primeros 4 meses- primeros años- salud.

964. Los campos de acción de los equipos de salud de acuerdo con el MAIS-FCI son; EXCEPTO:

- A. Nivel epidemiológico.
- B. Nivel social.
- C. Nivel local.**
- D. Nivel de enfermedad.

965. "Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad". Es una definición de:

- A. Dorothea Orem.**
- B. Calista Roy.
- C. Marjorie Gordon.
- D. Hildegard Peplau

966. El determinante de la salud en donde hay una interacción entre elementos naturales y sociales que contribuyen a la generación de condiciones de protección o riesgo para la salud se refiere a:

- A. Sistema sanitario.
- B. Sociales.
- C. Ambientales.**
- D. Biológicos.

967. En el centro de salud que usted trabaja, le corresponde realizar una visita domiciliaria. La etapa en la que establece los objetivos a corto, mediano y largo plazo se refiere a:

- A. Planificación de los cuidados.**
- B. Preparación de la visita.
- C. Ejecución de cuidados.
- D. Registro de la visita.

968. Complete los espacios con las palabras que correspondan al siguiente enunciado: La comunidad es un _____ social determinado por límites geográficos y /o intereses y _____ comunes. Sus _____ se conocen e interaccionan entre ellos.

- A. conjunto, aspectos, miembros.
- B. sistema, factores, secciones.
- C. grupo, aspectos, integrantes.
- D. grupo, valores, miembros.**

969. La vacunación es la estrategia más efectiva y eficiente de la prevención primaria de salud. De los siguientes, ¿cuál es un objetivo del Programa de Vacunación / Estrategia Nacional de Inmunización?

- A. Notificar oportunamente los casos.

- B. Supervisar los componentes del programa.
- C. Reducción de la prevalencia de la enfermedad.**
- D. Aumento de la prevalencia de la enfermedad.


970. En la visita domiciliar realizada a una familia, obtiene un APGAR familiar de 10/20 puntos. ¿En qué tipo de familia se encuentra?

- A. Disfunción moderada.**
- B. Buena función familiar.
- C. Disfunción leve.
- D. Disfunción severa.

971. ¿Cuál es la vía y la dosis de administración de la vacuna BCG a un recién nacido?

- A. Intradérmica, 1 ml.
- B. Intramuscular, 0.5 ml.
- C. Intradérmica, 0.1ml.**
- D. Subcutánea, 0.5 m

972. La representación gráfica del familiograma, pertenece a la familia N N. Identifique el tipo de familia, el ciclo vital del desarrollo familiar, y la relación de los hijos con su padre.



- A. Familia extensa, ciclo vital con adolescente y relación de los hijos conflictiva.
- B. Familia ampliada, ciclo vital con niños escolares y relación de los hijos unidos.
- C. Familia nuclear, ciclo vital con niños adolescentes y relación de los hijos distante.
- D. Familia reconstituida, ciclo vital de plataforma de colocación y relación conflictiva.**

973. ¿Cuál es la vía y la dosis de administración de la vacuna BCG a un recién nacido?

- A. Intradérmica, 1 ml.
- B. Intramuscular, 0.5 ml.
- C. Subcutánea, 0.5 ml.
- D. Intradérmica, 0.1ml.**

974. Un adulto mayor de 65 años llega al servicio de vacuna, refiere que no le han aplicado vacunas, su oficio es el trabajo de agricultura. ¿Qué vacunas se aplica al paciente?

- A. Influenza estacional, DT del adulto.**
- B. DT del adulto, Hepatitis B.
- C. Fiebre amarilla, Influenza estacional.
- D. Hepatitis B, Fiebre amarilla.

975. Paciente que se confirma diagnóstico de Tuberculosis se decide iniciar tratamiento de TB Sensible. Seleccione la dosis de la fase inicial y la fase de consolidación para este caso:

- A. 50 dosis HRZ (2 meses) y 80 dosis HR (4 meses).
- B. 50 dosis HRZ (2 meses) y 100 dosis HR (4 meses).**
- C. 55 dosis HRZE (3 meses) y 75 dosis HR (3 meses).
- D. 75 dosis HRZ (3 meses) y 175 dosis H (3 meses).

976. Seleccione el instrumento que permite vigilar el estado de salud de la población, sus necesidades y desarrollar política para garantizar los servicios de salud.

- A. Diagnóstico dinámico.
- B. Ficha familiar.**
- C. Mapa parlante.
- D. Historia clínica.

977. El campo de acción de los Equipos de salud de acuerdo al MAIS-FCI, en el cual les permite construir la base del perfil epidemiológico como herramienta fundamental, para mantener la salud mediante acciones dirigidas a grupos desagregados por género, etnia y por ciclos de vida corresponde al nivel:

- A. De Enfermedad.
- B. Familiar y Comunitario.
- C. Social. Como profesional de enfermería del centro de salud, debe realizar visitas domiciliarias.
- D. Epidemiológico.**

978. La etapa de la visita que le ayuda para continuar o modificar la planificación de los cuidados, detectar las dificultades, revisar los objetivos, planificar otros nuevos, corresponde a:

- A. Evaluación de la visita.**
- B. Preparación de la visita.
- C. Planificación de la visita.
- D. Ejecución de la visita.

979. Señale el instrumento técnico metodológico que permite identificar los actores públicos, organizar la numeración de las manzanas, sectores, viviendas e identificar las familias y factores de riesgos o de protección ambiental, estilos de vida, sanitario y biológico.

- A. Mapeo de actores.
- B. Diagnóstico situacional.
- C. Mapa parlante.**
- D. Diagnóstico dinámico.

980. En los centros de salud de nivel primario se desarrollan actividades extramurales, con visitas a las escuelas y familias donde articulan acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, con una visión psicosocial. ¿Cuál de los principios del Modelo de Atención Integral de la Salud (MAIS) se está cumpliendo?

- A. Integralidad.**
- B. Garantía de los derechos de las y los ciudadanos.

- C. Universalidad.
- D. Equidad.

981. ¿Cuál de los siguientes valores determinan una hemorragia postparto vaginal y por cesárea?

- A. 450 mL en un parto vaginal y 950 mL en un parto por cesárea.
- B. 400 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.
- C. 300 mL en un parto vaginal y 900 mL en un parto por cesárea.
- D. 550 mL en un parto vaginal y 1 050 mL en un parto por cesárea.

982. La persona que presenta una muestra biológica positiva (BK), según el protocolo del MSP del Ecuador se le denomina:

- A. Caso de TB previamente tratado.
- B. Caso de TB bacteriológico confirmado.
- C. Caso de TB pulmonar (TBP).
- D. Caso de TB clínicamente diagnosticado.

983. Una comunidad de 3 500 habitantes, cuenta con un centro de salud de primer nivel de atención primaria, colegios, y centro policial; el equipo de salud organiza un encuentro para desarrollar un diagnóstico situacional y conocer las necesidades de salud actuales; en él participaron 1 000 personas, entre estos incluyendo profesores de colegio, agentes policiales y miembros de la comunidad. ¿Cuál de los objetivos del Modelo de Atención Integral de Salud del Ecuador, se está cumpliendo?

- A. Promover la participación plena de la comunidad y de los colectivos organizados, involucrándolos en las acciones de salud.
- B. El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica e incorporación de las experiencias innovadoras como la epidemiología comunitaria.
- C. Fortalecer los procesos de atención, gestión y toma de decisiones, así como la asesoría y los procesos de educación continua.
- D. Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia para garantizar la continuidad en las prestaciones de salud.

984. En visita domiciliaria a familia extendida integrada por 15 personas, todas las generaciones han padecido de cáncer, y algunos han muerto por diabetes, viven en condiciones sanitarias inadecuadas y no asisten al centro de salud para el control médico regular. Señale el criterio de selección aplicado en la visita domiciliaria descrita:

- A. Demográfico.
- B. Socioeconómico.
- C. Epidemiológico.
- D. Administrativo.

985. La Modalidad de Atención Integral del MAIS -FCI, que comprende todos los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se presta a enfermos o accidentados corresponde a:

- A. Atención prehospitalaria.
- B. Atención extramural.
- C. Atención en un establecimiento de salud.
- D. Atención en establecimientos móviles de salud.

986. ¿Cuáles son los riesgos que se determinan en la ficha familiar?

- A. Riesgos laborales, de caídas, de úlceras por presión y ergonómicos.
- B. Riesgos físicos, químicos, psicosociales y ambientales.
- C. Riesgos mecánicos, sepsis, ergonómicos y riesgos relacionados a carga mental.
- D. Riesgos biológicos, psicológicos, familiares y comunitarios.

987. El principio del Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e Intercultural que garantiza el acceso a iguales oportunidades para el cuidado y atención integral de Salud en el Ecuador, independientemente de la nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, nivel de educación, ocupación, ingresos es:

- A. Integralidad.
- B. Universalidad.
- C. Participativo.
- D. Desconcentrado.

988. El modelo de atención integral, orienta el accionar integrado de los actores del Sistema Nacional de Salud hacia la garantía de los derechos en salud y en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir al mejorar las condiciones de vida y salud de la población. Esta definición hace énfasis a:

- A. Objetivo.
- B. Principios.
- C. Integralidad.
- D. Propósito.

989. ¿Cuál de los siguientes enunciados se acerca más a la definición de la Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud?

Proporcionar condiciones para generar un cambio del entorno físico y socio-económico de la población.

- A. Promocionar cambios de comportamiento.
- B. Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma.
- C. Proporcionar educación sanitaria para prevenir enfermedades crónicas.
- D. Promocionar solamente un cambio de comportamiento individual.

990. ¿A qué edad se administra la primera dosis de la vacuna Pentavalente?

- A. A los 2 meses de edad (máximo hasta los 11 meses 29 días).
- B. A los 4 meses de edad (máximo hasta los 11 meses 29 días).
- C. A los 6 meses de edad (máximo hasta los 11 meses 29 días).
- D. A los 8 meses de edad (máximo hasta los 11 meses 29 días).

991. Como licenciado en enfermería realiza la visita domiciliar a una familia en etapa de contracción, donde ambos cónyuges son adultos mayores con dependencia funcional.

¿Qué actividad prioritaria se realiza teniendo en cuenta los factores de riesgo?

- A. Orientar una dieta hipercalórica y fraccionada.
- B. Facilitar silla de ruedas y cuidadores
- C. Planificar un plan rutinario de ejercicios.
- D. Garantizar reposo minimizando las actividades.

992. De las consideraciones detalladas para la toma de la muestra del Tamizaje Metabólico Neonatal (TAMEN), señale cual no corresponde:

La toma de la muestra se la realiza a partir de las primeras 96 horas de vida del recién nacido.

- A. El recién nacido debe estar en ayuno ya sea por vía enteral o parental al menos una hora antes de la muestra.
- B. El recién nacido debe colocarse de forma horizontal durante todo el procedimiento y apoyado al pecho de quién lo sostenga.
- C. Cuando el recién nacido llegue después de las 96 horas, se tomará la muestra de igual manera, incluso hasta el primer año de vida.

993. Al educar a la madre sobre los resultados del tamizaje neonatal, usted le informa que debe suspender la lactancia materna porque el neonato puede presentar:

- A. Galactosemia.
- B. Hipotiroidismo congénito.
- C. Hiperplasia suprarrenal.
- D. Fenilcetonuria.

994. Una vez abiertos los frascos multidosis de las vacunas DPT, DT, dT, OPV si no se han contaminado al tomar o administrar las dosis de vacunas pueden seguir utilizándose dentro del siguiente período de tiempo:

- A. 5 semanas.
- B. 6 semanas.
- C. 3 semanas.
- D. 4 semanas.

995. En la comunidad, la enfermera utiliza varios instrumentos de abordaje familiar. ¿Cuál de las siguientes alternativas evalúa el funcionamiento de la familia?

- A. Familiograma
- B. Mapeo de Actores
- C. Apgar familiar
- D. Ecomapa

996. Señale el esquema de administración correcto para la suplementación de hierro con micronutrientes en polvo (chis paz):

- A. 1 sobre diario de lunes a domingo, durante 60 días, descansa 4 meses.
- B. 1 sobre diario de lunes a viernes, durante 60 días, descansa 4 meses.
- C. 1 sobre pasando un día, durante 40 días, descansa 4 meses.
- D. 1 sobre con cada comida semisólida, durante 40 días, descansa 4 meses

997. ¿Cómo se integra la promoción de la salud en una estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles?

- A. Aumento de la publicidad del Ministerio de Salud Pública, como estrategia principal para modificar los comportamientos individuales que resultan en enfermedades crónicas.
- B. Participación de los actores clave y la comunidad en la planificación, implementación y evaluación de programas e iniciativas.

- C. Fortalecimiento de los servicios de rehabilitación para discapacidades resultantes de las enfermedades crónicas no transmisibles.
- D. Ampliación de los horarios en centros especializados para atención a pacientes con patologías crónicas.

998. ¿Cuál es la vía y región de administración de la vacuna Triple Viral SRP según el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ecuador / Estrategia Nacional de Inmunizaciones?

- A. Vía intramuscular en el vasto externo.
- B. Vía intradérmica en la región deltoidea.
- C. Vía subcutánea en la región peri umbilical.
- D. Vía subcutánea en el deltoides del brazo izquierdo.

999. Seleccione la modalidad de atención del componente Provisión de Servicios del MAISFCI que presta un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos urgentes:

- A. Atención Prehospitalaria.
- B. Atención Individual.
- C. Atención al ambiente.
- D. Atención Comunitaria.

1000. En el centro de salud que está realizando su año de salud rural debe aplicar el componente de provisión de servicios del MAIS-FCI con la herramienta de la visita domiciliaria; usted prioriza la visita a un niño menor de 1 mes. ¿Qué criterio de priorización de la visita domiciliaria está aplicando?

- A. Epidemiológico.
- B. Administrativo.
- C. Demográfico.
- D. Socioeconómico.